









~~56-3. 2'~~ ~~121.~~ SE 3 2-1.

137-8

En 211
m 49

ELEMENTOS
DE MATEMÁTICA
TOMO II



ELEMENTOS
DE MATEMÁTICA.

TOMO III.



DE MAYEUTICA
ELEMENTOS
TOMO III




ELEMENTOS DE MATEMÁTICA.

POR D. BENITO BAILS,

*Director de Matemáticas de la Real Academia de S. Fernando,
Individuo de las Reales Academias Española, de la Historia,
y de la de Ciencias naturales, y Artes de Barcelona.*

TOMO III.



M A D R I D.

Por D. JOACHIN IBARRA, Impresor de Cámara de S. M.

M.DCC.LXXIX.

LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY

FOR THE UNITED STATES

WASHINGTON



MAY 10 1890

For the Secretary of the Interior, Department of the Interior

WASHINGTON

PRÓLOGO.

Una vez que nos propusimos incluir en los tres primeros Tomos de esta Obra toda la Matemática Pura, ó Especulativa que habia de llevar, era natural le tocasen al tercero los asuntos de mayor elevacion. Pero como no todos son ni pueden ser igualmente dificultosos, era preciso diésemos el primer lugar á los menos elevados, aun quando no sirvieran como de introduccion para la inteligencia de los demas.

Por este motivo declaramos desde luego, bien que con suma brevedad, los fundamentos de toda la teoría de las líneas curvas algebraicas, llamadas con este nombre porque se puede cifrar su naturaleza en expresiones que no llevan mas símbolos que los que usa el Algebra Cartesiana, sin incluir cantidad alguna infinitesimal, logarítmica, trigonométrica, &c. Lo poco que sobre este asunto publicamos está sacado de una obra del célebre Cramer, Ginebrino (1), que por su mucha claridad, tanto como por lo profundo de sus investigaciones, fue recibida con general aplauso. Estos primeros principios pudiéramos tambien haberlos sacado de la Introduccion de Leonardo Euler á la Analisis de los infinitos, en cuyo

Tom. III.

a 3

to-

(1) *Introduction a l'analyse des lignes courbes algebriques. Par Gabriel Cramer, Professeur de Philosophie & de Mathématiques, &c. Un tomo en 4. Ginebra 1750.*

tomo segundo trata con aquella maestría que es el caracter distintivo de todos sus escritos , la misma materia que Cramer ; pero su tratado nos pareció , por mas conciso, mas dificultoso de extractar , y este fue el único motivo por que dimos la preferencia á la Obra del Matemático de Ginebra. A todo aficionado de buen talento , y bien radicado en los diferentes ramos del cálculo algebráico , le aconsejamos se la dé al tratado del Sr. Euler , leyendo primero , si quisiere (y acaso no le pesará), un extracto que de él hizo el Traductor Francés del Algebra de Maclaurin (2). Aunque de talento , doctrina y destreza iguales dos Escritores , pueden sin embargo escribir sobre una misma materia por rumbos muy distintos , sin que en sus obras se eche menos ninguna de las prendas que les merecen lugar á los escritos en la clase de cabales. Pero sobre que un lector , quanto mayor sea su penetracion , tanto mas gusta de tratados concisos , tiene tambien mas cuenta echar mano de ellos , como no equivocasen sus autores al tiempo de formarlos un escrito conciso con un escrito oscuro ó diminuto ; porque al paso que se apropia la doctrina que declaran , se le pega tambien , digamoslo así , al que estudia la manera del autor : y nadie negará que en igualdad de circunstancias un libro , sea el

que

(2) *Traité d'Algebre , &c de la maniere de l'appliquer. Traduit de l'Anglois de M. Maclaurin , de la Societé Royale de Londres , Professeur de Mathématique à Edimbourg. Avec des augmentations tirées des Mathématiciens les plus célèbres. Un tomo en 4. Paris 1753.*

que fuere su asunto , escrito con prudente laconismo lleve algunos quilates de ventaja á otro donde esté todo tan individualizado , y estén tan multiplicados los exemplos, que pueda ser algo molesto á un lector que guste de meditar. Los que buscaren acerca de estas curvas mucha doctrina en poco papel , podrán acudir al Tomo primero de las Instituciones analíticas de Ricati ; bien que dudamos haya para contentarles obra tan buena como la que publicó un docto Magistrado del Parlamento de París (3) en un tomito en 12. pequeño de unas 200 planas. En esta Obrita tan apreciable como desconocida , hallarán muchísimo que aprender los principiantes , y los que estuvieren impuestos en estas materias un primoroso prontuario que les servirá para renovar á muy poca costa las especies , que en tratados muy voluminosos hubieren aprendido.

A continuacion de los principios generales de la doctrina de las curvas algebraicas , tratamos con alguna individualidad de las que se han hecho muy famosas con el nombre de secciones cónicas , copiando los tres primeros libros del tratado analítico que de ellas escribió el Marques del Hospital , Francés (4). A pesar de las tachas que algunos han querido poner á la Obra del Marques , es

a 4

sin

(3) *Traité des Courbes Algebriques*. Un tomo en 12. Paris 1756.

(4) *Traité analytique des sections coniques, & de leur usage pour la resolution des équations dans les problèmes tant déterminés qu'indéterminés*. Ouvrage Posthume de M. le Marquis de l'Hospital , Academicien honoraire de l'Académie Royale des Sciences. Un tomo en 4. Paris 1704.

sin duda alguna la mas cabal y perfecta que se ha publicado sobre este asunto , á lo menos por el método analítico (5); reparándose al mismo tiempo en ella , como en todo lo que salió de la misma mano , una elegancia de construcciones que enamora , y una claridad y despejo que no siempre se hallan en las Obras de los Escritores que intentaron deslucirla. No porque se note un leve descuido en una obra de considerable extension dexará de ser excelente , así como no dexarémos de graduar de insigne á un escritor , porque dé en sus escritos alguna muestra de que no fue un hombre infalible (6).

El

(5) Hay sobre las secciones cónicas otro tratado analytico con el título siguiente : *Traité analytique des sections coniques , fluxions & fluentes. Avec un essai sur les quadratures , & un traité du mouvement. Par M. Muller , Professeur de Mathématiques à l'Ecole Royale de Volvich , traduit de l'Anglois par l'Auteur.* Un tomo en 4. Paris 1760. No se puede comparar esta obra con la del Marques del Hospital por diminuta en lo que toca á las secciones cónicas , y obscura en todos los puntos que trata su autor.

(6) Del tratado del Marques hace Saunderson , Ingles , en el Tomo II. de sus Elementos de Algebra , plana 211 , el juicio siguiente:

Au moyen des trois derniers articles le lecteur pourra se former quelque idée de ce qu'il faut entendre par lieux géométriques , & de leur usage dans la solution & dans la construction des problèmes géométriques ; mais il lui sera impossible de se mettre bien au fait de ces matières , s'il n'étudie avec soin les sections coniques , qui sont les lieux qu'on employe ordinairement dans

“Por medio de los tres últimos artículos podrá el lector formar algun concepto de lo que comunmente llamamos lugares geometricos , y de su uso para resolver y construir los problemas (cuestiones) geométricos; pero no podrá enterarse bien de estos asuntos , á no ser que primero se imponga en la teórica de las secciones cónicas , que son los lugares de que se hace uso por lo regular para

El haber declarado á nuestra satisfaccion las principales propiedades de las secciones cónicas , considerándolas como trazadas en un plano por un cuerpo que se mueve con movimiento ajustado á ciertas leyes determinadas,

no

la construction de toutes les équations de plus de deux degrés. Je recommanderai pour cet effet la lecture du Traité des sections coniques du Marquis de l'Hopital : ouvrage posthume à la vérité , mais néanmoins très correct à un petit nombre d'endroits près , dont quelques uns , à mon avis , ont été censurés trop sévèrement , surtout si l'on considère qu'ils peuvent être aisément corrigés , & qu'ils l'auroient été sansdoute si l'auteur avoit vécu assez longtems pour mettre la dernière main à cet ouvrage. Ce Traité me paroit plus clair , plus facile à comprendre , & plus propre à enseigner bien des choses en peu de tems , qu'aucun autre qui me soit connu & je le recommande surtout à cedernier égard. Dans les quatre derniers livres de cet ouvrage on trouve la matière des lieux géométriques , relativement à leur construction & à leur usage , parfaitement bien approfondie , & éclaircie par un nombre suffisant d'exemples. En un mot , le plan de cet ex-

cel-

»la construccion de las equaciones que
»pasan del segundo grado. Para cuyo
»fin le aconsejo lea el tratado de las
»secciones cónicas del Marqués del
»Hospital: obra póstuma á la ver-
»dad , pero sin embargo de eso muy
»correcta , á excepcion de unos po-
»cos pasages , que algunos han sido
»criticados , en mi juicio , con sobra-
»do rigor; y particularmente si nos ha-
»cemos cargo de que son muy fáciles
»de enmendar , y que los hubiera en-
»mendado sin duda alguna su autor
»si hubiera vivido bastante para dar
»la última mano á esta obra. Este
»Tratado me parece mas claro , mas
»facil de entender , y mas apropó-
»sito para enseñar muchas cosas en
»poco tiempo , que otro ninguno de
»los que conozco ; y por este último
»motivo aconsejo particularmente su
»lectura. En los quatro últimos libros
»de dicha obra está la doctrina de los
»lugares geométricos , por lo tocante
»á sus usos y construccion , tratada
»con toda profundidad , y aclarada
»con bastantes exemplos. En una pa-
»labra , el plan de este excelente tra-

»ta-

no podia de ningun modo dispensarnos la obligacion de considerarlas tambien en el cono , de donde traen su nombre y origen. Muchas investigaciones y obras matemáticas suponen el conocimiento de este origen , cuya declaracion va copiada del Curso de M. Bezout , porque le dá á conocer con mucha claridad , bien que con muy pocas palabras. Finalmente , como la aplicacion de la Especulativa á la Práctica , y tambien muchas cuestiones de Especulativa piden que se tracen secciones cónicas , proponemos para esta operacion un método generalísimo que sirve para todas tres , qual le hallamos en el tratado del Marques, de donde hemos copiado lo demas.

Entre varias estrañezas con que tropieza el entendimiento humano en el estudio de las Matemáticas , es muy notable la que manifestamos en el Tomo antecedente acerca de algunos números imposibles de averiguar , siendo así que es facilísimo hallar el producto de unos por otros , y tambien la razon que entre ellos hay. Pero otra singularidad hay enlazada con un punto que tratamos en este Tomo , quando declaramos como se sacan cabales por lineas las raices de las equaciones , aun quando es imposible de-

ter-

cellent Traité est, à tous égards, si bien fait, & exécuté avec tant de facilité, de clarté & de jugement, que ce seroit une vanité inexcusable à moi de penser seulement pouvoir ajouter quelque chose à une pièce aussi finie.

»tado es á todas luces bien hecho y »executado con tanto despejo , claridad y juicio , que sería de mi parte »vanidad muy culpable solo el pensar que pudiese añadir algo á una »obra tan acabada.»

terminar por números sus valores. Esta que podrá parecer paradoxa , es una proposicion muy evidente para quien considerare que segun sean los valores numéricos de los lados de un triángulo rectángulo , no habrá camino alguno por donde hallar cabal por números el valor de su hipotenusa ; siendo así que el determinarla por lineas será operacion facilísima. El método que han discurrido los Matemáticos para resolver por Geometría las equaciones determinadas superiores, consiste en suponer dos equaciones indeterminadas , ó con dos variables , que cada una pertenezca á una seccion cónica distinta , y en *trazar* despues estas curvas *por construccion* , tomando las abscisas de ambas en un ege comun : hecho esto , desde los puntos donde las dos secciones cónicas se intersecan se tiran ordenadas comunes al ege , cuyas porciones desde el origen hasta los puntos donde dichas aplicadas le encuentran, expresan los valores de las raices de la equacion determinada que se ha de resolver.

Hemos dicho que se han de trazar *por construccion* las curvas cifradas en las dos equaciones indeterminadas que se forman para la resolucion de la equacion fundamental ; porque mediante una equacion indeterminada se puede trazar de dos distintos modos la curva que representa. El primero (7) consiste en dar succesivamente diferentes valores á la una de sus indeterminadas , pongo por caso, á la abscisa , con lo que la otra indeterminada se trans-

(7) Lo declaro en este Tomo pág. 12.

forma en incógnita (8), y sacando sus valores con resolver la equacion puesta en estos términos, la curva trazada con mano suelta por los extremos de todas estas ordenadas, será la que iba cifrada en la equacion indeterminada propuesta. El otro modo de trazar las curvas, que llamamos por construccion, se reduce á hallar primero el valor y la posicion de algunas de sus lineas principales, y hallados estos, en trazar la curva por un método fundado en la naturaleza y destino de dichas lineas. Con un egemplo muy sencillo procuraremos darnos mejor á entender. Dada la equacion de una parábola, por egemplo, es constante que con señalar diferentes valores á la abscisa irémos sacando diferentes valores de la ordenada, ó distintas ordenadas, por cuyos extremos ha de pasar, y trazaremos la parábola. Pero si dada la misma equacion, determino primero el parámetro, la posicion de su eje ó diámetro, el ángulo que han de formar las coordenadas, y sujetándome á las condiciones que estas determinaciones me impongan, trazo la parábola por alguno de los métodos co-

no-

(8) De una cantidad incógnita á una cantidad indeterminada va la diferencia de que el número de los valores de la primera es muy limitado, siendo así que la otra puede tener infinitos valores. En una equacion con dos indeterminadas ó variables, pongo por caso, se sacarán para la una infinitos valores por razon de que puede la otra representar una infinidad de cantidades distintas; pero una vez que á la segunda variable se la señale un valor particular, ó determinado, la primera no podrá tener ya mas valores á lo sumo, que quantas unidades tuviere su exponente.

nocidos , fundados en la naturaleza de estas líneas , esto será trazarla por construccion.

Este es cabalmente el método peculiar á los lugares geométricos ; de modo que hallar el lugar geométrico de una equacion indeterminada perteneciente á una seccion cónica , ó , lo que es todo uno , á una linea de segunda orden (9) , es trazar por construccion la seccion cónica que en dicha equacion está cifrada. Y una vez que , segun decíamos poco ha , declaramos cómo se resuelven las equaciones determinadas de tercero y quarto grado por la interseccion de dos secciones cónicas cifradas en las equaciones indeterminadas auxiliares , el empeño está 1.º en formar estas equaciones auxiliares ; 2.º en averiguar qué seccion cónica representa cada una de ellas ; 3.º en trazarlas , señalando las abscisas de ambas en una misma recta. Esto es cabalmente lo que declaramos sin apartarnos un punto de la doctrina del Marques del Hospital.

Despues de formada la una de las dos equaciones indeterminadas auxiliares , se saca la otra con suma facilidad ; pero la eleccion de la primera pide algun pulso , por el riesgo que se corre de que sea de tal índole que resulten imaginarias las intersecciones de las dos secciones , que determinan las raices de la propuesta. Nos tocaba , pues , enseñar cómo se precave este grave inconveniente , y no hallamos cosa mas adecuada á nuestro intento que copiar las

re-

(9) La razon de esto se hallará en este Tomo pág. 20.

reglas y los egemplos que con el mismo fin trae Gabriel Cramer en su obra citada.

Ultimamente , como no hay modo mas acertado de hacer perceptibles los preceptos teóricos que aplicarlos á casos prácticos , y egemplos bien escogidos ; una vez satisfecho el reparo expresado , resolvemos algunas cuestiones , así determinadas , como indeterminadas , todas sacadas del Tratado Analítico del Marques , á excepcion de la que se dirige á hallar dos lineas medias proporcionales entre otras dos lineas dadas , que copiamos de las Instituciones de Vicente Ricati.

A pesar de lo mucho que nos mostramos preocupados á favor del tratado de las secciones cónicas del Marques del Hospital , de donde , segun queda dicho , hemos sacado tambien la doctrina de los lugares geométricos , y la construccion de las equaciones determinadas de tercero y quarto grado ; hemos de confesar que toda esta doctrina está tratada por un término mucho mas sencillo y despejado en el Tomo IV. de los Elementos del P. Gherli, donde la aplicacion del Algebra á la Geometría está magistralmente declarada. Es tanto lo que nos ha dexado satisfechos , que si hubiéramos de formar hoy dia este Tomo tercero , sacaríamos gustosísimos todos los asuntos de que hemos dado hasta ahora individual razon de la Obra del Escritor Italiano. En ella está propuesta primorosamente la teórica de las curvas algebraicas , hermanando con tal destreza su autor el método de Euler con el de

Cra-

Cramer, que con extractar ambas Obras ha formado un tratado preciosísimo. Los entendimientos ansiosos de conocer diferentes caminos por donde llegar á un mismo paradero, hallarán en el tomo primero del Comentario de M. Castillon á la Arismética universal de Newton, otro modo de considerar los lugares geométricos, donde manifiesta, entre otras cosas, aquel diligente Comentador, siguiendo las huellas de Euler (10), como por la naturaleza de los factores del primer término de una equacion indeterminada, se averigua á qual de las tres secciones cónicas pertenece. Pero para trazar la seccion cónica cifrada en una equacion indeterminada, no hay método ninguno que en punto de elegancia y sencillez pueda competir con el de Herman, que con muchos, bien que muy merecidos elogios trae Vicente Ricati en sus Opúsculos.

Despues de todo lo declarado hasta aquí, solo nos faltaba para concluir este Tomo engolfarnos en el cálculo infinitesimal, cuyos dos ramos principales son el cálculo diferencial, y el cálculo integral. Solo el nombre de las cantidades que el cálculo diferencial considera, espanta á los principiantes; y hombres ha habido de mucho talento, y no menos doctrina, que le han mirado con desconfianza. Porque como el objeto del cálculo diferencial es, segun han dicho muchos, señalar la razon ó rela-

(10) *Introduc. in Analys. infin.* tom. 2.

lacion que hay entre los elementos infinitamente pequeños de las cantidades finitas , y una cantidad infinitamente pequeña parece incomprehensible ; experimentó desde su nacimiento este cálculo no poca oposicion de parte de algunos Matemáticos , y no halló en los principiantes la acogida que tan justamente se merece , por no haber manifestado sus fundamentos como debieran sus promovedores. La primera obra que se escribió de intento sobre este cálculo , fue tambien parto del Marques del Hospital (11) ; y aunque se hallan en este escrito todas las circunstancias que hacen recomendable todo lo que publicó este ilustre Matemático ; es á saber , claridad en la explicacion , elegancia en las construcciones , y tino en la eleccion de los egemplos , sin embargo no resuelve ninguna de las dudas que suelen ofrecerse acerca de los fundamentos de la doctrina que declara. Bien pudiera el Marques haberse tomado este trabajo á muy poca costa , pues tenia ya sentados estos fundamentos Newton , inventor de este cálculo (12) desde el año de 1687 por un término que no puede menos de dexar satisfecho á todo lector de bien organizado entendimiento (13).

El mismo descuido que el Marques del Hospital padeció , tambien le padecieron los mas de los Matemáticos,

que

(11) *Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes. Par M. le Marquis de l'Hospital.* Un tomo en 4. Paris 1699.

(12) Al mismo tiempo le inventó tambien Leibnitz en Alemania.

(13) Véase su grande Obra *Philosophiæ naturalis Principia Mathematica.* 1

que despues de él escribieron sobre este cálculo ; alentando su omision á algunos hombres poco afectos á este nuevo ramo de analysis , ó poco enterados de la gran conformidad de sus resultados con las ilaciones del método geométrico mas riguroso , para que escribieran contra su certeza. Cabalmente los mayores tiros se le hicieron en el mismo pais de su nacimiento , donde se publicó un libro con el título irónico de *el Analista* , cuyo autor se empeñó en desacreditar el cálculo diferencial. Pero salió allí mismo en su defensa el docto Maclaurin , Escocés (14), manifestando sus fundamentos por el método de los antiguos Matemáticos , y aplicándole de camino , igualmente que el cálculo integral , con suma felicidad y magisterio á muchísimos puntos de la Matemática mixta. Pocos escritos conocemos que acrediten tanto como la Obra de Maclaurin la profunda doctrina y penetracion de sus autores , y aconsejamos su estudio á todo aficionado que tuviere el noble deseo de ser matemático de provecho : no solamente conseguirá radicarse plenamente en los fundamentos del cálculo infinitesimal , mas tambien logrará aca-so adiestrarse en la práctica del método sintético , y podrá celebrarlo por mucha fortuna.

Las dudas y contradicciones que se originaron de haber

Tom.III.

b

ber

(14) *A Treatise of Fluxions in two Books.* By Colin Maclaurin , Professor of Mathematics in the Universiti of Edinburgh , and Fellow of the Royal Society : dos tomos en 4. Edimburg 1742.

ber andado tan descuidados los primeros matemáticos que escribieron sobre el cálculo diferencial en declarar sus fundamentos, ha obligado á los que han tratado despues el mismo asunto á manifestar quan seguro es el uso de este cálculo, probando que no es nada ageno del método geométrico mas riguroso. Así lo egecutó M. Euler en el cap. 3. del tomo primero de su Cálculo diferencial (15); M. D'Alembert en sus Miscelaneas (16); Ricati en el tomo segundo de sus Instituciones; y M. Cousin en sus Lecciones de cálculo diferencial é integral (17). Pero quasi todos estos escritores han seguido distintos rumbos en esta declaracion: Euler, de la consideracion de las diferencias finitas pasa á considerar las diferencias infinitamente pequeñas, que mira como un caso particular de las primeras; Ricati se empeña en hacer patente lo mucho que concuerda el modo de discurrir de los antiguos en la medicion de los espacios curvilineos con el que siguen los partidarios del nuevo cálculo, y tratando de la geometría del infinito, demuestra algunas proposiciones que son de muchísimo uso en la aplicacion de los métodos recientes; M. Cousin con-

(15) *Institutiones calculi differentialis cum ejus usu in Analysisi finitorum ac doctrina serierum. Auctore Leonhardo Eulero Sc.* Dos tomos en 4. Petersburgo 1755.

(16) *Melanges de Philosophie & Litterature.*

(17) *Leçons de Calcul différentiel & de Calcul integral, par M. Cousin, de l'Académie Royale des Sciences, & Lecteur Royal en Physique: dos tomos en 8. Paris 1777.*

sidera los infinitamente pequeños como el límite de la razón entre las diferencias finitas (18), y por último M. D'Alembert apea en pocas palabras, siguiendo y aclarando la doctrina de Newton, las dificultades que podrían molestar á los principiantes.

Por haber seguido M. D'Alembert las huellas de Newton, que considera el cálculo diferencial como el cálculo de los límites de las razones, y por la brevedad y magisterio con que le ilustra, copiamos en una introducción lo que trae sobre este asunto en la citada Obra, sin mas alteración que añadirle un pedacito sacado de Ricati (19), que tambien consideró este punto por el mismo lado que el Matemático Francés. Pero primero trasladamos del libro quinto del tratado Analítico del Marques del Hospital algunas proposiciones muy fundamentales para aplicar los nuevos cálculos á la geometría; por manera, que en lo que dexamos sentado de intento en el Tomo II. acerca del infinito, é infinitamente pequeño, y en lo que añadimos ahora en esta introducción hay, si no nos halucinamos, quanto se necesita para proseguir con toda confianza, y sin tropiezo alguno, el estudio del cálculo infinitesimal. Y últimamente, si hubiere alguno que no se dé por satisfecho, ni con lo que aquí publicamos, ni con lo que se ha-

b 2 lla

(18) En el capítulo segundo de su Obra hace acerca de los límites de las cantidades algunas consideraciones sumamente luminosas en esta materia.

(19) *Instit. Analytic. tom. 2.*

lla en las Obras citadas , acaso le satisfará mejor el P. Escarella en el tomo primero de su Física general (20), donde propone y satisface por el método de los escolásticos los mas de los argumentos con que se ha procurado desacreditar el cálculo diferencial. En el tomo segundo de su Algebra resuelve Saunderson una cuestion de Geometría Elemental, y hace acerca de su resolucion algunas consideraciones muy fundamentales sobre este asunto , y muy dignas de leerse.

En lo que hemos dicho acerca del rumbo que han seguido algunos Matemáticos para aclarar con toda evidencia los fundamentos de este cálculo , insinuamos que para explicarse á su satisfaccion acerca de las diferencias infinitamente pequeñas , esperaron sacar alguna luz de la consideracion de las diferencias finitas. Este es el motivo por qué trata de estas con algun cuidado el Sr. Euler en su Cálculo diferencial , y es el único Matemático del continente de Europa que sepamos se haya exercitado en esta materia (21). Sobre el método de las diferencias finitas , que Taylor , Inglés , su inventor , llama método de los incrementos , hay de Emerson un tratado de propósito (22), donde hace de este método , muy enlazado con el

(20) *Physica generalis methodo mathematico tractata. Auctore Joanne Baptistâ Scarella, Clerico Regulari*: tres tomos en 4. Brescia 1754. 57.

(21) Los demas le han copiado , ó extractado.

(22) *The method of increments. Wherein the Principles are demonstrated; and the practice thereof shewn in the solution of problems.* Un tomo en 4. Londres 1763.

el de las fluxiones , aplicaciones muy curiosas , que-
xándose en su Prólogo de que ha tenido pocos partida-
rios (23).

Hechos patentes los fundamentos del cálculo diferen-
cial , enseñamos cómo se diferencian las cantidades , sean
las que fueren , racionales , irracionales , logarítmicas , ex-
ponenciales , trigonométricas , y despues le aplicamos , co-
piando á M. Bezout , á la declaracion de algunos puntos
de la teórica de las curvas algebráicas , antes de dar á
conocer la naturaleza de algunas curvas transcendentales

Tom. III.

b 3

ó

(23) Oigamos cómo da esta quexa el mismo Emerson.

*The inventor of the method of in-
crements was the leanerd Dr. Tay-
lor, who, in the year 1717, publis-
hed a treatise of that method; and
afterwards gave some farther ex-
planation of the same in the Philo-
sophical Transactions, as applied
to the finding the sums of series.
But as the Doctor's writings upon
this subject, are all in latin, and
have never been translated entire;
and as his way of writing, is so
very short and abstracted, as not
to be obvious to common readers;
& has happened, that this elegant
method of computation has lain ever
since in obscurity, has been read
by few, and improved by none.*

“El inventor del método de los in-
crementos fue el docto Taylor , quien
„publicó en el año de 1717 un trata-
„do sobre este método , y despues le
„aclaró mas en las *Transacciones Fi-*
„losóficas , aplicándole á la sumacion
„de las series. Pero sobre que quanto
„Taylor escribió en este asunto está
„en latin , y jamas se ha traducido
„enteramente ; es por otra parte tan
„sucinto y abstracto su modo de es-
„cribir , que no son fáciles de enten-
„der sus escritos para el comun de
„los lectores , y esta ha sido la causa
„de haberse quedado desde entonces
„en la obscuridad este elegante méto-
„do de calcular , habiendo tenido lecto-
„res pocos , y promovedor ninguno.”

6 mecánicas , y particularmente de las espirales (24). Para representar su diferencial usamos la letra *d* , y no un punto , conforme estilan los Ingleses , que llaman la diferencial con el nombre de *fluxión* , y fluente á la cantidad finita , cuyo elemento es la diferencial. Seguimos esta práctica por ser la de todos los Matemáticos del continente de Europa , y porque no está expuesta á los inconvenientes de la otra. " Porque llamamos (dice Euler (25)) „ *diferenciales* las diferencias infinitamente pequeñas de que „ aquí tratamos , suele llamarse *cálculo diferencial* aquel „ cuyo obgeto es hallar las diferenciales , y aplicarlas á „ los usos para que se consideran. Los Matemáticos In- „ gleses , entré los quales Newton fue el primero que usó „ este cálculo , así como Leibnitz lo fue en Alema- „ nia , usan otros nombres y signos. Las diferencias in- „ finitamente pequeñas , que nosotros llamamos *diferencia-* „ *les* , ellos las llaman comunmente *fluxiones* , y algunas ve- „ ces *incrementos* ; cuyos nombres , por ser de un latin „ mas

(24) De estas curvas espirales hay un buen tratado en el tomo segundo de la Física de Escarela.

(25) *Quoniam differentias infinite parvas , quas hic tractamus , differentia- lia vocamus , hinc totus calculus quo differentialia investigantur atque ad usum accommodantur , appellari solet calculus differentialis. Mathematici Angli , inter quos primum Newtonus æque ac Leibnizius inter Germanos hanc novam Analyseos partem excolere cepit , aliis tam nominibus quam signis utuntur. Differentias enim infinite parvas , quas nos differentialia vocamus , potissimum fluxiones nominare solent , interdum quoque incrementa : quæ voces uti latino sermoni magis conveniunt , ita quoque res , quas denotant , satis commode*

„ mas castizo dan bastante á conocer las cosas que sig-
 „ nifican. Porque una cantidad variable ; que , al paso que
 „ crece , va adquiriendo succesivamente distintos valores,
 „ se puede considerar como que fluye ó corre , y de aquí
 „ es , que el nombre de fluxion , de que usó primero New-
 „ ton para expresar la rapidez en el crecer , sirvió des-
 „ pues por analogía para expresar el incremento infinita-
 „ mente pequeño que la cantidad adquiere como flu-
 „ yendo.

„ Y aunque es cierto que sería extraño el empeñar-
 „ nos en disputar con los Ingleses acerca del uso y de la
 „ significacion de las voces , y que perderíamos el pleyto en
 „ el tribunal de todo juez que atendiese á la pureza del
 „ latin , y á la propiedad de las expresiones ; sin embar-
 „ go no hay duda en que por lo tocante á los signos lle-
 „ vamos ventaja á los Ingleses. Porque ellos suelen seña-
 „ lar las diferenciales , á quien llaman fluxiones , con pun-
 „ tos puestos encima de las letras , de modo que la pri-

b 4

„ me-

*exprimunt. Quantitas enim variabilis crescendo continuo alios atque alios va-
 lores recipiens tanquam fluens considerari potest , hincque vox fluxionis , quæ
 primum à Newtono ad celeritatem crescendi adhibebatur , ad incrementum in-
 finite parvum , quod quantitas quasi fluendo accipit , designandum analogice est
 translata.*

*Quamvis autem circa vocum usum atque definitionem cum Anglis discepta-
 re absonum foret , nosque coram iudice puritatem latinæ linguæ , atque expres-
 sionum commoditatem spectante facile superaremur ; tamen nullum est dubium,
 quin Anglis ratione signorum palmam præripiamus. Differentialia enim , quæ
 ipsi fluxiones appellant , punctis , quæ litteris superscribunt , denotare solent,*

ita

„mera fluxion de y la pintan así $\dot{y}$, la segunda $\ddot{y}$, la tercera $\ddot{\ddot{y}}$, y las demas á este tenor. Bien que este modo de señalar , que es arbitrario , no se puede reprobar quando sea tan corto el número de los puntos que sean fáciles de contar ; no obstante , siempre que se hayan de escribir muchos , causarán no poca confusion , y muchos inconvenientes. La diferencial ó fluxion décima , por egemplo , será muy molesta de señalar de esta ma-

„
 „nera y , siendo así que señalada á nuestro modo $d^{10}y$, se percibe inmediatamente. Y casos suelen ofrecerse donde es preciso expresar órdenes mucho mas elevados é indefinitos de las diferenciales , para los quales de nada sirve el método de los Ingleses.

„ Usarémos , pues , nuestros nombres y signos , por-
 „ que aquellos se han connaturalizado con el uso en este
 „ país,

ita ut $\dot{y}$, iis significet fluxionem primam ipsius y ; $\ddot{y}$ fluxionem secundam ; $\ddot{\ddot{y}}$ fluxionem tertiam , atque ita porro. Qui notandi modus , uti ab arbitrio pendens , etsi improbari nequit , si punctorum numerus fuerit parvus , ut numerando facile percipi queat ; tamen si plura puncta inscribi debeant , maximam confusionem plurimamque incommoda affert. Differentiale enim seu fluxio decima per-

quam incommode hoc modo y representatur , cum nostro signandi modo $d^{10}y$ facillime comprehendatur. Oriuntur autem casus , quibus multo adhuc superiores differentialium ordines atque adeo indefiniti exprimi debent , ad quos Anglorum modus prorsus fit ineptus.

Nostris igitur tam nominibus quam signis utemur , quippe quorum illa in nostris regionibus jam sunt usu recepta , atque plerisque familiaria , hæc vero

„ país , y se han hecho familiares á los mas , y estos son
 „ mas acomodados. Pero no por eso ha sido impertinente
 „ hacer memoria de los nombres y signos que usan los In-
 „ gleses , pues con esto facilitamos la inteligencia de sus
 „ obras á los que las manejen. Porque tampoco están
 „ los Ingleses tan arrimados á su estilo , que desechen y
 „ se desdeñen de leer las obras escritas por nuestro mé-
 „ todo. Nosotros confesamos que hemos leído sus escritos
 „ con sumo gusto , y muchísimo fruto ; y se nos han ofre-
 „ cido repetidas ocasiones de reparar que ellos tambien han
 „ leído con aprovechamiento las obras de nuestros escri-
 „ tores. Por lo que , aunque sería muy del caso que unos
 „ y otros usásemos un mismo modo de expresar nuestros
 „ pensamientos ; sin embargo no es muy dificultoso el que
 „ nos enteremos todos de uno y otro , lo que basta por lo
 „ menos para la inteligencia de las obras escritas por el
 „ método ageno.”

Por lo que mira al modo de diferenciar , y á las mu-
 chas
*commodiora. Interim tamen non abs re erat Anglorum demonstrationes & sig-
 nationes hic commemorare , ut qui eorum libros evolvunt , eos quoque intelli-
 gere queant. Neque enim Angli suo mori tam pertinaciter adherent , ut quæ nos-
 tro more sunt scripta , prorsus repudient , nec legere dignentur. Nos quidem
 ipsorum opera maxima cum aviditate perlegimus , ex iisque summum fructum
 percipimus ; sæpe numero vero etiam animadvertimus , ipsos nostratium scrip-
 ta non sine utilitate legisse. Quamobrem etsi idem ubique atque æquabilis mo-
 dus cogitata sua exprimendi maxime esset optandus , tamen non admodum est
 difficile , ut utrique assuescamus , quantum quidem intelligentia librorum alie-
 no more scriptorum postulat.*

chas aplicaciones que hacemos del cálculo diferencial, hemos disfrutado tantas obras, que sin nota de pesadez no podríamos detenernos á especificar lo que de cada una hemos aprovechado. Bastará decir por mayor que todo está sacado del Marques del Hospital, de Bougainville (26), Thomas Simpson (27), Emerson (28), Ricati (29), Bezout (30), el Abate Marie (31), y otros escritores que luego nombraremos.

Para la cabal resolucion de la mayor parte de las cuestiones á que se aplican los nuevos cálculos, no basta considerar los límites de las razones de las cantidades finitas, es tambien preciso determinar estas cantidades, sacando su valor de las expresiones en que van cifrados dichos límites. Esta última operacion es de la incumbencia del

(26) *Traité du Calcul intégral, pour servir de suite à l'Analyse des infiniment petits de M. le Marquis de l'Hospital. Par M. Bougainville le jeune.* Dos tomos en 4. Paris 1754.

(27) *The doctrine and application of fluxions. Containing (Besides what is common on the subject) A number of new improvements in the theory. And the solution of a variety of new, and very interesting problems in different branches of the Mathematicks. By Thomas Sympson.* Dos tomos en 8. Londres 1750.

(28) *The doctrine of fluxions: not only explaining the elements thereof, but also its application and use in the several parts of Matematics and natural Philosophy. By Williams Emerson.* Un tomo en 8. Londres 1757.

(29) *Institutiones Analyticae.*

(30) Tomo IV. de su Curso para los Caballeros Guardias Marinas.

(31) De sus Lecciones, cuyo título copiamos en una nota del Prólogo del Tomo antecedente.

del cálculo integral, el ramo mas dificultoso de toda la Matemática Especulativa. El que atendiére á la importancia de este cálculo, echará de ver que nos hemos quedado muy cortos: nos conformamos sin quexa alguna con este juicio, pues segun el plan que desde los principios habiamos formado de todo este Curso, quisimos destinar un tomo, y era el quarto, para tratar con la competente individualidad muchísimos puntos de tan árduo asunto. Al tiempo de poner por obra este pensamiento nos acobardaron algunos recelos que hemos manifestado en el Prólogo del Tomo primero, y nos ceñimos en asunto de cálculo integral á los puntos mas precisos.

Sin embargo, sobre que nuestro tratadito de cálculo integral, bien que diminuto, basta para la inteligencia de todos los tratados siguientes, tambien incluye la resolucion de las principales cuestiones á que suele y debe aplicarse en toda obra elemental como la nuestra. Nos lisonjemos con que atendidas estas circunstancias, no desdiga de los tratados á que se sigue. Un autor que considera un objeto por el enlace que tiene con otros, dexa cumplidamente concluida su tarea siempre que toca todos los puntos en que estriba la trabazon de su asunto con los demás: solo al que escribe de propósito sobre una materia le toca incluir en su escrito quanto sobre ella hay que saber.

Es tan varia la índole de las cantidades cuya integracion se ofrece egecutar quando se aplica la Matemática Pura á la Mixta, que ha sido preciso apelar á recur-

sos muy varios para integrar las cantidades diferenciales, empeñándose los mayores calculadores de este siglo en buscar diferentes métodos de integracion, con la esperanza de que suplan unos lo que otros no alcanzan. Aunque desde la invencion del cálculo diferencial se manifestó la necesidad del integral, y le adelantaron no poco los Matemáticos de fines del siglo pasado, y principios del presente, es constante que sus mayores progresos los ha hecho de unos treinta años á esta parte. En Inglaterra Cotes (32), Maulaurin, y Thomas Simpson; en Francia M. Clairaut, D'Alembert, Bougainville, Fontaine, el Marqués de Condorcet, y los PP. Leseur, y Jacquier; en Alemania el Sr. Euler; en Italia la Señora Agnesi, Mr. de la Grange, la familia de los Ricatis, y otros matemáticos se han dedicado con mucha fortuna á promover este ramo de Analisis. De algunos de estos escritores hemos aprovechado lo que permitia nuestro intento; pero á ninguno

te-

(32) La Obra de Cotes salió en latin con este título : *Harmonia mensuratum*, pero tan dificultosa, que un Monge Benedictino, Inglés, se dedicó á aclararla, publicando de ella una traduccion francesa con este título : *Analyse des mesures des rapports & des angles; ou reduction des intégrales aux logarithmes, & aux arcs de cercle. Par Don Charles Walmsley, Benedictin Anglais.* Paris 1749. un tomo en 4. Está escrita con suma claridad esta obra, y algo la hemos disfrutado. El autor del original, Cotes, murió de edad muy temprana, dexando frustradas las grandes esperanzas que en su extraordinaria penetracion y tino matemático tenia fundadas el gran Newton, quien manifestando su sentimiento decia, que si Cotes hubiera vivido, hubiéramos sabido algo.

tenemos tanto que agradecer como á M. Bezout, de cuyo curso hemos copiado lo mejor y mas dificultoso que sobre este asunto publicamos, por lo bien digerido que trae lo que nos hacia al caso, y porque en punto de elegancia y claridad no conocemos autor ninguno elemental que le pueda competir.

En el cálculo integral se hace patente la necesidad de los métodos que propusimos en el Tomo II. para resolver las equaciones superiores; porque la integracion de las fracciones racionales, por egemplo, no se puede alcanzar en muchos casos, conforme lo insinuamos, sin hallar los factores de su denominador, ó, lo que es lo propio, sin sacar todas sus raices, sean iguales, desiguales, todas reales, ó imaginarias algunas de ellas.

Tambien manifiesta el mismo cálculo la precision de acudir á la doctrina de las lineas curvas, y esto sucede siempre que tropezamos con aquellas diferenciales que no sufren una integracion cabal, pudiéndose integrar todas ellas con suponer la quadratura de una curva algebraica, si la diferencial no llevare mas que un signo de integracion, ó de una curva mecánica, siempre que llevare muchos. Y porque entre las curvas algebraicas las mas familiares son las secciones cónicas, á su quadratura procuró Newton reducir quanto pudo las integraciones de esta naturaleza, que se deben reducir particularmente á la quadratura del círculo y de la hipérbola, por lo mucho que las tablas trigonométricas y logarítmicas abrevian los cálculos.

Sin

Sin embargo , como la rectificacion de muchas curvas es mas facil de conseguir que su quadratura , aunque sea envolviéndolas con un hilo , cuyo método mecánico puede bastar en muchos casos ; tiene mas cuenta valerse de este recurso para la integracion de las diferenciales que no caben en la regla fundamental. Pero el reducir una integral á la rectificacion de una curva algebraica es operacion sumamente trabajosa. Juan Bernouli abrió para esto el camino que otros Matemáticos han procurado allanar, haciendo general la proposicion de Newton , y dando á conocer los tropiezos que lejos de abreviar las integraciones , las harian mas trabajosas todavia siguiendo el mismo camino.

Con motivo de enseñar cómo se integran por aproximacion algunas diferenciales , volvemos á hablar de las series , declarando cómo se levanta á una potencia qualquiera una serie , ó un infinitinomio , cuya operacion es sumamente dificultosa sin el auxilio del cálculo diferencial (33). Los que hubieren llegado hasta esta parte de nuestro Curso , podrán acudir á una obra de Stirling , Inglés (34) , donde trata por un término nuevo algunos puntos muy importantes de la doctrina de las series. Entre otras

(33) Tambien enseñamos cómo se halla el radical , de dónde se deriva una serie propuesta , cuya operacion declaran poquísimos autores.

(34) Es obra original , y salió á luz con este título : *Methodus differentialis: sive tractatus de Summatione & interpolatione serierum infinitarum. Auctore Jacobo Stirling.* Londres 1764. un tomo en 4.

otras cosas enseña cómo se transforma una serie que converge muy lentamente en otra que converge con rapidez, cómo se suman las series que se derivan de la quadratura de las curvas, y otras muchas, que, sin que lo preven-gamos, se conoce que son de muchísima importancia para la integracion de las cantidades. Pero como las series no dan mas que valores aproximados, no hemos de apelar á este recurso, sino despues de muy experimentada la insuficien-cia de todos los demas; y aun entonces conviene sacarlas tan convergentes como sea posible, por no enredarnos en cálculos capaces de aburrir al mas infatigable calculador, á no ser que nos queramos contentar con valores que se aparten mucho del verdadero.

Incluimos en este Tomo la Trigonometría Esférica con la mira de que nos quedara mas lugar en el séptimo, que trata de Astronomía, en cuyas investigaciones hace esta Trigonometría mucho papel; y por no separarla de las analogías diferenciales que la completan, nos aparta-mos de la práctica general de todos los escritores, que suelen juntarla á continuacion de la Geometría Elemental con la Trigonometría Plana. A excepcion de algunas pro-
posiciones del Curso de M. Bezout, todo lo que pertenece á la resolucion numérica y gráfica de los triángulos esféri-cos es de M. Mauduit (35). De su obra hubiéramos copiado tam-

(35) El título de esta obra está copiado en una nota del Prólogo del To-mo antecedente.

tambien las analogías diferenciales , á no ser que habiendo hecho el ánimo de que fuese nuestra Astronomía un extracto de la de M. de la Lande , nos estaba mas á cuenta apropiarnos todo lo que este insigne Astrónomo trae sobre el mismo asunto en el tomo tercero de su Astronomía. Las proporciones que resuelven los triángulos , así rectilineos , como esféricos , no pueden dar cabal el valor de la cantidad que se busca , si en el cálculo se desentiende el calculador de la variacion que padece alguno de los datos ; pero saldrá verdadero su valor siempre que se llevare en cuenta esta variacion , sea incremento , ó decremento. Con todo eso , habia sido general el descuido de todos los Matemáticos en esta parte hasta que el célebre Cotes publicó un escrito (36) con el fin de manifestar los errores que de aquí se seguian en la Matemática Mixta , el qual se halla traducida en la Obra citada de M. Mauduit. Desde entonces salen mucho mas ajustados á la verdad los cálculos astronómicos , y todos los autores de Astronomía suponen conocida , ya que no la declaren , la doctrina de las analogías diferenciales.

Finalizaríamos aquí nuestro Prólogo , si no tuviéramos por indispensable satisfacer á muchísimos lectores , que no contentos con lo que publicamos de Matemática Especulativa , desearan saber en qué libros hallarán doctrina que mas quadre con sus fines ó su gusto. Ya hemos insinuado

mu-

(36) Con este título : *De Erroribus in mixta Mathesi.*

muchas veces que no conocemos para el caso obra ninguna que pueda compararse con los Elementos del P. Gherli, no solo por su claridad , mas tambien por la extension con que trata los asuntos. El estudio de esta Obra le aconsejamos á los que quisieren saber mucho , y mucho mas sabrán todavía si se alentaren á seguir otro camino , bien que no tan corto , ni tan llano. Despues de estudiado el Curso del P. Gherli , empenñense en estudiar la introduccion, el cálculo diferencial , y el cálculo integral de Euler (37);

Tom. III.

c

y

(37) *Institutiones calculi integralis. Auctore Leonhardo Eulero.* Tres tomos en 4. Petersburgo 1768 , 69 y 70.

De los elogios que he dado á las Obras de este gran Matemático siempre que se me ha ofrecido hacer mencion de alguna de ellas, se indicia el sumo aprecio en que las tengo. No conozco otras mas apropósito para el que desearé hacer sólidos progresos en el estudio de las Matemáticas; la inventiva de su autor, su extraordinaria destreza en todos los ramos de la Analisis, la multitud de los asuntos que ha tratado, y la profundidad con que los desentraña, preocupan á favor de los escritos que no se ha desdeñado de componer para los principiantes, de los quales han sacado no poco, muchas veces callándolo, los autores de algunas obras que he tenido presentes. Advirtiéndolo este docto varon estar errada la resolución de una cuestion que trae al tomo segundo de su cálculo integral, pág. 426, dice allí mismo pág. 429.

*Correctionem horum errorum
petere licet ex seq. probl. 154.
dum factores æquales in equa-
tionem peculiarem conjiciuntur.
Malui autem hunc correctionis
laborem industriæ lectorum re-
linquere, quam hoc opus à tali*

“ La enmienda de estos errores se saca
“ de la cuestion 54. que está mas adelante,
“ para quando se consideran los factores
“ iguales en una equacion particular. He te-
“ nido por mas conveniente dexar al cui-
“ dado de los lectores hacer esta enmienda,
“ que no quitar de mi tratado este descuido;
“ por

et-

y como tengan constancia hasta llegar al término de esta carrera , podrán lisongearse con que ya no habrá para ellos especie nueva en la Matemática Pura , ni tratado alguno que pueda molestarlos. Pero antes de estudiar el cálculo

errore liberare ; sæpe enim plus prodest errores , in quos etiam exercitatis incidere contingit , conservari , quo melius harum rerum studiosi addiscant quanta circumspectione cavendum sit , ne in ratiocinando hallucinemur

Quod ad factores imaginarios attinet , integralium inde notarum reductio facilius in genere instituetur , unde in his differentialium gradibus determinatis , non amplius immorabor. Factores autem æquales hic data opera pro singulis gradibus accuratius persequi est visum , quia supra nimis cito ad evolutionem generalem properanti in insignem errorem illabi contigit , quem statim feliciter evitassem , si eadem methodo ibi essem usus.

Hujusmodi autem vitium circa factores imaginarios hic non est pertimescendum , cum in hoc negotio nihil sub specie infinite parvi negligendum occurrat. Ex hoc autem fonte errores illi , quos supra commisi sunt nati , quod

vi-

in-
»por lo muy provechoso que suele ser de-
»xar en las obras los yerros que cometen
»sus autores , aunque muy exercitados,
»á fin de que los aficionados á estos estur-
»dios vean con cuánta circumspeccion debe
»proceder el que no quiera halucinarse al
»tiempo de discurrir.” Y hablando de lo
mismo , pág. 503. añade : “ Por lo que mi-
»ra á los factores imaginarios , la reduc-
»cion de las integrales que de aquí se deri-
»van , será mas facil de egecutar en gene-
»ral , por lo que no me detendré mas tiem-
»po en considerar los casos particulares.
»Pero en quanto á los casos en que hay fac-
»tores iguales , me ha parecido convenien-
»te recorrerlos de propósito con mas cui-
»dado respecto de cada grado , porque por
»haberme apresurado demasiado antes á
»sacar la evolucion general , caí en un error
»muy grande , lo que no me hubiera suce-
»dido , si me hubiese valido entonces del
»mismo método que ahora. Aquí no es de
»temer este tropiezo acerca de los factores
»imaginarios , porque no hay que despre-
»ciar cantidad ninguna en forma de in-
»finitamente pequeño. De esto se origi-
»nó el descuido que padecí antes , des-
»cuido que pide sutileza el advertirlo , y
»pa-

integral del Matemático Suizo , les tendrá muchísima cuenta estudiar el de los PP. Leseur , y Jacquier (38) ; cuyo tratado , sobre estar escrito con admirable método , y suma claridad , trae algunos modos de integrar , que no se hallan en la Obra de Euler , y tambien podrán leer las Lecciones de M. Cousin. Ha seguido este último autor en su tratado , para el qual ha disfrutado mucho las Obras de Euler , un rumbo del qual aseguramos que se agradarán no pocos lectores ; porque antes de enseñar cómo se consigue la integracion de algunas clases de diferenciales , propone las cuestiones de Matemática Mixta de las quales se originan , con cuyo artificio quita á varios métodos de integrar los visos de abstractos , que tienen en los mas de los escritores.

Los aficionados que no llevaren miras tan sublimes , podrán contentarse con el tomo III. del Curso de Hennert,

c 2

<i>vitium subtile quo clarius sub</i>	»para hacerlo mas patente manifestaré
<i>oculos ponatur , una cum neces-</i>	»ahora en qué consiste , y cómo se en-
<i>saria evolutione hic evolvam.</i>	»mienda.”

¡Cuán rara es esta ingenuidad en los semisabios! El que mucho sabe, sabe que le queda mucho que aprender , ó que está ceñida dentro de límites muy angostos toda la sabiduría del hombre ! Dichosos aquellos literatos que en pocos años , en pocos meses , y solo con leer un prólogo se imponen en una facultad , señalan á su antojo el lugar que correspondia á cada facultativo y á sus escritos , y hablan y deciden confiados de que mirándolos con especial predileccion los dotó naturaleza del don de nunca errar , ni en lo poco que saben , ni en lo mucho que ignoran.

(38) *Elemens du calcul integral. Par les PP. Leseur & Jacquier.* Dos tomos en 4. Parma 1768.

que compone un tratadito muy precioso de cálculo infinitesimal por el estilo Euleriano , que sigue el autor en todos sus tratados. En Emerson hallarán unas tablas muy socorridas para integrar , y muchísimas aplicaciones á varios asuntos. Simpson , no solo trae mas doctrina todavía, sino que en punto de claridad lleva tambien notabilísima ventaja á Emerson ; y finalmente, en el Curso del Abate Sauri (39), que se distingue poco de una traduccion de las Instituciones de Ricati , están extractadas algunas obras de cálculo integral , que por su gran dificultad han tenido hasta ahora pocos lectores. En el tomo quinto de esta última obra ván resueltas muchas cuestiones de Matemática Mixta , y algunas de ellas por el principio de la accion mínima , que abrevia mucho el camino de la verdad , cuyo principio es invencion de M. Euler , y aplica M. Cousin en sus Lecciones á la resolucion de una cuestion de Dinámica muy sonada en este siglo , cuyo empeño á su tiempo diremos en qué consiste.

Ya que nos hemos detenido tanto en especificar los principales asuntos que incluye este tomo , razon será que

ha-

(39) Se hallan extractadas en el Curso del Abate Sauri las obras que sobre el cálculo integral han publicado en Francia M. Fontaine , y el Marqués de Condorcet , ambos individuos de la Real Academia de las Ciencias. Pero se remontan tan alto estos insignes Matemáticos , que para muchos ha de ser penoso el estudio de sus escritos , y por lo mismo es de agradecer el trabajo de los que como el Abate Sauri , y los PP. Leseur y Jacquier han procurado facilitar su inteligencia á los principiantes.

hablemos tambien de los que hemos omitido , ó de intento , ó por olvido , y son la teórica de las curvas de doble curvatura , el método inverso de las tangentes , y la doctrina de las variaciones. Ninguna de estas omisiones tiene disculpa , pues aun quando no nos tocara internarnos en ninguno de los puntos omitidos , era indispensable manifestar por lo menos sus fundamentos , una vez que era mira y obligacion nuestra dar á la Nacion en su lengua una obra que pudiese enterarla de los principales descubrimientos que ha hecho la Matemática de un siglo á esta parte. No dexamos de conocer que si nos empeñáramos en cavilar , acaso no le faltarian á nuestro amor propio razones ó sofisterías con que disculpar estos descuidos ; pero quédese el hacer tan honrado uso de la dialéctica para aquellos escritores que tienen la particular fortuna de contemplarse infalibles ó irreprehensibles. A nosotros , cuyas pretensiones no pueden ser tan sublimadas, no nos queda otro recurso que enmendar , en lo que cabe, nuestro yerro antes de rematar este Prólogo.

Las curvas de doble curvatura son aquellas que ademas de la curvatura particular á su contorno ó perímetro , tienen la de la superficie sobre que están trazadas; tal sería , por egemplo , un círculo trazado en la superficie de un cono. Sobre estas líneas publicó Clairaut á los diez y seis años de su edad una obra (40) , por la qual

Tom. III.

c 3

to-

(40) *Recherches sur les courbes á double courbure.* Paris 1731 un tomo en 4.

todos los hombres grandes que habia entonces pronosticaron, y se verificó su pronóstico, que aquel muchacho llegaría á ser uno de los mayores Matemáticos de este siglo.

El método inverso de las tangentes consiste en hallar la equacion de una curva por medio de la expresion de su subtangente, normal, quadratura, &c. echándose de ver que estas operaciones son las inversas de las que proponemos en este Tomo núm. 371 y 564. Supongamos que $\frac{2y^2}{a}$ sea la expresion de la subtangente de una curva; por ser $\frac{ydx}{dy}$ la fórmula general de la subtangente, será $\frac{2y^2}{a} = \frac{ydx}{dy}$, de donde saldrá $2y^2dy = aydx$, $2ydy = adx$, é integrando sacaremos $\frac{2y^2}{2} = ax$, ó $yy = ax$, que es la equacion de una parábola cuyo parámetro es a .

El cálculo de las variaciones, invencion del célebre M. de la Grange, consiste en hallar las variaciones que padecen cantidades compuestas, como se quiera, de dos variables x é y , siempre que la equacion ó relacion primitiva entre dichas dos variables llega á padecer una mudanza cualquiera infinitamente pequeña. Sea, por egemplo, la equacion $ax = yy$, que corresponde á una parábola, cuyo parámetro es a , la abscisa x , y la ordenada y , y expresa la relacion entre a é y ; si en esta equacion hacemos una alteracion infinitamente pequeña (y esto se puede egecutar de mil modos distintos) si añadimos, pongo por caso, al parámetro una cantidad infinitamente pequeña δa , por manera que dicho parámetro llegue á ser $a + \delta a$, es evidente que á fin de que sea $yy =$ el producto $(a + \delta a)x$, se-

será preciso añadir tambien á la variable y un incremento infinitamente pequeño δy , para sacar la equacion variada $(a + \delta a)x = (y + \delta y)^2$, la qual discrepa infinitamente poco de la primitiva $yy = ax$. Dicha equacion variada corresponde á otra parábola, cuyo parámetro es $a + \delta a$, la abscisa x , la misma que antes, y la ordenada $y + \delta y$ que solo discrepa de la ordenada y correspondiente á la abscisa x de la primer parábola, una cantidad δy infinitamente pequeña.

“ Se considera, pues, dice Leonardo Euler (41),
 „ en el cálculo de las variaciones la relacion que hay, sea
 „ la que fuere, entre dos variables qualesquiera, expresada con una equacion qualquiera, por cuyo medio se
 „ determinan en virtud de cada valor particular que se la
 „ dá á x , los valores correspondientes de y , suponiendo
 „ entonces que á cada uno de los valores de y se le añaden, sea como fuere, unos incrementos infinitamente
 „ pequeños, de modo que sus valores variados discrepen
 „ infinitamente poco de los verdaderos que se deducen de
 „ la equacion primitiva; en este sentido se dice que varía la relacion entre x é y , y dichas partículas infinitamente pequeñas se llaman añadidas á los valores de y .
 „ Pero es de suma importancia tener presente que las variaciones ó incrementos que se conciben añadidos á cada valor de y , ni son iguales entre sí, ni dependientes

(41) En el tom. III. de su cálculo integral, pág. 161, y sig.

„ unos de otros ; pendiendo tanto de nuestro arbitrio , que
 „ todos ellos , excepto uno ó algunos correspondientes á
 „ ciertos valores de y , se pueden considerar como nulos.
 „ Estas variaciones no guardan ley ninguna , ni la rela-
 „ cion primitiva entre x é y influye en la determinacion
 „ de estas variaciones , que hemos de considerar como en-
 „ teramente arbitrarias.

„ De aquí se evidencia que las variaciones son to-
 „ talmente distintas de las diferenciales , aunque ambas son
 „ infinitamente pequeñas , y se desvanecen del todo ; por-
 „ que la variacion de y pertenece al mismo valor de x ,
 „ siendo así que la diferencial de la misma y ó dy , cor-
 „ responde al valor de x aumentado , ó á $x + dx$.

„ Por la idea que hemos dado en general del cálculo
 „ de las variaciones , prosigue el citado autor , queda du-
 „ doso de que sea de mucha utilidad , y así nos detendremos
 „ á manifestar su origen , refiriendo con qué motivo se ha
 „ inventado. Ha dado principalmente ocasion á este inven-
 „ to la resolucion de las cuestiones , cuyo objeto es deter-
 „ minar las curvas que gozan cierta propiedad de máximo
 „ ó mínimo ; y por no obscurecer este punto proponiéndole
 „ con mucha generalidad , nos pararemos á considerar la
 „ cuestion , que se dirige á hallar la linea curva , por la
 „ qual cae un cuerpo , con la circunstancia de que en el
 „ menor tiempo posible baxe desde un punto dado á otro
 „ punto dado. La naturaleza de los máximos y mínimos
 „ está manifestando desde luego que la curva ha de ser

„ de

„ de tal naturaleza , que si en su lugar se substituyere
 „ otra que discrepe infinitamente poco de ella , el tiempo
 „ de la baxada será de todo punto el mismo. Por consi-
 „ guiente la cuestion se debe resolver de manera que mi-
 „ rando como dada la curva pedida , el cálculo quadre
 „ tambien con otra curva que se diferencie infinitamente
 „ poco de ella , con el fin de calcular por este medio la
 „ diferencia que resulta en la expresion del tiempo ; por-
 „ que haciendo despues igual con cero esta diferencia , se
 „ inferirá la naturaleza de la curva pedida. Pero estas cur-
 „ vas que discrepan infinitamente poco de la que se bus-
 „ ca se determinan comodísimamente con suponer que á
 „ las aplicadas correspondientes á cada abscisa se las aña-
 „ den ó quitan porciones infinitamente pequeñas , ó con
 „ considerar que padecen variaciones. Por lo comun
 „ basta considerar esta variacion en sola una aplicada,
 „ bien que no tiene inconveniente alguno considerarla en
 „ muchas , ó en todas ellas , siendo siempre indefectible
 „ llegar á una misma resolucion. Por este medio , no solo
 „ se hace mas patente la excelencia del método , sino tam-
 „ bien se consiguen mas completas las resoluciones de las
 „ cuestiones á que se aplica , de modo que se extiende
 „ igualmente á cuestiones propuestas con otras circuns-
 „ tancias.”

ERRATAS.

<i>Página.</i>	<i>Linea.</i>	<i>Dice.</i>	<i>Léase.</i>
13	19	a , ó $-a$	a , o, $-a$.
24	22	del origen.	al origen.
35	17	el punto p	el punto P .
35	ult.	de su ege, ...	respecto de su ege
40	23	al otro lado del	al mismo lado que el
67	13	qualquiera de	qualquiera M de.
71	18	CA ó CA	CA ó Ca .
71	25	$\frac{ecxx}{tt}$	$\frac{ccxx}{tt}$.
94	8	$(BC)^2$ ó Pr , con. . .	$(BC)^2$, con.
110	ult.	$\frac{yy-cc}{r} : \frac{cc}{r}$	$\frac{yy-cc}{y} : \frac{cc}{y}$.
115	18	bc	bs .
124	18	segundo aplica	se aplica.
136	10	$x^3 = aay$	$x^3 = ayy$.
139	8	$y^n = x^m a^{m-}$	$y^n = x^m a^{n-m}$.
140	8	{ restando esta equa- cion de la	{ restando de esta equacion la.
152	11	de la segunda.	de la primera.
164	25	$\frac{1}{2}xx$	$\frac{1}{4}xx$.
171	10	$KH(CG)^2$	$KH :: (CG)^2$.
194	11	CKH	GKH .
215	20	porque como.	porque quando.
216	19	al otro del punto. . .	al otro lado del punto
222	22	$AB = ab$	$AB = b$.
224	12	$- 2nn$	$+ 2nn$.

Página.	Linea.	Dice.	Léase.
234	19	MD, MF	MF, MD .
254	7	$\frac{(dy)^2}{2y} + \frac{(dy)^3}{3y^2}$	$\frac{(dy)^2}{2y^2} + \frac{(dy)^3}{3y^3}$.
258	20	$\sqrt{(rr + xx)}$	$\sqrt{(rr - xx)}$.
259	12	son semejantes. . . .	son iguales.
161	1	de un arco.	{ de la cotangente de un arco.
261	23	diferencial.	{ diferencial, ni trans- cendental.
267	1	$y = \frac{a}{x}$	$y = \frac{ab}{x}$.
277	27	su	Su .
283	al marg. 263		163.
284	16	$\frac{ax+xx}{\frac{1}{2}a+x}$	$= \frac{ax+xx}{\frac{1}{2}a+x}$.
285	16	$b^2 - ay^2$	$b^2y - ay^2$.
285	24	$\frac{2ax-2xx}{3a-2x}$	$\frac{2ax-2xx}{3a-2x}$.
286	1	MH	MK .
287	1	BN, AB	$BNAB$.
287	22	CAH	GAH .
289	15	$\frac{ydx}{y} - x$	$\frac{ydx}{dy} - x$.
290	17	$\frac{ax^2}{3x\sqrt[3]{(a+x)^2}}$	$\frac{ax^2}{3x\sqrt[3]{x(a+x)^2}}$
303	22	$2ax + 2ay = cc$	$2ax + 2ay + 2xy = cc$.
305	9	$\frac{(a-x) \times dx + ydy}{\sqrt{[(a-x)^2 + yy]}}$	$\frac{(a-x) \times -dx + ydy}{\sqrt{[(a-x)^2 + yy]}}$.
305	20	centro C	centro B .
305	22	en c	en C .
306	11	$a(cc - 2ac)$	$a\sqrt{(cc - 2ac)}$.

<i>Página.</i>	<i>Linea.</i>	<i>Dice.</i>	<i>Léase.</i>
312	10	$ax^{m-2}dx$	$ax^{m-2}dx^2$.
337	15	<i>MRM.</i>	<i>MRm.</i>
337	ult.	<i>Mm.</i>	<i>MR.</i>
351	9	$y + dy : dy$	$y + dy : y$.
351	10	(324).....	(304).
357	14	(424).....	(II. 424).
363	4	zdz	$z^p dz$.
367	6	$-(c^3 + ba)^{\frac{3}{2}}$	$-(c^3 + ba^2)^{\frac{3}{2}}$.
370	18	denomin. $(\frac{4}{5} + 1)2b$...	$(\frac{4}{5} + 1)2b^2$.
383	18	$\frac{5x^4}{128r^6}$	$\frac{5x^3}{128r^6}$.
386	15	$+\frac{a^{12}}{11x^{11}}$	$+\frac{a^9}{8x^3} + \frac{a^{12}}{11x^{11}}$.
392	16	esto es $ax - xx$...	esto es $\sqrt{(ax - xx)}$
394	20	el arco M'	el arco AM' .
403	8	$x = z$	$x^y = z$.
410	21	en $= a^3x^{-2}$	en $y = a^3x^{-2}$.
411	8	mas.....	mas rápidamente.
413	23	$\sqrt[p]{(z^p a^{p-q})}$	$\sqrt[p]{(z^q a^{p-q})}$.
415	18	de a	de a y x .
416	8	$\frac{5x^9}{1252b^7}$	$\frac{5x^9}{1152b^7}$.
419	5	$-1 =$	$-\frac{1}{2} =$.
419	16	segmento.....	semisegmento.
434	21	abscisa.....	altura.
434	23	diferencia.....	grueso.
439	27	es $\frac{pbhxx}{2aa}$	es $\frac{pahbxx}{2aa}$.
441	1	x , y será.....	a , y será.

Página.	Línea.	Dice.	Léase.
441	6	$x = 0$	$x = a$.
444	15	$\sqrt{(ax - xx)}$	$\sqrt{(2ax - xx)}$.
447	25	APD.....	APM.
448	14	$2cy$	$2my$.
449	1	$\frac{m}{r}$	$\frac{m\lambda}{r}$.
457	3	si llamamos p	si llamamos $1:p$.
457	13	AB.....	AP.
459	21	$\sqrt{\left(\frac{a^4}{bc} - \right)}$	$\sqrt{\left(\frac{n^4}{bb} - \right)}$.
461	10	$-pc$	$-pc^2$.
466	4	$-3Ax$	$-3Ax^2$.
468	2	$x^m dx(a + bx^n)^{-r}$...	$x^m dx(a + bx^n)^{p-r}$.
475	11	$\frac{Qdx}{P}$	$\frac{Qdx}{P}$.
481	15	$\frac{x^{15}dx + adx}{x^{26} + x^{15}}$	$\frac{x^{15}dx + adx}{x^{20} + x^{15}}$.
487	14	$= \frac{dy}{y}$	$= \frac{bdy}{y}$.
487	20	$\frac{ax^p}{Le^p}$	$\frac{ax^p}{Le^p}$.
487	21	$\frac{ax^p}{e^p}$	$\frac{ax^p}{e^p}$.
488	25	arco.....	grado.
489	15	{ multiplicados uno por otro.....	{ múltiplos uno de otro.
489	26	$\mp(y\sqrt{-1}\sqrt{1-yy})$	$\mp(y\sqrt{-1}\sqrt{1-yy})$
491	10	$= e^{-x\sqrt{-1}}$	$= -e^{-x\sqrt{-1}}$.
491	18	$+ e^{-x\sqrt{1}}$	$+ e^{-x\sqrt{-1}}$.
493	20	$\frac{dP}{P}$	$\frac{dP}{P}$.

<i>Página.</i>	<i>Línea.</i>	<i>Dice.</i>	<i>Léase.</i>
495	17	$P = e^{\frac{gb+b'}{g+K}}$	$P = e^{\frac{gb+b'}{g+K}t}$
499	4	$(a + by)$	$(a + by^9)$.
499	15	$z - b^2$	$z - by^2$.
500	21	$+ yzdz$	$- yzdz$.
511		enfrente del n. 684 póngase á la	margen 265.
528	2	recíprocamente. . . .	respectivamente.
535	1	$\cos(\frac{1}{2} - c)$	$\cos(\frac{1}{2}s - c)$.
539	2	BAC	ABC .
544	17	MM	Mm .

De lo que contiene este Tomo III.

E lementos de Secciones cónicas. Introduccion,	Pág. 1.
De la Parábola,	32.
De la Elipse,	50.
De la Hipérbola,	82.
Formacion de las secciones cónicas en el cono ,y considera- ciones sobre algunos modos de trazarlas,	125.
De algunas otras curvas algebraicas,	134.
De las Parábolas é Hipérbolas de varios grados ,y parti- cularmente de la Parábola cúbica,	134.
De la Conchoide,	143.
De la Cisoide,	145.
De los Lugares geométricos,	146.
De los Lugares pertenecientes á la parábola,	147.
De los Lugares pertenecientes á la elipse ó al círculo,	161.
De los Lugares pertenecientes á la hipérbola referida á sus diámetros,	170.
De los Lugares pertenecientes á la hipérbola comparada con sus asyntotas,	176.
De la construccion geométrica de las equaciones del tercero y quarto grado,	183.
Construccion de las equaciones del tercero y quarto grado por medio del círculo ,y de una parábola dada,	184.
Satisfácese un reparo muy substancial acerca de esta cons- truccion,	199.
Resolucion de algunas cuestiones indeterminadas,	209.
Resolucion de algunas cuestiones determinadas,	222.
Elementos del Cálculo infinitesimal. Intraduccion,	227.
Del Cálculo diferencial,	244.
De las Diferenciales logarítmicas,	252.
De la Diferenciacion de las cantidades exponenciales,	256.
De las Diferenciales de los senos , cosenos , &c.	258.
De algunas curvas mecánicas,	261.
De la Quadratriz de Dinostrates,	262.
De la Espiral de Arquimedes,	264.
De la Espiral parabólica,	265.
De la Espiral hiperbólica,	266.
De la Cicloide,	267.
Aplicacion del cálculo diferencial á la doctrina de las li- neas curvas,	269.
De	

<i>De las subtangentes, tangentes, &c. de las líneas curvas,</i>	269.
<i>De las asyntotas rectilíneas de las líneas curvas,</i>	289.
<i>De los Límites de las cantidades, y de las cuestiones de máximos y mínimos,</i>	290.
<i>De las Diferencias segundas, y terceras, &c.</i>	310.
<i>De la fracción $\frac{0}{0}$, y de los puntos múltiplos de las curvas,</i>	313.
<i>De las Evolutas,</i>	329.
<i>De los Puntos de inflexion,</i>	342.
<i>Del Cálculo integral,</i>	347.
<i>Cómo se completan las integrales que dá el cálculo,</i>	363.
<i>De la integracion de las Diferenciales binomias, que admiten una integral algebraica,</i>	368.
<i>Uso de las series para integrar,</i>	374.
<i>Algunos usos del método de integrar por aproximacion,</i>	391.
<i>Integracion de las diferenciales, que llevan senos, &c.</i>	398.
<i>Usos del cálculo integral para quadrar las curvas.</i>	403.
<i>De la rectificacion de las curvas,</i>	422.
<i>Usos del Cálculo integral para medir la solidez de los cuerpos,</i>	433.
<i>Usos del Cálculo integral para hallar las superficies curvas de los sólidos,</i>	456.
<i>Métodos para reducir en algunos casos la integracion de una diferencial propuesta á la de otra diferencial conocida, y para conocer cuándo es posible esta reduccion,</i>	462.
<i>Integracion de las fracciones racionales,</i>	468.
<i>De algunas transformaciones que pueden facilitar las integraciones,</i>	478.
<i>De la integracion de las cantidades que llevan dos ó mas variables,</i>	481.
<i>De las Equaciones diferenciales,</i>	486.
<i>Trigonometría Esférica,</i>	505.
<i>Propiedades de los triángulos esféricos,</i>	510.
<i>Médios para conocer cuándo los lados ó ángulos que se buscan en los triángulos esféricos rectángulos han de ser mayores ó menores que 90°.</i>	516.
<i>Resolucion de los triángulos esféricos rectángulos,</i>	518.
<i>Resolucion de los triángulos esféricos oblicuángulos,</i>	523.
<i>De la resolucion gráfica ó geométrica de los triángulos esféricos qualesquiera,</i>	535.
<i>Demuéstranse algunas propiedades mas de los triángulos esféricos,</i>	550.
<i>De las Analogías diferenciales,</i>	556.

ELEMENTOS DE SECCIONES CÓNICAS.

INTRODUCCION.

1 **L**A teórica de las líneas curvas compone un ramo de las Matemáticas muy dilatado, cuya importancia corre parejas con su estension. Si la mira principal con que escribimos esta Obra no señalára límites muy angostos á los tratados de que debe tegerse, nos empeñaríamos gustosísimos en las investigaciones peculiares á este asunto; pero á pesar de la obligacion que nos corre de ceñirnos, no podemos dejar de tocar como de paso los fundamentos de la doctrina de las *curvas algebraicas*: lo que en orden á estas digéremos servirá como de introduccion á lo que llevamos ánimo de probar acerca de las curvas llamadas *secciones cónicas*.

2 Las líneas curvas han de ser regulares para poder servir de egercicio á una geometría rigurosa: quiero decir, que han de ser de tal naturaleza que se puedan trazar en virtud de una ley constante, que determine la situacion ó posicion de todos sus puntos. Toda linea regular tiene alguna propiedad uniforme que conviene igualmente á todos sus puntos, y que no conviene sino á ellos, y esta propiedad constituye la naturaleza ó esencia de dicha linea. La naturaleza del círculo, por egemplo, consiste en la igual-

Fig. dad de sus radios , cuya igualdad distingue la circunferencia del círculo de otra qualquiera linea curva , y determina la posicion de todos los puntos de la linea circular , fijándolos todos á la misma distancia del centro.

3 El principio fundamental de quanto han escrito los modernos acerca de las curvas consiste en espresar su esencia por una equacion algebraica. En el plano en que está
1. trazada una linea curva MM' , se toma á arbitrio un punto fijo A llamado *el origen* , por el qual se tiran á discrecion dos rectas AB, AD . Desde cada punto M de la linea MM' , se tiran rectas MP, MQ , paralelas á las rectas AB, AD hasta que las encuentren. La una, como MP ó su igual AQ , se llama la *Ordenada* ó *Aplicada* : la otra , como MQ ó su igual AP , se llama la *Abscisa*. Por lo que, la recta AB se llama la *Linea* ó *el Eje de las abscisas*, y la recta AD la *Linea* ó *el Eje de las ordenadas*, y el nombre de *Coordenadas* se dá á la abscisa y ordenada juntas pertenecientes á un mismo punto; MP y MQ , ó MP y PA , ó finalmente MQ y QA son las coordenadas del punto M .

4 La propiedad peculiar á cada punto de una linea regular (2) que constituye su caracter y distingue los puntos que la pertenecen de los que no son suyos , se reduce á cierta relacion entre las coordenadas que se cifra en una equacion algebraica indeterminada , cuya equacion se llama la *Equacion de la curva* , cuya naturaleza espresa.

5 Supongamos que siendo dado , por egemplo, el círculo

lo $mMm'm''M'$ trazado desde el centro C con el radio CM , Fig. 2.
 se nos pida la equacion que espresa su naturaleza. Señalo á arbitrio el origen en el punto A , tomo AB por la linea de las abscisas, y AD perpendicular á AB por la linea de las ordenadas, y si desde un punto M tomado á arbitrio en la circunferencia, se tiran MP , MQ paralelas á AD , AB , serán MP , MQ las coordenadas del punto M . Se me pide, pues, la equacion indeterminada que espresa su relacion de un modo general; esto es, que espresa no la relacion particular de las rectas MP , MQ trazadas en la figura, sino la razon general que hay entre la ordenada y la abscisa de un punto qualquiera de la circunferencia. Se ha de sacar esta equacion de la propiedad que tiene cada punto de la circunferencia $mMm'm''M'$ de estar á una distancia fija CM del centro C .

Pende, pues, esta propiedad de la longitud dada del radio CM , y de la situacion dada del centro C . La situacion del centro C respecto de las rectas AB , AD , á las quales se ha de referir todo, está determinada con tirar las rectas CF , CE paralelas á AB , AD . Porque siendo dada la posicion del centro C , y de las rectas AB , AD , será tambien conocida la cantidad de las rectas CF , CE ; y recíprocamente, siendo dadas de posicion las rectas CE y CF , estará determinada la posicion del centro C .

Representemos por letras estas rectas dadas, y llamemos CE , a ; CF , b ; y el radio CM , r . Representan, pues, las letras a , b , r cantidades constantes, que son siempre

Fig. unas mismas en qualquiera punto de la circunferencia que
 2. esté el punto M , por ser independiente su cantidad de la eleccion del punto M . Pero si representamos la abscisa AP ó MQ por la letra x , y la ordenada MP ó AQ por la letra y : estas dos letras x é y espresarán cantidades variables. Porque como busco una equacion que convenga igualmente á todos los puntos de la circunferencia, esto es, una equacion, que del mismo modo que espresa la relacion entre las coordenadas AP , PM del punto M , espreses tambien la relacion de las coordenadas AP' , $P'm'$ de otro punto qualquiera m' de la circunferencia; es preciso que espreses indistintamente la letra x la abscisa AP , y la abscisa AP' , y en general una abscisa qualquiera, y ha de espresar tambien la letra y la ordenada PM , y la ordenada $P'm'$, y en general una ordenada qualquiera: teniendo presente que x é y espresan en la equacion las coordenadas de un mismo punto, bien que de un punto qualquiera.

Para darnos mejor á entender ciñámonos al punto M . Si su ordenada PM corta la recta CF en G , tendremos $GM = MP - PG = MP - CE = y - a$, y $CG = CF - FG = CF - AP = b - x$. Pero por ser rectángulo el triángulo CGM , los quadrados de GM y CG juntos valdrán el quadrado de la hypotenusa CM . Luego $(y - a)^2 + (b - x)^2 = rr$, ó $yy - 2ay + aa + bb - 2bx + xx = rr$. Esta equacion no es privativa del punto M : conviene igualmente á otro punto qualquiera de la circunferencia, pongo

por

por caso , al punto m' . Porque respecto de este punto m' , Fig. 2.
 tenemos $m'G' = m'P' - P'G' = m'P' - CE = y - a$, y
 $CG' = FG' - FC = AP' - FC = x - b$. A mas de
 esto $Cm' = CM = r$. Luego la equacion $(m'G')^2 + (CG')^2 = (Cm')^2$ que se saca del triángulo rectángulo $CG'm'$, es-
 presada analyticamente será $(y - a)^2 + (x - b)^2 = rr$,
 ó $yy - 2ay + aa + xx - 2bx + bb = rr$, la misma
 cabalmente que nos dió el punto M .

Representa , pues , analyticamente esta equacion la
 naturaleza del círculo. Es de aquellas á quien los Analys-
 tas llaman indeterminadas , porque contienen dos incógni-
 tas , ó por mejor decir dos variables , cada una de las qua-
 les tiene una infinidad de valores , pero que estan con tal
 dependencia la una de la otra en virtud del enlace que en-
 tre ellas representa la equacion , que determinada la una de
 las dos variables , queda tambien determinada la otra. Si
 queremos que en la equacion $yy - 2ay + aa + xx - 2bx + bb = rr$, represente la variable x la abscisa deter-
 minada AP que llamaremos c , la equacion indeterminada
 se transformará en estotra igualdad determinada $yy - 2ay + aa + cc - 2bc + bb = rr$, en la qual y , que ya no
 es variable, sino incógnita, espresa el valor de la ordenada
 determinada PM . Y si le diéramos á x el valor d , que su-
 pondremos ser el de la abscisa AP' , la equacion indeter-
 minada se transformaria en estotra determinada $yy - 2ay + aa + dd - 2bd + bb = rr$, donde y , que yá es de-
 terminada , representa la ordenada $P'm'$.

Fig. 6 Podríamos representar por una equación mas sencilla la naturaleza del círculo , fijando en otro punto el origen. Si le señaláramos en el centro, siendo siempre las coordenadas perpendiculares entre sí , la abscisa x seria CP , y la ordenada y , seria PM ; y como en el triángulo rectángulo CPM , los cuadrados de las coordenadas son iguales al cuadrado del radio , sacaríamos para el círculo la equación $xx + yy = rr$, ó $yy = rr - xx$.

7 Sacaríamos tambien para representar la naturaleza del círculo una equacion mas sencilla que la primera (5) , si la sacásemos de otra propiedad de la misma curva. Consiste en que la perpendicular PM baxada desde un punto M (I. 474) del círculo á la linea AB , es media proporcional entre las dos partes AP y PB . Llamáremos , pues , AB , a ; AP , x ; PM , y ; será $PB = AB - AP = a - x$; y pues suponemos $AP : PM :: PM : PB$, será , substituyendo en lugar de estas lineas las letras que las representan , $x : y :: y : a - x$; de donde saldrá multiplicando estremos y medios $yy = ax - xx$, que tambien espresará la naturaleza del círculo.

8 Puede , pues , ser representada una misma línea por equaciones diferentes , cada una de las cuales la representa , digamoslo así , con distinto respecto. Consiste en gran parte la Analysis de las curvas en determinar de tal modo la posicion de los eges , que resulte para espresar una curva , la equacion mas sencilla , ó la mas adecuada al intento que lleva el calculador.

9 Antes de pasar adelante conviene prevenir que Fig. hay curvas regulares , cuya naturaleza no se puede expresar por una equacion analytica.

Supongamos , por egemplo , que sobre el diámetro AB 5. se trace un círculo ADB , y que bajando desde cada punto de la circunferencia una perpendicular DP al diámetro AB , se la prolongue hasta M de modo que sea PM igual al arco correspondiente AD : la curva AMC que pasare por todos los puntos M , será regular por ser trazada en virtud de una ley constante. Sin embargo no es posible cifrar su naturaleza en una equacion algebraica , porque considerando como abscisas los senos versos AP , no se conoce medio alguno algebraico para expresar su relacion con los arcos AD , ó con las ordenadas PM que son iguales á estos arcos , cuyo valor no se puede hallar exactamente.

A esta especie de curvas las llamamos *Curvas transcendentales*, *mecánicas* ó *irracionales* : para distinguirlas de aquellas que podemos representar por equaciones algebraicas , por cuya causa las llamamos *curvas algebraicas*, *geométricas* ó *racionales*. Para las curvas transcendentales es indispensable una especie de analysis conocida con los nombres de *cálculo infinitesimal*, *diferencial*; *cálculo fluxionario* ó *cálculo de las fluxiones*; de que trataremos mas adelante.

10 La diferencia esencial que hay entre las curvas geométricas y mecánicas , se percibirá mucho mejor quando hubiéremos tratado de unas y otras ; por ahora nos

- Fig. ceñirémos á especificar algo mas , aunque sea á costa de una repetición , las señales características de las curvas algebraicas. Es algebraica una curva 1.º Quando las dos coordenadas AP , PM son dos lineas rectas finitas que concurren en un punto P donde forman un ángulo dado APM . 2.º Quando la una de las coordenadas AP empieza constantemente en un punto fijo A , y se toma en una sola linea APP' , y la otra ordenada PM , $P'm$ es siempre paralela á sí misma. 3.º Quando su equacion puede no llevar mas que dos incógnitas x é y , que representan las coordenadas , y no contener sino especies que representen cantidades finitas. 4.º Su equacion ha de espresar la relacion entre cada punto de la curva cuya equacion es , y cada punto de la linea recta á la qual se refiere la curva : de modo que para cada punto de la curva sea siempre una misma la equacion.

- 11 Quanto declaramos en esta introducción debe solo entenderse de las curvas algebraicas que distinguimos en finitas , infinitas , y mixtas. Una curva es *Infinita* quando tiene ramos que se estienden al infinito , como las curvas 6. A, B, C, D, E, F . Es *Finita* una curva quando estando ceñida en un espacio limitado vuelve sobre sí , ora no dé mas que una vuelta , como el círculo ú como el óvalo G , ora se anude , y vuelva á anudar muchas veces como un 8 , ó como las figuras H, I, K, L, M . Finalmente , la llamamos *Mixta* quando despues de haber dado algunas vueltas en un espacio finito donde se dobla , arroja por fin

fin ramos al infinito , como N , O , P , Q .

Fig.

12 Todas estas inflexiones y curvaturas , y en general todas las singularidades de las curvas algebraicas , están tan fielmente cifradas en la equacion que espresa su naturaleza , que la curva trazada en el papel nada ofrece á la vista que no pueda leer en su equacion el que supiere descifrarla. Sucede aún que halla la Analysis en una curva calculando su equacion , singularidades que nunca podrian averiguar los sentidos por otro camino.

8.

Para enterarse del modo con que representa una equación el contorno de una línea , es menester considerar que la abscisa que es cero en el origen , vá creciendo por todos los grados imaginables hasta el infinito , así positivo , como negativo. La letra x que representa la abscisa , tiene pues sucesivamente una infinidad de valores diferentes positivos y negativos. Substituidos estos valores unos despues de otros en la equacion indeterminada de la curva , la transformarán en otras tantas equaciones determinadas en que no habrá mas incógnita que y , cuyos valores serán las raíces de dichas equaciones. Estos valores ó raíces espresan las ordenadas que corresponden á cada abscisa. Por lo que , tiene cada abscisa en su extremo una ó muchas ordenadas , segun tiene una ó muchas raíces la igualdad en que se transforma la equacion de la curva , quando se substituye en lugar de x el valor de la abscisa. Como la linea curva pasa por todos los extremos de estas ordenadas , tendrá tantos ramos quantos fueren los valores de y en la equacion. Y quando pue-

de

Fig. de el Álgebra hallar estos valores ; por ellos se conoce si los ramos á que pertenecen son finitos ó infinitos , qual es su direccion y posicion : en una palabra , quanto tienen de notable.

- Así la equacion del círculo dada arriba (5)
 $yy - 2ay + aa + xx - 2bx + bb = rr$, ó $yy - 2ay + aa = rr - bb + 2bx - xx$, ó $(y - a)^2 = rr - bb + 2bx - xx$, tiene dos raíces ó valores diferentes es á saber $a + \sqrt{rr - bb + 2bx - xx}$, y $a - \sqrt{rr - bb + 2bx - xx}$. Por lo que, cada abscisa $AP = x$ tiene dos ordenadas $y = PM$ ó PM' . Tiene pues la curva dos ramos que son las dos semicircunferencias , la superior mMm' , y la inferior $mM'm''$. La primera pasa por los vértices de todas las ordenadas $PM = y$ iguales á $a + \sqrt{rr - bb + 2bx - xx}$, y la segunda por los extremos de todas las ordenadas $PM' = y$ iguales á $a - \sqrt{rr - bb + 2bx - xx}$.

Pero en estotra equacion indeterminada $xx + 6ax + 5aa - 6ay = 0$, y no tiene mas que un valor $\frac{xx}{6a} + x + \frac{5}{6}a$. Por consiguiente cada abscisa de la curva que representa esta equacion no tiene mas que una ordenada. Hablando con propiedad no tiene la curva mas que un ramo ; pero este ramo se cuenta por dos , porque se estiende al infinito á la parte positiva y á la parte negativa.

13 No solo indica la equacion de una curva el número de sus ramos, sino que señala tambien su posicion. Los valores positivos de x representan abscisas positivas, y







los valores negativos de x representan abscisas negativas. Fig. Asimismo los valores positivos de y representan ordenadas positivas, y los valores negativos de y representan ordenadas negativas. Es uso comun, aunque arbitrario y libre, tomar las abscisas positivas ácia la derecha, y las negativas á la izquierda; las ordenadas positivas encima del eje de las abscisas, las negativas debajo. El ángulo BAD se llama el *Ángulo de las abscisas y ordenadas positivas* ó el *Ángulo de las coordenadas positivas*, porque cualquiera de los puntos de la curva que se hallare en este ángulo, tendrá positiva su abscisa y su ordenada. Por la misma razon BAd es el *Ángulo de las abscisas positivas y de las ordenadas negativas*; DAb el *Ángulo de las abscisas negativas y de las ordenadas positivas*; y finalmente dAb se llama el *Ángulo de las abscisas y ordenadas negativas*, ó el *ángulo de las coordenadas negativas*.

14 Quando puede resolver la analysis la equacion de una linea curva, sus raices manifiestan la posicion de los ramos de dicha curva, y señalan en qué ángulo ó en qué ángulos caen estos ramos. Quando en una raiz siendo positivas las x , lo son tambien las y , el ramo que dicha raiz representa, está en el ángulo de las coordenadas positivas; pero si las x positivas dán y negativas, está el ramo en el ángulo de las ab abscisas positivas, y de las ordenadas negativas. Si las x negativas hacen positivas las y , está el ramo en el ángulo de las abscisas negativas y de las ordenadas positivas; pero si á las x negativas corresponden y negativas, está el ramo en





Fig. en el ángulo de las coordenadas negativas.

Así, en la curva representada por la equacion $xx + 6ax + 5aa - 6ay = 0$, ó $y = \frac{xx}{6a} + x + \frac{5}{6}a$, manifiesta la equacion que en el origen donde x es cero, el valor de y es $\frac{5}{6}a$. Es pues $Aa = \frac{5}{6}a$ el valor de la primera ordenada. Suponiendo despues x positiva, se echa de ver que á medida que vá creciendo, los términos $\frac{xx}{6a}$ y x crecen tambien sin que disminuya el término constante $\frac{5}{6}a$; de donde resulta, que creciendo la abscisa x , la ordenada $y = \frac{xx}{6a} + x + \frac{5}{6}a$ que es positiva, crece tambien. Luego del lado de las abscisas positivas no tiene la curva mas que un ramo ad , que está todo entero en el ángulo de las coordenadas positivas, y que saliendo del extremo a de la primera ordenada Aa , se aparta al infinito del ege de las abscisas, y del ege de las ordenadas.

Para conocer el curso de esta misma linea ácia el lado de las abscisas negativas, haremos x negativa, cuyo supuesto transforma la equacion $y = \frac{xx}{6a} + x + \frac{5}{6}a$ en $y = \frac{xx}{6a} - x + \frac{5}{6}a$. Donde se ve que mientras fuere x menor que $6a$, $\frac{xx}{6a}$ no aumentará tanto el término constante $\frac{5}{6}a$, como le disminuirá el término negativo $-x$. Vá, pues, menguando al principio la ordenada y , á medida que crece x negativa, de modo que y , que en el origen era $\frac{5}{6}a$, disminuye hasta ser cero, en llegando á ser x igual á a . Porque entonces y es $\frac{aa}{6a} - a + \frac{5}{6}a = 0$. Si se toma pues la abscisa negativa AE igual á a , la ordenada de esta abscisa será cero, esto es la curva aE pasará por el punto E del ege de las abscisas.



6



8






Fig. 2.
 sas. Si prosiguiere creciendo la abscisa x ácia la parte negativa, llegarán á ser negativas las ordenadas, y lo son hasta que llegue á ser $x = 5a = AI$. Entonces vuelve á ser la ordenada igual á cero, $y = \frac{25aa}{6a} - 5a + \frac{5}{6}a = 0$. La curva, despues de haber pasado por debajo del ege de las abscisas hasta cierto término, vuelve á subir, y corta dicho ege en el punto I distante $5a$ del origen A . Prosiguiendo en crecer la abscisa x , siempre del lado negativo, vuelve á ser positiva la ordenada y , y llega á ser igual á la primera ordenada $Aa = \frac{5}{6}a$, quando x vale $6a$. Creciendo despues siempre x , el término positivo $\frac{xx}{6a}$ es mayor que el término negativo $-x$, y vá siempre creciendo la ordenada y á medida que crece la abscisa, de donde resulta el ramo infinito Im que se aparta al infinito del uno y otro ege.

Se hará facilmente cargo de todo esto, y verá patentemente el curso de la linea, el que substituyese succesivamente en la equacion $y = \frac{xx}{6a} + x + \frac{5}{6}a$, diferentes valores en lugar de x , como $3a, 2a, a, \text{ó } -a, -2a, -3a, -4a, -5a, -6a, -7a$ &c. y verá que á estas abscisas corresponden las ordenadas $\frac{5}{3}a, \frac{1}{2}a, 2a, \frac{5}{6}a, 0, -\frac{1}{2}a, -\frac{2}{3}a, -\frac{1}{2}a, 0, \frac{5}{6}a, 2a$. Hecho este cálculo, podrá trazar por puntos la porcion de la curva que coge desde la abscisa $3a$ hasta la abscisa $-7a$, quiero decir, que podrá determinar once puntos de la curva, bastante inmediatos los unos á los otros, para que sea facil trazarla con alguna exactitud, tirando con mano suelta una linea cur-

Fig. curva por estos once puntos. Para cuyo fin , despues de tiradas dos rectas AP , AQ que se corten, si se quiere, á ángulos rectos , en el punto A donde estará el origen, se tomarán en el ege de las abscisas AP , á mano derecha , tres partes AB , BC , CD iguales á la recta dada a , para sacar las tres abscisas positivas $AB = a$, $AC = 2a$, y $AD = 3a$, y á mano izquierda siete partes tambien iguales, para determinar las siete abscisas negativas $AE = -a$, $AF = -2a$, $AG = -3a$, $AH = -4a$, $AI = -5a$, $AL = -6a$, $AM = -7a$. Por los puntos D , C , B , E , F , G , H , I , L , M se tirarán paralelas á AQ , que serán las ordenadas de dichas abscisas , y se las dará la longitud calculada haciendo $Dd = 5\frac{1}{3}a$, $Cc = 3\frac{1}{2}a$, $Bb = 2a$, $Aa = \frac{5}{6}a$, $Ff = -\frac{1}{2}a$, $Gg = -\frac{2}{3}a$, $Hh = -\frac{1}{2}a$, $Ll = -\frac{5}{6}a$, $Mm = 2a$. Los puntos d , c , b , a , E , f , g , b , I , l , m determinados de este modo , son otros tantos puntos de la curva , que representa la equation $y = \frac{xx}{6a} + x + \frac{5}{6}a$, ó $xx + 6ax + 5aa - 6ay = 0$; y como están bastante próximos los unos á los otros , si fuere muy corta la recta a , se manifestará bastante la forma de la curva , trazando una linea por todos estos puntos.

15 Si consideramos la curva cuya equation es $xyx + 2axy - axx + aay = 0$, ó $y = \frac{axx}{x^2 + 2ax + a^2} = a\left(\frac{x}{a+x}\right)^2$, hallaremos que $x = 0$ dá tambien $y = 0$, de donde se infiere que pasa la curva por el punto A . Si tomamos despues succesivamente varias abscisas, todas positivas, mayores las unas que las otras, esto es, si x vá siem-

10.

pre

pre creciendo, el numerador y el denominador del quebrado $\frac{x}{a+x}$ crecerán tambien; pero crecerá el numerador á proporcion mas que el denominador. Por lo que, el quebrado $\frac{x}{a+x}$ y el valor $a\left(\frac{x}{a+x}\right)^2$ de la ordenada y irán creciendo de suerte que el ramo AB que está á la parte de las abscisas positivas, se halla entero en su parte superior respecto de la linea de las abscisas, de la qual se vá apartando mas y mas. No se aparta sin embargo al infinito, sino solo de un intervalo igual á la linea recta dada a . Porque aun quando fuese x infinita, se debería, considerar como igual á $a+x$ (II. 183), y y , que es siempre $a\left(\frac{x}{a+x}\right)^2$, sería igual á $a\left(\frac{x}{x}\right)^2 = a$.

Del lado de las abscisas negativas es mas singular el curso de esta curva. Para señalarle, supondremos x negativa en la equacion $xxxy + 2axy - axx + aay = 0$. de la curva, con lo que se transformará en $xxxy - 2axy - axx + aay = 0$ que se reduce á $y = a\left(\frac{x}{a-x}\right)^2$ ó $a\left(\frac{x}{x-a}\right)^2$ segun fuere x menor ó mayor que a . Veamos desde luego que ordenadas corresponden á las abscisas menores que a . Se echa de ver que quanto mas creciere x , tanto mas crecerá el numerador del quebrado $\frac{x}{a-x}$, y men- guará el denominador. El aumento del uno y la disminu- cion del otro contribuyen para que aumente el quebrado. Por consiguiente la ordenada $y = a\left(\frac{x}{a-x}\right)^2$ crecerá con la abscisa, pero con tal rapidez que llegará á ser infinita quan- do la abscisa $x = AC$ llegare á ser igual á a . Porque entón- ces $y = CD$ es $= a\left(\frac{a}{a-a}\right)^2 = \frac{a^3}{0}$: pero una cantidad finí-

Fig. ta a^3 dividida por 0 representa el infinito (II. 180), por que el cero ó por mejor decir una cantidad infinitamente pequeña cabe una infinidad de veces en una cantidad finita. Siendo despues la abscisa x mayor que a , la ordenada $y = a\left(\frac{x}{x-a}\right)^2$ será al principio excesivamente grande, por ser excesivamente pequeño el denominador $x - a$. Pero á medida que creciere x , crecerá tambien el denominador y aun con mayor proporcion que el numerador, de suerte que menguará la fraccion y con ella la ordenada y . Sin embargo no llegará sino hasta cierto punto esta disminucion; por que en llegando á ser infinita la abscisa, el denominador $x - a$ se deberá considerar como (II. 183) igual al numerador x . Es, pues, entónces $y = a\left(\frac{x}{x}\right)^2 = a$. Este ramo EF de la curva que corresponde á las abscisas negativas mayores que a , viene pues desde el infinito acercándose al ege de las abscisas: pero no se acerca mas que de la cantidad a . Todo el curso de la linea es, con poca diferencia [10. qual se representa en $BADEF$ que ha sido trazada por puntos en virtud del cálculo de las ordenadas cuyo resultado es el siguiente.

$$x = \text{inf. } 3a, 2a, a, 0, -\frac{1}{4}a, -\frac{1}{2}a, -\frac{3}{4}a, -a, -1\frac{1}{2}a, -2a, -3a, \\ y = a, \frac{9}{16}a, \frac{4}{9}a, \frac{1}{4}a, 0, \frac{1}{9}a, a, 9a, \text{inf. } 9a, 4a, \frac{2}{4}a,$$

16 Aunque los dos últimos egemplos están ceñidos á casos particulares, nos autorizan sin embargo para inferir dos consecuencias cuya generalidad se viene á los ojos.

1.º Una linea algebraica pasa por el origen, quando es tal su equacion, que el supuesto de $x = 0$ dá $y = 0$,
ó

ó es $y = 0$ una de sus raíces; ó quando en el supuesto Fig. de $y = 0$, es $x = 0$ una de sus raíces.

Por egemplo, si en la segunda equacion (15) $axy + 2axy - axx + aay = 0$ hacemos $x = 0$, se reducirá á $aay = 0$, cuya raíz es $y = 0$. Luego á la abscisa cero, quiero decir en el origen, corresponde la ordenada cero. Es, pues, ninguno el tamaño de la primera ordenada, se reduce á un punto, y la curva que por precision ha de pasar por el vértice de todas las ordenadas, pasa por el origen.

Pero $x = 0$ dá $y = 0$, siempre que la equacion de una línea no lleva término alguno constante, en que no esté ninguna de las indeterminadas x é y . Porque si en dicha equacion hacemos $x = 0$, todos los términos que llevarén x desaparecerán, y todos los términos que quedaren estarán multiplicados por y , pues suponemos que no tiene término ninguno que no lleve ó x ó y . Por consiguiente todos los términos que quedaren desaparecerán en el supuesto de $y = 0$. Forman, pues, una equacion que tiene una raíz $y = 0$. Luego á la abscisa $x = 0$ corresponde por lo menos una ordenada $y = 0$. Luego finalmente toda línea, en cuya equacion no hay término alguno constante, pasa por el origen.

17. 2.º Para hallar en que puntos una línea algebraica corta el ege de las ordenadas, no hay sino suponer en su equacion $x = 0$. Los valores de y que se sacaren de la equacion que diere este supuesto, determinarán los puntos donde

Fig. de la línea corta el ege de las ordenadas.

- Así, en el egeemplo propuesto (14) con hacer $x=0$ en la equacion $y = \frac{xx}{6a} + x + \frac{5}{6}a$, resulta $y = \frac{5}{6}a$. Por
9. cuya razon no pasa la curva por el origen A , pues $x=0$ no dá $y=0$; pero pasa por el punto a de la línea de las ordenadas que está á la distancia $Aa = \frac{5}{6}a$ del origen, porque $x=0$ dá $y = \frac{5}{6}a$.

Del mismo modo para averiguar en que puntos una línea algebraica corta el ege de las abscisas, se buscarán los valores de x en la equacion despues de transformada en otra con suponer $y=0$.

- En la misma equacion $y = \frac{xx}{6a} + x + \frac{5}{6}a$ ó $xx + 6ax + 5aa - 6ay = 0$, si hacemos $y=0$, saldrá $xx + 6ax + 5aa$, que tiene dos raices, es á saber $x = -a$, y $x = -5a$; por donde se echa de ver que encuentra
9. la curva el ege de las abscisas en dos puntos E, I ; esto es en los extremos de las abscisas $AE = -a$, y $AI = -5a$.

18 Pende pues la posicion de los ramos de una línea curva de sus abscisas y ordenadas, segun fueren positivas ó negativas, y manifiestan en qual de los quatro ángulos de las coordenadas están. Pero merecen tambien ser atendidas estas ordenadas aun quando las suministra imaginarias la equacion, y señala que son imposibles. En este caso desaparece la curva en todo el espacio á que corresponden las ordenadas imaginarias. Desaparece enteramente ó, por mejor decir, no representa la equacion curva algu-

na, quando son imaginarias todas sus raices.

Fig.

19. Una sola equation puede representar el conjunto ó sistema de muchas líneas trazadas sobre un plano. Esto sucede quando la equation es el producto de muchas equations racionales que representan diferentes líneas que tienen un mismo origen y unos mismos ejes. Porque si ordenamos muchas equations de modo que su segundo miembro sea cero, y las multiplicamos unas por otras; su producto formará una equation que tendrá por raices las raices de todas las equations de cuya multiplicacion resultare. Luego ya que cada raiz de una equation indeterminada espresa un ramo de la línea que representa dicha equation (12), el producto de muchas equations representará la curva que tendrá todos los ramos de las líneas particulares cuyas equations hubieren formado el producto. Representará, pues, el sistema de todas las espresadas líneas.

20. Por consiguiente quando pudiere resolverse una equation en otras equations racionales, será la línea que representa, el sistema de diferentes líneas. Pero quando fuere irreducible una equation, quando no tubiere divisor alguno racional, la línea que espresare deberá considerarse como una sola línea, aun quando tubiese ramos separados los unos de los otros.

21. Las líneas algebraicas consideradas analyticamente se dividen en varias ordenes, segun varían los grados de sus equations, cuyos grados penden, del mismo modo

Fig. que en las equaciones determinadas, del grado á que asciende el término mayor de la equacion. Pero como en las equaciones de las líneas algebraicas hay dos indeterminadas x é y , el grado de cada término se regula por la suma de los esponentes de las potencias de x é y . Los términos que no tienen sino constantes en que no hay ni x ni y , son del grado cero. Los que no tienen sino una x sin y , ó una y sin x , pero en los cuales esta indeterminada puede estar multiplicada por un coeficiente ó una cantidad constante qualquiera, como by ó cx , son términos del primer grado. Los términos del segundo grado son aquellos en que está xx , xy ó yy . Pero x^3 , $xxxy$, xyy , y^3 son los términos del tercer grado &c.

2 2 Se puede pues formar respecto de cada orden de líneas una equacion general que represente todas las líneas posibles de dicha orden, las cuales se dividen y subdividen despues en géneros y especies segun varían los coeficientes que multiplican los términos de dichas equaciones. La equacion $a + by + cx = 0$ espresa la naturaleza de las líneas de primera orden, porque no hay en ella término alguno que pase del primer grado. La equacion $a + by + cx + dyy + exy + fxx = 0$ representa las equaciones de segunda orden, porque no contiene término alguno que pase del segundo grado.

2 3 Una cosa muy particular hay que considerar acerca de esta division en órdenes de las líneas algebraicas, y es que es tan fija y constante la orden de cada curva, que
no

no se muda, aunque se represente por la equacion que se Fig.
quisiere. Quiero decir, que aunque se pueda espresar una
linea curva por una infinidad de equaciones diferentes, se-
gun se mudan el origen y la situacion de los eges; no
obstante, son siempre de un mismo grado estas diferentes
equaciones, y debe por consiguiente ser siempre de una
misma orden la curva.

24 Porque como es arbitraria (3) la posicion y el
origen de la linea de las abscisas, se puede mudar siem-
pre que se quiere esta posicion; de donde resultan (8) di-
ferentes equaciones, que representan todas una misma
curva. En muchísimos casos es de suma importancia trans-
formar, segun los fines que lleva el calculador, la equa-
cion de una curva en otra equacion que espresa la rela-
cion de otras coordenadas de la misma curva. Declararé-
mos en general como esto se puede egecutar.

Supongamos que siendo MN una linea algebraica cu- I I.
ya naturaleza está cifrada en una equacion qualquiera, que
señala la razon que hay entre las coordenadas AP y PM ,
se pida una equacion que espresa la razon entre otras coor-
denadas, como BQ y QM , en el supuesto de ser dados
de posicion los orígenes A y B , igualmente que los eges
 AP , AH ; BQ , BI . Por los puntos BQ extremos de la
abscisa BQ , se tirarán las rectas BC , QE paralelas á AH ,
y que rematen en AP ; y las rectas BD , QF paralelas á
 AP y que rematen en PM . Llamemos AP , x ; PM , y ;
 BQ , z ; QM , u ; AC , m ; BC , n . Fuera de esto, como to-
Tom.III.

Fig. dos los ángulos de los triángulos BQG y MQF son dados, es tambien dada la razon de sus lados, porque una vez que son dados los ángulos, son conocidos sus senos, cuya razon es la misma que hay (I. 671) entre los lados opuestos á dichos ángulos. Espresemos la razon entre BQ y BG por la razon de 1 á p . Luego $BG = pz$, porque $1:p::BQ:BG = pz$. Espresemos la razon de BQ á QG por $1:q$, en cuyo supuesto será $QG = qz$. Si espresamos la razon de QM á QF por $1:r$, y la de QM á MF por $1:s$, QF será $= ru$, y $MF = su$. Luego por ser $AP = AC + CE + EP = AC + BG + QF$, y por ser $PM = PD + DF + FM = BC + QG + MF$, tendremos $x = m + pz + ru$, é $y = n + qz + su$. Donde sucede que segun fuere la posicion de los orígenes A, B , y de los eges $AP, AH; BQ, BI$, algunas de las cantidades representadas por las letras $m, n; p, q; r, s$ pueden ser negativas. Pero sea como fuere, si en la equacion que espresa la razon de las coordenadas x, y , se substituye $m + pz + ru$ en lugar de x , y $n + qz + su$ en lugar de y , la transformada que espresará la razon entre z y u , será del mismo grado que la propuesta, y será siempre de la misma orden la curva que representáre.

El que hiciese estas substituciones en la equacion del círculo $xx + yy = rr$ (6), sacará una equacion del mismo grado que esta, que representará por consiguiente una curva de segunda orden, qual es el círculo.

25. Resulta, pues, de todo lo dicho (24) que pu-

pudiendo variar de infinitos modos, conforme quisiéremos, Fig. la posicion del ege y el origen de las abscisas A , se podrá representar una misma curva por una infinidad de equaciones; por lo que, no se puede inferir que pertenezcan á distintas curvas dos ó muchas equaciones propuestas, por que tengan distinta forma, bien que las curvas distintas tienen siempre equaciones diferentes. Pero suministra la analysis medios infalibles para decidir si pertenecen á una misma curva ó á distintas, equaciones diferentes que expresan la razon que hubiere entre unas coordenadas.

26 Por lo mismo que no muda de grado (23) la equacion de una línea algebraica, aunque se les dé á sus coordenadas la posicion que se quisiere, se sigue que una línea no puede ser cortada por una recta, sino en tantos puntos á lo mas, quantas unidades hay en el esponente de su orden; esto es, en un número de puntos igual al que expresa la orden de la curva: que una recta no puede cortar, por egeemplo, una línea de primera orden sino en un punto, una línea de segunda orden sino en dos puntos &c.

Porque siempre podemos tomar dicha recta por ege de las abscisas ó de las ordenadas si no lo fuere ya; y por esta transposicion de las coordenadas no muda de orden la curva. Hecho esto, para hallar todos los puntos donde la curva encuentra la recta, que supondremos ser el ege de las ordenadas, se ha de suponer la abscisa x igual á cero (17), y las raices y de la equacion que proviniere de este supuesto determinarán todos los puntos donde la recta encuentra

Fig. la curva; pero el número de estas raíces no puede ser mayor que el número de las unidades que espresa el mayor esponente de y , y este mayor esponente no puede ser mayor que el esponente de la orden de la curva (21 y 22). luego no puede la recta encontrar la curva sino en tantos puntos á lo mas quantas unidades hay en el esponente de la orden de la curva.

27 Es muy posible que la encuentre en menos puntos, y tambien que no la encuentre en ninguno. Porque en el supuesto de ser $x=0$, puede muy bien suceder que y tenga su mas alto esponente inferior al de la orden de la curva: puede suceder que esta equacion tenga algunas ó todas sus raíces imaginarias; de donde resultan intersecciones imaginarias que no existen: puede suceder que dos ó muchas raíces reales de la equacion sean iguales; en cuyo caso dos ó muchos puntos de interseccion se confunden en solo uno.

12. Sea, por egemplo, el círculo MEF trazado desde el centro C con un radio $CM=r$, y cuya equacion llamando z la abscisa CP , y u la ordenada PM es $zz + uu = rr$. Se pregunta ¿en cuántos puntos encuentra su circunferencia la recta AB que pasa por los puntos A y B de los eges CA , CB , cuyas distancias del origen son $CA=a$, y $CB=b$? Llamemos AB , c , y por causa del triángulo rectángulo ACB , tendremos $cc = aa + bb$. Si tomamos AB por ege de las ordenadas, considerando $AQ=x$ como la abscisa del punto M , y $QM=y$, paralela á AB , como su ordenada, tendremos (24) $u = \frac{by}{c}$, y $z = x - a + \frac{ay}{c}$.

La

La substitucion de estos valores de z y u en la equation Fig.
 $xx + uu = rr$, la transforma en $xx - 2ax + aa + \frac{2axy}{c}$
 $-\frac{2aay}{c} + \frac{aayy}{cc} + \frac{bbyy}{cc} = rr$, ó (porque $aa + bb = cc$) en
 $xx - 2ax + aa + \frac{2axy}{c} - \frac{2aay}{c} + yy = rr$, que espresa
 la naturaleza del círculo respecto de las coordenadas AQ
 y QM , ó x é y . Si en esta equation suponemos $x = 0$,
 se reducirá á $aa - \frac{2aay}{c} + yy = rr$, cuyas raices deter-
 minan las intersecciones del círculo MEF , y de la rec-
 ta AB .

Esta equation es de igual grado que la orden de la cur-
 va. Puede, pues, un círculo cortar una recta en tantos pun-
 tos quantas unidades hay en el esponente de su orden, esto
 es en dos puntos: esto se verifica quando las dos raices
 $y = \frac{aa \pm \sqrt{(a^4 - aacc + rrcc)}}{c}$, ó $y = \frac{aa \pm \sqrt{(rrcc - aabb)}}{c}$ de la equa-
 cion $aa - \frac{2aay}{c} + yy = rr$ son reales; porque estas raices
 espresan las dos ordenadas primitivas AE , AF , por cuyos
 extremos pasa la circunferencia. Pero quando son imagina-
 rias estas raices, lo son tambien las intersecciones. Esto su-
 cede quando $rrcc < aabb$, ó $rr < \frac{aabb}{cc}$, ó $r < \frac{ab}{c}$; esto es
 quando el radio $r = CM$ es menor que $\frac{ab}{c}$, que es la perpen-
 dicular CD' tirada desde el punto C á la recta $A''B''$. (El
 signo $<$ puesto entre dos cantidades significa que la que
 está del lado de la punta es menor, y la otra mayor). En-
 tonces las intersecciones F y E desaparecen: la recta no
 corta mas el círculo. Si estas dos raices llegan á ser iguales,
 como quando $rrcc = aabb$, ó $r = \frac{ab}{c}$, quando el radio CM
 es igual á la perpendicular CD' ; entonces los dos puntos
 de

Fig. de interseccion se confunden solo en uno , y el círculo no encuentra la recta $A'B'$ sino en solo el punto D' .

28 Ya que una recta no puede cortar una linea de primera orden , sino en solo un punto (26), la linea algebraica de primera orden no puede ser curva; porque una curva puede siempre ser cortada por una recta en mas de un punto. Luego *no hay mas linea algebraica de primera orden que la recta.*

Todo esto se confirma considerando las equaciones de esta orden que no pueden tener mas de tres términos, a , by , y cx . Pero pueden tenerlos ó todos tres , ó solos dos , ó solo uno , de donde nacen tres casos distintos.

29 CASO I. Quando es completa la equacion de primera orden , esto es , quando tiene sus tres términos , se puede siempre suponer que el término constante a es positivo , y está solo en el primer miembro. Los otros dos términos by y cx componen el segundo miembro , en el qual pueden ser ó positivos ó negativos. Sea AB la linea de las abscisas , y AD la de las ordenadas , formando una con otra un ángulo qualquiera DAB .

1.º Si en la equacion reducida á la forma que acabamos de decir b y c son positivas , y fuere la equacion $a = by + cx$, representará una recta. Para determinar su posicion basta hallar dos de sus puntos (I. 264) , aquellos por egemplo , donde corta los dos eges. Hallaremos el uno haciendo $x = 0$, y el otro haciendo $y = 0$. Si hacemos $x = 0$, la equacion $a = by + cx$ se reduce á $a = by$, ó

$y = \frac{a}{b}$. Se tomará, pues, en el ege de las ordenadas AD , Fig. 13. á la parte positiva AE igual á $\frac{a}{b}$, que es una quarta proporcional á la línea b , á la línea a , y á la línea que se toma por unidad, y estará determinado el punto E , donde la recta que se busca corta el ege de las ordenadas (17). Si suponemos $y = 0$, la equacion $a = by + cx$ se reduce á $a = cx$, ó $x = \frac{a}{c}$: de suerte, que tomando en AB ege de las abscisas á la parte positiva, la AC igual á $\frac{a}{c}$, que es quarta proporcional á c , a y 1 , quedará determinado el punto C donde la recta que se busca corta el ege de las abscisas. Solo falta tirar la recta CE , y será la línea que representa la equacion $a = by + cx$.

Porque si desde un punto qualquiera de dicha recta se tira una paralela á AD , se determinará una abscisa x y una ordenada y . Dicho punto se puede tomar ó en la parte EC , ó mas allá de C , ó mas allá de E . 1.º Si fuere M el punto entre E y C , la abscisa $AP = x$, y la ordenada $PM = y$ son ambas positivas. Los triángulos semejantes CAE , CPM dán $CA:AE::CP:PM$, esto es $\frac{a}{c}:\frac{a}{b}::\frac{a}{c}-x:y$. Luego $\frac{aa}{bc} - \frac{ax}{b} = \frac{ay}{c}$, ó transponiendo $\frac{ax}{b}$, multiplicando por bc , y dividiendo por a , $a = by + cx$. 2.º Si se tomare el punto m mas allá de C , la abscisa $Ap = x$ es positiva, y la ordenada $pm = -y$ negativa. Los triángulos semejantes CAE , Cpm dán siempre $CA:AE::Cp:pm$, ó $\frac{a}{c}:\frac{a}{b}::x - \frac{a}{c}:-y$. Luego $\frac{ax}{b} - \frac{aa}{bc} = -\frac{ay}{c}$, que se reduce tambien á $a = by + cx$. 3.º Si se toma el punto m' mas allá de E , la abscisa $Ap' = -x$ es negativa, y la ordenada $p'm' = y$

es

Fig. es positiva. Los triángulos semejantes CAE , $Cp'm'$ dan también $CA : AE :: Cp' : p'm'$, esto es, $\frac{a}{c} : \frac{a}{b} :: -x + \frac{a}{c} : y$, ó $-\frac{ax}{b} + \frac{aa}{bc} = \frac{ay}{c}$, que también se reduce á $a = by + cx$.

14. 2.º Si b y c fueren negativas, la equacion será $a = -by - cx$; y suponiendo $x = 0$, tendremos $a = -by$, ó $y = -\frac{a}{b} = AE$ negativa; y haciendo $y = 0$, tendremos $a = -cx$, ó $x = -\frac{a}{c} = AC$ también negativa. Y probaríamos como en el caso antecedente que EC es la recta que representa la equacion $a = -by - cx$.

3.º Si fuere b positiva y c negativa, la equacion será $a = by - cx$. Haciendo $x = 0$, tendríamos $a = by$, ó $y = \frac{a}{b} = AE$ positiva; pero haciendo $y = 0$, tendríamos $a = -cx$, ó $x = -\frac{a}{c} = AC$ negativa.

4.º Finalmente, si fuere b negativa, y c positiva, la equacion será $a = -by + cx$, y hallaremos que el supuesto de ser $x = 0$ dá $y = -\frac{a}{b} = AE$ negativa, y que del supuesto $y = 0$ sale $x = \frac{a}{c} = AC$ positiva.

Luego en general, si fuere completa la equacion de primera orden, y se la diese esta forma $a = \pm by \pm cx$, suponiendo a positiva, se verificará que:

13. Si b y c fueren ambas positivas, la recta EC subtenderá el ángulo de las coordenadas positivas: si b y c fueren ambas negativas, subtenderá EC el ángulo de las coordenadas negativas: si b , coeficiente de y , fuere positiva, y c , coeficiente de x , fuere negativa, EC subtenderá el ángulo de las ordenadas positivas y de las abscisas negativas: si b , coeficiente de y , fuere negativa, y c , coeficiente de x , fuere positiva, EC subtenderá el ángulo de las ordenadas negativas y de las abscisas positivas.

de x , positiva, EC subtenderá el ángulo de las abscisas positivas y de las ordenadas negativas. Fig. 16.

30 *Caso II.* Si no tubiere la equacion de primera orden mas que dos términos, será preciso que alguna de las cantidades a , ó b , ó c sea cero.

1° Si a fuese cero, $\frac{a}{b}$ y $\frac{a}{c}$ serán cero: serán nulas las partes AC , AE tomadas en los dos eges, y la recta EC pasará por el origen (16). Sin embargo estas partes AC , AE guardan aun quando se desvanecen, su razon de $\frac{a}{b}$ á $\frac{a}{c}$, ó de c á b : cuya circunstancia determina la posicion de la recta representada por la equacion $\pm by \pm cx = 0$. Porque si tomamos $Ac = c$ en el ege de las abscisas, y $Ae = b$ en el ege de las ordenadas, ambas positivas ó ambas negativas, si tubieren b y c distintos signos: pero la una positiva y la otra negativa, si tubieren b y c un mismo signo, y se tira la recta ec ; AM tirada paralelamente á ec por el origen A , será la recta cifrada en la equacion $\pm by \pm cx = 0$. Porque si bajamos la ordenada PM , los triángulos semejantes APM , Aec darán siempre $AP : PM :: Ac : Ae$, ó $x : y :: \pm b : \mp c$: de donde resulta $\pm by = \mp cx$ ó $\pm by \pm cx = 0$. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2° Si $b = 0$, será $\frac{a}{b}$ infinita. En el caso de ser infinita la recta AD , está el punto D á una distancia infinita de A , y la recta CE que saliendo del punto C vá á encontrarse con AD en el infinito, será (I. 3 26) paralela á AD . Será pues la recta que se busca CE paralela al ege de las ordenadas. Con efecto, qualquiera punto M que se tome de

Fig. de dicha recta, la abscisa MQ es siempre una misma, igual á $AC = \pm \frac{a}{b}$. Esto mismo está diciendo la equacion $x = \pm \frac{a}{c}$, ó $a = \pm cx$, á cuya forma se reduce la equacion general en virtud del supuesto $b = 0$.













20. 3° Del mismo modo $c = 0$ hace que $\frac{a}{c}$, esto es AB , sea infinita. Está, pues, á una distancia infinita del punto B , y la recta que saliendo desde E encuentra AB en el infinito, la es paralela. Se tomará, pues, en el ege de las ordenadas $AE = \pm \frac{a}{b}$, y se tirará EC paralela al ege de las abscisas. Cada punto M de dicha recta tiene su ordenada PM igual á $AE = \pm \frac{a}{b}$, y es representada por la equacion $y = \pm \frac{a}{b}$, ó $a = \pm by$, en la qual se transforma la equacion general $a = \pm by \pm cx$, en virtud del supuesto $c = 0$.

31 *Caso III.* Si la equacion de primera orden no tubiese mas que un término, no será á buen seguro, el término a , porque tendríamos $a = 0$, equacion imposible por ser a una cantidad dada; será pues el término by ó cx .

1° Si fuese $by = 0$ la equacion, tendríamos $y = 0$ que representa no mas que el ege de las abscisas. Las ordenadas á este ege serán cero, tómese en él la abscisa que se quisiere.

2° Si fuere la equacion $cx = 0$, tendríamos $x = 0$, que representa el ege de las ordenadas, á cada punto del qual corresponde una abscisa nula ó igual á cero.

32 Todo el empeño de los Analystas en la teoría ca así de las curvas algebráicas como de las demas, se di-





rige á conseguir su descripcion , porque este suele ser el paradero de todo problema geométrico. Pero como son muchos los puntos á que debe atender indispensablemente el que desea trazar una curva , ó los que le pueden manifestar su figura , este es el motivo de ser tan vasto este ramo de la aplicacion del Álgebra á la Geometría. Para la descripcion de las curvas coadyuva infinito 1°. saberlas tirar una tangente. 2°. saber en que parte de su curso tienen la mayor ó menor ordenada. 3° qué variedades padece su curvatura. 4° el número y especies de sus ramos &c. Bien que todos estos puntos se pueden declarar por los métodos *analyticos* que hemos propuesto , se aclaran sin embargo con mucha mas brevedad estos y otros de no menor importancia por métodos fundados en principios que propondremos en otro lugar. Sobreseéremos, pues, por ahora en estas discusiones, y solo indagaremos con el socorro de la *Analysis* cartesiana las propiedades de las curvas algebráicas conocidas con el nombre de secciones cónicas.

Son estas curvas las que resultan en la superficie de un cono recto cortándole con un plano; y aunque pueden resultar varias secciones, segun varía la direccion del plano secante , por *Secciones cónicas* entendemos particularmente las que se originan en la superficie del cono cortado con un plano que ni pasa por el vértice , ni es paralelo á la base del cono. Las que así se forman no son mas que tres , es á saber la *Parábola*, la *Elipse* y la *Hypérbola* , cuyas propiedades podriamos demostrar ó conside-

rán-

Fig. rándolas en el sólido del qual traen su origen, ó sacando de una propiedad conocida ó supuesta de cada una de ellas una equacion que nos guiára para inferir todas las demás. Pero tomaremos otro rumbo, que sobre ser igualmente seguro, quadra mejor en nuestro entender con las miras que llevamos.

De la Parábola.

33 Si le aplicamos á un plano una regla BC , y una escuadra GDO , de modo que la una GD de sus piernas se mantenga arrimada á dicha regla, y atamos el un cabo de un hilo FMO del mismo largo que la otra pierna DO de la escuadra, al estremo O de dicha pierna DO , y afiamos el otro cabo en un punto qualquiera F de dicho plano, que esté al mismo lado de la escuadra respecto de la regla; y si despues hacemos que el lado DG de la escuadra corra á lo largo de la regla BC , teniendo siempre tirante el hilo con un lápiz M , y su parte MO arrimada, y como pegada á la otra pierna OD de la escuadra; la curva AMX que trazare el lápiz en virtud de este movimiento, será una porcion de parábola.

Si se pasa la escuadra al otro lado del punto fijo F , se describirá del mismo modo la otra porcion AMZ de la misma parábola: de suerte que la línea XAZ será toda una misma curva, que llamaremos *Parábola*.

34 La línea BC , en la qual el borde inferior de la regla inmobile BC toca al plano y al lado DG de la escuadra GDO , se llama la *Directriz*.

35 El punto fijo F del plano se llama el *Focus* de la Fig. parábola.

21.

36 Si desde el punto fijo F se le tira á la directriz BC una perpendicular FE que encuentre la parábola en el punto A , la línea AF prolongada indefinitamente ácia F , se llama el *Eje* de la parábola.

37 Llámase *Parámetro* del eje una línea p quádrupla de AF .

38 Se llaman *Ordenadas* al eje todas las líneas tiradas como MP , desde los puntos de la parábola perpendicularmente al eje, y se llaman *Didmetros* todas las líneas como MO tiradas paralelamente al eje desde los puntos de la parábola.

39 Se llama *Tangente* en un punto de la parábola una recta que no la encuentra sino en dicho punto, y que continuada ácia ambos lados jamás corta la curva, y cae á la parte de afuera.

40 De la definición de la parábola se sigue 1.º que si por uno qualquiera M de sus puntos se tira al focus F una línea FM , y se la tira á la directriz BC una perpendicular MD , siempre serán iguales una con otra las rectas MF , MD . Porque si del lado OD de la escuadra, y del hilo OMF que le es (33) igual, se resta la parte comun OM , es evidente que siempre serán iguales una con otra las restas MD , MF .

41 2.º Que si tiramos una línea recta qualquiera KK paralela á la directriz BC , y desde un punto qualquiera M

Fig. de la parábola la MK perpendicular á KK , y la recta MF
 21. al focus, siempre será una misma la diferencia ó la suma
 KD de las dos líneas MF , MK ; esto es, la diferencia
 quando el punto M cayere debajo de KK , y la suma quan-
 do cayere encima.

42 3.º Que la parábola divide en A á la FE en
 dos partes iguales. Porque si suponemos que el punto M coin-
 cida con el punto A , la MF coincidirá con AF , y la MD
 con AE , cuyas líneas serán por consiguiente iguales, una
 vez que siempre es $MF = MD$ (40), esté donde es-
 tuviere en la parábola el punto M .

43 4.º De aquí se saca un método para trazar una
 parábola XAZ en el supuesto de ser dados su ege AP , su
 origen A , y su parámetro p . Porque si tomamos en el ege
 AP ácia ambos lados del punto A las partes AF , AE ca-
 da una igual á la quarta parte de su parámetro p , y por el
 punto E tiramos la indefinita BC perpendicular á EF ; si
 aplicamos el borde inferior de una regla á dicha línea BC
 que hace oficios de directriz, y trazamos una parábola XAZ
 conforme hemos dicho (33) por medio de una escua-
 dra ODG , y de un hilo FMO igual á la pierna OD , de
 manera que el uno de sus cabos esté afianzado en el fo-
 cus F , y el otro en el extremo O de la misma pierna, se
 viene á los ojos que dicha parábola será la que se pide.

Se viene tambien á los ojos, que quanto mas larga
 fuere la pierna OD de la escuadra, y el hilo $OMF = OD$
 (33); mas grande será tambien la porcion de la pa-
 rá-

rábola que se trazare ; por manera que se podrá trazar tan grande como se quisiere , haciendo que la pierna OD de la escuadra , y el hilo OMF sean mas largos. Fig.

44 5.º Si desde un punto qualquiera M de la parábola se tiran una ordenada MP al ege , y una recta MF al focus F , es evidente que dicha linea $MF = AP + AF$, una vez que $MF = MD = AP + AE$, y que (42) $AF = AE$.

45 El quadrado de una ordenada qualquiera MP al ege AP es igual al producto del parámetro p multiplicado por la parte AP del ege que está entre su origen A , y el punto P donde la ordenada encuentra dicho ege : quiero decir que $(MP)^2 = p \times AP$.

Llamaremos m la linea conocida AF ; x , la indeterminada AP ; é y , la indeterminada PM ; tendremos , pues , $MF = (44) m + x$, y $PF = x - m$, ó $m - x$, segun cayese el punto p debajo ó encima del focus F . En ambos casos el triángulo rectángulo MPF dá $(MF)^2 = (MP)^2 + (PF)^2$, esto es $mm + 2mx + xx = yy + mm - 2mx + xx$, de donde sacaremos $4mx = yy$. Luego ya que por lo dicho (37) $p = 4m$, tendremos tambien $yy = px$.

46 Es , pues , evidente 1.º que si llamamos p el parámetro del ege AP ; x , cada una de sus abscisas AP ; é y cada una de sus ordenadas correspondientes PM , siempre será $yy = px$. Y como esta propiedad conviene á todos los puntos de la parábola , y fija la posicion de dichos puntos de su ege AP ; se sigue que la equacion $yy = px$ espresa

Fig. perfectamente la naturaleza de la parábola comparada con su ege.

22. 47 2.º Si tiramos dos ordenadas cualesquiera MP y NQ al ege AP , sus cuadrados serán unos con otros, como las partes AP , AQ del ege que cogen desde su origen A á los puntos P y Q donde estas mismas ordenadas encuentran el ege. Porque (45 y 46) $(PM)^2 : (QN)^2 :: p \times AP : p \times AQ :: AP : AQ$.

48 3.º Si por un punto cualquiera P del ege AP tiramos una paralela MPM á sus ordenadas, esta paralela encontrará la parábola en dos puntos M y M igualmente distantes por ambos lados del punto P , y no la encontrará en mas puntos. Porque para que los puntos M y M pertenecan á la parábola, es preciso (46) que cada uno de los cuadrados de cada $PM = y$ que está al uno y otro lado del punto P , sean iguales al mismo rectángulo px .

22. 49 4.º De la equacion (46) $xy = px$, se sigue con evidencia que quanto mayor fuere $AP = x$, tanto mayor será tambien la ordenada $PM = y$ al uno y otro lado del ege AP ; y por el contrario, que quanto menor fuere $AP = x$, tanto menor será tambien la ordenada $PM = y$: de manera que quando AP fuere nula ó cero, cada PM al uno y otro lado del ege AP , tambien será nula: quiero decir, que quando el punto P coincidiere con A , los dos puntos de concurso M y M se confundirán con dicho punto. De donde se sigue

1.º Que si por el origen A del ege se tira una línea

LL

LL paralela á sus ordenadas, dicha linea será tangente Fig. en A .

2.º Que por ambos lados vá la parábola alejándose mas y mas al infinito de su ege AP , empezando desde su origen A ; y que de este modo toda paralela como LM al ege AP no encuentra la parábola sino en solo un punto M , y pasa por dentro de ella, una vez que dicha paralela se mantiene constantemente á una misma distancia del ege.

5.º Si desde un punto qualquiera M de la parábola se tira una paralela ML al ege AP , que encuentre en L la AL paralela á sus ordenadas; es evidente que, tirando MP , $AL = PM = y$, y que $ML = AP = x = \frac{xy}{p}$, por ser $px = yy$. De donde se sigue que las rectas ML , ML ó $\frac{yy}{p}$, $\frac{yy}{p}$ tomadas al uno y otro lado del ege AP son iguales una con otra, quando los puntos L y L están igualmente distantes del punto A ; y por lo mismo, que si una linea qualquiera MM que remata en la parábola está dividida en dos partes iguales por el ege en P , será paralela á la linea LL , esto es que será ordenada al uno y otro lado del ege. Porque si tiramos las paralelas ML , ML al ege AP , es evidente que LL estará dividida por el medio en A , una vez que MM lo está en P ; luego las rectas ML , ML serán iguales una con otra, segun acabamos de probar, y por consiguiente MM será paralela á LL .

6.º Una vez que todas las perpendiculares MPM al ege AP , que por ambos lados rematan en la parábola, están divididas (48) por el medio en P , se sigue que

Fig. el ege divide la parábola en dos porciones enteramente iguales, y colocadas del mismo modo cada una á un lado distinto del ege. Porque si dobláramos á lo largo del ege el plano en que está trazada, de forma que se juntasen sus dos partes, es evidente que coincidirían exactamente una con otra las dos porciones de la parábola.

- 5 2 Si por el origen A del ege AP se tira una línea
 2 3. recta cualquiera AM en cualquiera de los dos ángulos que forman el ege AP y la línea LL paralela á sus ordenadas; dicha recta AM encontrará la parábola MAM en otro punto M .

Tomemos en la AL á qualquiera lado del punto A la parte AG igual al parámetro p del ege, y tirémos GF paralela al ege AP , que encuentre la AM , prolongada si fuere menester, en el punto F ; tomemos en la AL al mismo lado donde cae la AM respecto del ege AP , la parte AL igual á GF , y tiremos LM paralela al ege; el punto M donde LM encuentra la AM , será uno de los puntos de la parábola MAM .

Porque si tiramos MP paralela á AL , los triángulos semejantes (I. 460) FGA , APM darán FG ó AL ó $PM:GA::AP:PM$, y por consiguiente $(PM)^2 = AP \times GA = AP \times p$; luego la línea PM será (46) una ordenada al ege AP .

5 3 En virtud de esto se echa de ver 1° que si en el supuesto de ser dado el ege AP de una parábola MAM con su parámetro p , tiramos por el origen A del ege en qual-

qualquiera de los dos ángulos PAL , PAL que forman el Fig. ege AP y la linea LL paralela á sus ordenadas, una rec- 23. ta qualquiera AM ; se echa de ver, digo, como se podrá hallar el punto M donde la recta AM encontrará la parábola MAM .

54 2.º Que no hay mas linea (49 y 52) que la LAL paralela á las ordenadas al ege AP que pueda ser tangente de la parábola MAM en el punto A origen del ege; porque no hay mas linea que esta que junte las dos circunstancias de pasar por el punto A , y de mantenerse fuera de la parábola, aunque se lo prolongue infinitamente.

55 Si por un punto qualquiera M de la parábola 24. se tiran un diámetro MO , una ordenada MP al ege AP , 25. y una recta MT que corte en el ege AP , prolongado mas alla de su origen, la parte $AT = AP$; todas las rectas como NO , tiradas desde los puntos de la parábola paralelamente á MT , que rematan en el diámetro MO , se llaman *Ordenadas* á dicho diámetro.

56 Una linea q tercera proporcional á AT y MT , se llama el *Parámetro* del diámetro MO .

57 De aquí se sigue 1.º que si llamamos x la indeterminada AP ó AT , será $(MT)^2 = qx$, por ser $AT = x$: MT :: MT : q .

58 2.º Por razon del triángulo rectángulo MPT será $(MT)^2 = (PT)^2 + (MP)^2$ ó $qx = 4xx + px$; de donde sacaremos, dividiendo por x , $q = 4x + p$; quiero decir que el parámetro q de un diámetro qualquiera MO es mayor que el

Fig. parámetro p del ege, del quadruplo de $AP = x$.

59 3.º Si desde el punto M se le tira al focus F la

24. recta MF , resultará $MF (44) = AP + AF$. Pero

25. siendo (37) el parámetro del ege, $p = 4AF$, el parámetro del diámetro MO será (58) $q = 4AP + 4AF$; luego el parámetro q de un diámetro cualquiera MO , vale quatro veces la linea MF tirada desde su origen M al focus F .

24. 60 El quadrado de una ordenada cualquiera ON al

25. diámetro MO es igual al rectángulo del parámetro q por la parte MO de dicho diámetro, que está entre su origen M y el punto O donde le encuentra la ordenada; quiero decir que $(ON)^2 = q \times MO$.

Tiraremos la ordenada NQ al ege AP , que encuentre en R al diámetro MO , y tiraremos la OH paralela á MP ; llamaremos AP ó AT , x ; PM ó RQ , y ; OR ó HQ , a ; MO ó PH , b ; los triángulos semejantes (I. 461) TPM , ORN darán esta proporcion $TP : PM :: OR : RN$, ó substituyendo en lugar de estas lineas sus valores, $2x : y :: a : RN = \frac{ay}{2x}$. Sentado esto,

24. Ya que $NQ = RQ - RN = y - \frac{ay}{2x}$, ó $NQ = RN - RQ = \frac{ay}{2x} - y$, y $AQ = AH - HQ = x + b - a$, quando el punto N cae al otro lado del ege AP respecto del diámetro MO ; y por el contrario $NQ = RQ + RN = y + \frac{ay}{2x}$, y $AQ = AH + HQ = x + b + a$, quando cae al lado opuesto: tendremos $(QN)^2 = xy \pm \frac{a^2 y^2}{x} + \frac{a^2 y y}{4xx}$, y $AQ = x + b \pm a$, esto es, — en el primer caso,

y + en el segundo. Pero (47) $AP: AQ :: (PM)^2: (QN)^2$, ó substituyendo sus valores, $x: x + b \pm a :: yy: (QN)^2 = yy + \frac{byy}{x} \pm \frac{ayy}{x}$. Luego comparando uno con otro estos dos valores de $(QN)^2$, saldrá la equacion $yy + \frac{byy}{x} \pm \frac{ayy}{x} = yy \pm \frac{ayy}{x} + \frac{aayy}{4xx}$, de donde se sacará, borrando en ambos miembros $yy \pm \frac{ayy}{x}$, dividiendo por yy , y multiplicando por $4xx$, $(OR)^2 = aa = 4bx$; pero los triángulos semejantes MPT , NRO dan $(PT)^2: (OR)^2 :: (MT)^2: (ON)^2$ ó $4xx: 4bx :: qx: (ON)^2 = bq = q \times MO$; luego &c.

61 De aquí resulta visiblemente 1.º que quanto probamos (45) respecto del ege AP , sus ordenadas y su parámetro, se verifica igualmente en un diámetro cualquiera MO , sus ordenadas ON , y su parámetro q . Pero como de lo probado (45) se infiere todo lo que digimos (46.....54) y subsiste del mismo modo, sean ó no rectos los ángulos APM ; se sigue que si en lo que allí digimos imaginamos que en lugar de ser el ege la linea AP , sea un diámetro cualquiera cuyas ordenadas sean las rectas PM , QN , y su parámetro sea la linea p , será tambien cierto en este supuesto; se demostrará del mismo modo.

62 2.º Como son tambien verdaderas las dos proposiciones demostradas (49 y 54) quando la linea AP en vez de ser el ege es un diámetro cualquiera, como MO ; se infiere que la linea MT paralela á las ordenadas ON á dicho diámetro, es tangente en M , y que no hay mas linea que esta que pueda tocar la parábola en el punto M . De don-

24.

25.

Fig. donde resulta que por un punto dado de una parábola no puede pasar mas que una tangente.

24. 63 3° Infiérese de aquí, y de lo dicho (55) que
 25. si por un punto qualquiera M de una parábola tiramos una ordenada MP al ege AP , y una recta MT que corte en el ege prolongado mas allá de su origen A la parte $AT = AP$; la linea MT será tangente en M . Y recíprocamente, si la linea MT fuere tangente en M , y tiramos la ordenada MP al ege, será $AT = AP$.

- 64 4° Si en lo dicho (55 y 56) suponemos que la linea AP en vez de ser el ege sea un diámetro qualquiera, cuyas ordenadas sean las rectas PM, QN ; echaremos de ver que todo será tambien verdadero en este supuesto, y se demostrará del mismo modo, y basta para percibirlo considerar la figura, en la qual los triángulos semejantes dan las mismas proporciones que en el caso de ser AP el ege.

Por consiguiente es tambien verdad lo que decíamos poco ha (63) quando AP es un diámetro y no el ege, y podemos considerar el ege como un diámetro que forma ángulos rectos con sus ordenadas.

- 65 Si por un punto qualquiera M de una parábola
 27. se tira una ordenada MP al ege, y una perpendicular MG á la tangente MT que pasa por el punto M ; la parte PG del ege será constantemente igual á la mitad de su parámetro p , quieró decir que $PG = \frac{1}{2}p$.

Porque de los triángulos semejantes TPM, PMG sa-

caremos $TP:PM::PM:PG$, esto es $2x:y::y:PG$ Fig.
 $= \frac{yy}{2x} = \frac{1}{2} p$, despues de substituido px en lugar de yy
 (46).

66 Si por un punto qualquiera M de una parábola, 27.
 tiramos al focus F la recta MF , un diámetro MO , y la
 tangente TMS ; los ángulos FMT , OMS que forma la tan-
 gente TMS respectivamente con la recta MF , y con el diá-
 metro MO , serán iguales.

Porque si tiramos el ege AP que encuentre en T la
 tangente TMS , y la ordenada MP al ege; será (63)
 $TA + AF = TF = AP + AF = MF$ (44). Por
 consiguiente el triángulo TFM será isósceles, y por lo mis-
 mo el ángulo FTM , ó su igual OMS será igual al ángulo
 FMT .

67 De aquí se infiere que la tangente TMS pro-
 longada al uno y otro lado del punto de contacto M , se
 aparta de la parábola por la parte de su focus F ; y como
 sucede lo mismo esté donde estuviere el punto de contacto
 M , se sigue que esta curva es toda cóncava al rededor de
 su focus F .

68 Cuestion I. Dado un diámetro AP con la tangen- 28.
 te LAL que pasa por su origen A , y su parámetro; hallar 29.
 un diámetro BQ que forme con sus ordenadas un ángulo igual
 al ángulo dado K , su origen B , y su parámetro.

Tiremos por el origen A del diámetro dado la linea AE
 que forme con dicho diámetro al uno ó al otro lado, el ángu-
 lo PAE igual al ángulo dado K , y busquemos (53 y 61)

Fig. en dicha línea (prolongada al otro lado de A , quando no está dentro de alguno de los dos ángulos PAL , PAL) el punto M donde encuentra la parábola, tiraremos por el punto del medio Q de la línea AM , una paralela QD al diámetro AP , que encuentre la tangente AL en el punto D , y partiremos QD por el medio en B . La línea BQ será el diámetro que buscamos, cuyo origen será el punto B , y el parámetro una tercera proporcional á BQ y QA .

Porque 1.º Una vez que la línea AM está dividida por el medio en el punto Q por el diámetro BQ , será ordenada (50 y 61) al uno y otro lado de dicho diámetro, y por ser paralelas las líneas BQ , AP , el ángulo BQA que forma el diámetro BQ con su ordenada QA será igual al ángulo PAM igual al ángulo dado K , ó su suplemento. 2.º El punto del medio B de la línea QD será el origen (63 y 64) de dicho diámetro, por ser AQ su ordenada. 3.º El parámetro del diámetro BQ es la tercera proporcional (60) á BQ y QA .

28. Si el ángulo dado K no fuese recto, se podrían tirar al uno y otro lado del diámetro AP dos distintas líneas AE , que formasen con el diámetro dado ángulos iguales al ángulo K ; se podría, pues, resolver de dos modos la cuestión propuesta, advirtiendo que si la una de las dos líneas AE se confundiese con la tangente AL , el mismo diámetro AP resolverá la cuestión. Pero si el ángulo K fuese recto,
29. to, como no se puede tirar mas que una línea AE que forme con el diámetro AP un ángulo recto, no admitiría la











Fig. 21





cuestion más que una resolucion, y el diámetro que se bus- Fig.
ca seria el ege (64).

Es de reparar que los dos diámetros BQ , BQ que re- 30.
suelven la cuestion quando el ángulo K no es recto, están
colocados de un mismo modo al uno y otro lado del ege
 AP , y que sus parámetros son iguales: esto ya lo mani-
fiesta la misma construccion, suponiendo que el diámetro
dado AP sea el ege, y tirando dos lineas AE , AE al
uno y otro lado. Porque los triángulos rectángulos ALM ,
 ALM , y ADQ , ADQ son iguales y semejantes; por
consiguiente las lineas AD , AD ; DQ , DQ ; sus mita-
des BQ , BQ ; y las ordenadas QA , QA serán iguales; y
(60) por lo mismo serán tambien iguales los pará-
metros.

69 Resulta, pues, 1.º que no hay mas que un diá-
metro que forme con sus ordenadas ángulos rectos, y que
por lo mismo no puede haber mas que un ege. 2.º Que
siempre se podrán hallar dos diámetros distintos que formen
con sus ordenadas ángulos iguales á un ángulo dado, con-
tal que este no sea recto; y que estos dos diámetros estarán
en situacion semejante al uno y otro lado del ege, y que
serán iguales sus parámetros.

70 Question II. Dado un diámetro, su parámetro, y
la tangente que pasa por su origen, trazar la parábola por
un movimiento continuo.

Resolveremos esta cuestion de dos modos.

I. Si el diámetro dado fuese el ege, trazariamos la pa- 31.
rá-

Fig. rábola en virtud de lo dicho (43); pero si no lo fue-
 31. re, supondremos que sea MO el diámetro dado, y TMS la
 tangente que pasa por su origen M .

Sentado esto, en el diámetro MO prolongado mas allá
 de su origen M , tomaremos la parte MD igual á la quarta
 parte de su parámetro, y tiraremos una perpendicular inde-
 finita DE á MD . Tiraremos MF que forme con la tangen-
 te TMS un ángulo FMT igual al ángulo OMS ; y toman-
 do MF igual á MD , trazaremos en virtud de lo dicho (33)
 una parábola, cuya directriz sea la linea DE , y el focus el
 punto F , y será la que corresponde.

Porque 1.º Por ser la linea MO perpendicular á la
 directriz DE , será paralela al ege, y será por consiguiente
 un diámetro (38). 2.º La linea TMS será (66)
 tangente en M . 3.º El parámetro del diámetro MO se-
 rá (59) quadruplo de MF .

32. II. Sea AP el diámetro dado, y LAL la tangente que
 pasa por su origen A . Esto supuesto, en el diámetro AP pro-
 longado mas allá de su origen A , tomaremos la parte AG
 igual á su parámetro, y tiraremos la recta indefinita DGD
 que forme con AG el ángulo AGD igual al ángulo GAL
 y del mismo lado; haremos correr la recta indefinita DM
 á lo largo de GD , manteniéndose constantemente paralela á
 AG , de modo que con su extremo D se lleve el lado DA
 del ángulo DAM igual al ángulo GAL , y mobil en su vértice
 al rededor del punto fijo A . La interseccion continua
 M de la linea DM y del lado AM trazará en virtud del

espresado movimiento la parábola que se pide.

Fig.

Porque si tiramos MP paralela á AL , las líneas MP , 32.
 GD serán iguales, pues ya que el ángulo APM ó GAL es
 igual al ángulo AGD , estarán igualmente inclinadas entre
 las paralelas GP , DM . Pero los triángulos AGD , MPA
 son semejantes, porque el ángulo MPA ó GAL es igual
 al ángulo AGD , y el ángulo PMA ó MAL es igual al
 ángulo GAD , pues si de los ángulos iguales GAL , DAM
 restamos el mismo ángulo DAL , los residuos serán iguales.
 Tendremos, pues, $AG : GD = PM :: PM : AP$, y por lo
 mismo $GA \times AP = (PM)^2$: luego MP es (60 y 62)
 una ordenada al diámetro AP , cuyo origen está en A , el
 parámetro es la línea AG , y LAL la tangente.

Si el diámetro AP fuese el ege, las líneas GD , AL 33.
 serian paralelas, y seria mas facil demostrar la operacion;
 porque se viene á los ojos que GD será entonces igual á PM ,
 y que los triángulos rectángulos AGD , MPA son seme-
 jantes; luego $AG : GD = PM :: PM : AP$, y $AG \times AP$
 $= (PM)^2$.

71 Cuestion III. Dado un diámetro AP con su pa-
 rámetro, y la tangente AL que pasa por el origen A del
 diámetro; trazar la parábola, ó, lo que es lo propio, hallar
 quantos puntos se quisieren de dicha curva.

I. En el diámetro AP prolongado mas allá de su 34.
 origen A , tomaremos la parte AG igual á su parámetro,
 dividiremos AG en dos partes iguales en el punto D , y tira-
 remos una recta indefinita AF perpendicular á AG ; desde
 el

Fig. el punto C tomándole donde se quisiere en la DA indefinidamente prolongada ácia A , como centro, y con el radio CG trazaremos un arco de círculo PF que corte el diámetro AP y su perpendicular AF en los puntos P , F . Por el punto P tiraremos una paralela MPM á la tangente AL , en la qual tomaremos al uno y otro lado las PM , PM iguales cada una á AF . Practicando lo propio hallaremos tantos pares de puntos M quantos quisiéremos en la linea curva MAM que por ellos trazáremos será la parábola que se pide.

Porque como todos los arcos PF pasan por el mismo punto G , y tienen sus centros en la linea GA , prolongada si fuere menester ácia A , tendrán por diámetros las lineas GP ; y de la propiedad del círculo (I. 474) sacaremos $(AF)^2 = GA \times AP$. Pero, segun suponemos, cada PM es igual á su correspondiente AF , y tambien paralela á la tangente AL que pasa por el origen A del diámetro AP , luego será ordenada (60 y 62) á dicho diámetro. Por consiguiente la parábola que se pide ha de pasar por todos los puntos M que la operacion determina.

Se echa de ver que se puede tropezar al trazar las porciones de la parábola que cogen desde uno de los puntos hallados al otro; pero tambien es cierto que será de muy poca consecuencia la equivocacion, si fueren muy inmediatos los unos á los otros los espresados puntos.

35. II. Por un punto qualquiera L de la tangente AL tiraremos una paralela indefinita LE al diámetro AP ; con

cuya paralela y en el diámetro AP prolongado mas allá Fig. 35.
de su origen A , tomaremos las partes LE , EE , EE &c.
 AF , FF , FF &c. todas iguales unas con otras, y del tamaño
que quisiéremos. Determinaremos en LE el punto M , tal que
 LM sea tercera proporcional al parámetro dado del diá-
metro AP , y á la porcion AL de la tangente. Desde los
puntos A , M tiraremos finalmente las lineas AE , AE ,
 AE &c. MF , MF , MF &c. y los puntos de intersec-
cion N , N , N &c. de cada AE con su correspondiente
 MF , estarán en la parábola que se ha de trazar.

Porque si por el punto M y por uno de los puntos
 N tiramos las lineas MP , NQ paralelas á la tangente AL ,
y llamamos AP , x ; $PM = AL$, y ; AQ , u ; QN , z ; de
los triángulos semejantes NQA , ALE , y MPF , NQF in-
feriremos las dos proporciones siguientes $QN:QA::AL:$
 LE , esto es $z:u::y:LE = AF = \frac{uy}{x}$; y $MP:PF =$
 $PA + AF::NQ:QF = QA + AF$, ó $y:x + \frac{uy}{x}::$
 $z:u + \frac{uy}{x}$; multiplicando los extremos y los medios, saca-
remos $uy + \frac{uy^2}{x} = xz + uy$, que con borrar uy en cada
miembro, y multiplicar por z , se reduce á $uyy = xzz$, que
dá esta proporcion $x:u::yy:zz$ ó $AP:AQ::(MP)^2:(NQ)^2$.
Pero como en virtud de la construccion el quadrado de AL
ó PM es igual al rectángulo de la porcion AP del diámetro
dado por su parámetro, será por consiguiente PM (60 y 62)
una ordenada al diámetro AP , y QN será otra (47 y 61).
Luego el punto N será uno de los de la parábola que están
al un lado del diámetro AP ; los que están al otro lado

Fig. se determinarán tomando en las rectas indefinitas LE , AF las partes iguales LE , EE &c. AF , FF &c. al otro lado de los puntos L , A .

Si en lugar de ser uno de los datos el parámetro del diámetro AP , lo fuese uno de los puntos M de la parábola; bastaría tirar por dicho punto una paralela indefinita LE al diámetro AP , y concluir la operación del mismo modo que antes.

De la Elipse.

36. 72 Si aseguramos en un plano los dos cabos de un hilo FMf en dos puntos F , f que estén menos distantes el uno del otro que lo que coge el hilo de largo, y mantenemos siempre tirante este hilo con un lapiz M ; haciéndole dar al lapiz una vuelta al rededor de dichos dos puntos, de modo que vuelva á parar al mismo punto desde el qual empezó á moverse, trazaremos en virtud de este movimiento del lapiz una línea curva que llamaremos *Elipse*.

73 Los dos puntos fijos F y f se llaman los dos *Focus*.


74 Llámase *primer Ege* ó *Ege mayor* una línea Aa que pasa por los dos focus F y f , y remata por ambos lados en la elipse.

75 El *Centro* de la elipse es un punto C , que divide por el medio el primer ege Aa .



76 Llamamos *segundo Ege*, ó *Ege menor* una línea Bb , tirada por el centro C perpendicularmente al primer ege Aa , que remata por ambos lados en la elipse.

Los


29




28




30




33




31




32



34



35



77 Los dos eges juntos Aa, Bb se llaman *Conjugados*; Fig. 36.
de modo que decimos del primer ege Aa que es conjugado
al segundo Bb ; y recíprocamente del segundo Bb decimos
que es conjugado al primero Aa .

78 Las líneas como MP, MK , tiradas desde los pun-
tos M de la elipse, paralelamente á uno de los eges, y que
rematan en el otro ege, se llaman *Ordenadas* á este último
ege. MP es una ordenada al ege Aa , y MK al ege Bb .

79 Una línea tercera proporcional á los dos eges, se
llama *Parámetro* del ege, que es el primer término de la
proporcion. Así, si el primer ege Aa es al segundo Bb , co-
mo este mismo Bb es á una tercera proporcional p , esta
línea p será el parámetro del primer ege.

80 Llámense *Diámetros* todas las líneas rectas que
pasando por el centro C rematan por ambos lados en la
elipse.

81 La *Tangente* en un punto de la elipse es una rec-
ta que no la encuentra mas que en dicho punto, y que
continuada por ambos lados, jamás entra dentro, antes sí
cae de la parte de afuera.

82 Si imaginamos que los dos focus F y f , y el 37.
centro C se junten en solo un punto, se transformará la
elipse en un círculo cuyo radio será la recta CM igual á la
mitad del hilo CMC atado por ambos cabos en el punto C
que será el centro. Luego podremos considerar que el círcu-
lo es una especie particular de elipse, cuyos dos focus se
confunden con el centro; por manera que todo quanto

Fig. demostraremos en adelante acerca de la elipse, haya entre sus focus la distancia que hubiere, se podrá tambien aplicar al círculo en el supuesto de ser nula la expresada distancia.

36. 83 De lo dicho (72) se sigue 1.º que si desde un punto qualquiera M de la elipse se tiran á los dos focus F, f las rectas MF, Mf ; siempre será una misma su suma, porque esta será siempre igual á lo que coge de largo el hilo. Las dos líneas MF, Mf , se llaman *Radios vectores*.

84 2.º Quando el punto M cae en A , se viene á los ojos que MF se confunde con AF , y Mf con Af ; del mismo modo quando el punto M cae en a , tambien se viene á los ojos que MF se confunde con aF , y Mf con af . Tendremos, pues, $AF + Af$, ó $2AF + Ff = aF + af$, ó $2af + fF$; y por consiguiente $AF = af$; de donde se infiere

1.º Que la suma de las dos rectas MF, Mf siempre es igual al primer ege Aa , por ser $Mf + MF = Af + AF = Af + fa$.

2.º Que el centro C divide por el medio la distancia Ff que separa los focus, porque $CA - AF$ ó $CF = Ca - af$ ó Cf .

85 3.º Si desde el extremo B del segundo ege Bb , tiramos á los dos focus F, f las rectas BF, Bf ; es evidente que serán iguales los triángulos rectángulos BCF, BCf , y que por lo mismo la hypotenusa BF será igual á la otra hypotenusa Bf ; y por consiguiente BF ó $Bf = CA$ ó Ca , una vez

vez que (84) $BF + Bf = Aa$. Del mismo modo Fig. probaremos que Fb ó $bf = CA$ ó Ca . De aquí conclui- 36.
remos

1.º Que el centro C divide por el medio el segundo ege Bb ; porque los triángulos rectángulos FCB , FCb serán iguales teniendo iguales las hypotenusas FB , Fb , y el lado FC comun.

2.º Que el segundo ege Bb siempre es menor que el primero Aa , porque su mitad BC , que es uno de los lados del triángulo rectángulo BCF , será menor que su hypotenusa BF , que es igual á la mitad CA del primer ege Aa .

3.º Que si desde el uno B de los extremos del ege menor Bb como centro, y con un radio BF igual á CA , mitad del ege mayor Aa , trazamos un círculo; este círculo cortará el ege mayor en dos puntos F, f que serán los dos focus de la elipse.

86 4.º Si llamamos CA ó BF , t ; CF , m ; el triángulo rectángulo BCF dará $(BC)^2 = tt - mm$. Pero AF 36.
 $= t - m$, y $Fa = t + m$, por consiguiente $AF \times Fa = tt - mm$. De donde resulta claramente que el quadrado de la mitad CB del ege menor Bb , es igual al rectángulo de $AF \times Fa$ partes del ege mayor que cogen desde el uno F de los focus á cada uno de sus extremos A, a .

87 5.º Yá podríamos si quisiésemos trazar una elipse, con tal que fuesen dados sus dos eges. Porque una vez determinados por lo dicho (85) en el ege mayor Aa , los focus F, f , se asegurarán en dichos focus los cabos de

Fig. un hilo FMf tan largo como el ege, cuyo hilo servirá para trazar (72) una elipse , que será evidentemente la misma que se pide.

36. 88 Si se le tira una ordenada MP al primer ege ó ege mayor Aa , y se toma en él la parte $AD = MF$, será $CA : CF :: CP : CD$.

Llamemos CA , t ; CF , m ; CP , x ; PM , y ; y CD , z . Consideraremos dos casos diferentes que pueden ocurrir.

CASO I. Quando el punto P está mas arriba del centro C . Como siempre es menor PF que Pf ; se sigue que MF ó AD será menor que Mf ó aD ; por esta razon AD ó $MF = t - z$, aD ó $Mf = t + z$, $FP = m - x$, ó $x - m$ (segun estuviere mas arriba ó mas abajo que el focus F el punto P) , $Pf = x + m$. Esto supuesto , los triángulos rectángulos MPF , MPf dán $tt - 2tz + zz = yy + mm - 2mx + xx$, y $tt + 2tz + zz = yy + mm + 2mx + xx$. Luego si restamos ordenadamente cada miembro de la primera equacion de los de la segunda , resultará $4tz = 4mx$, de donde sacaremos $CD = z = \frac{mx}{t}$.

36. CASO II. Quando el punto P está mas abajo que el centro C . Como siempre es PF mayor que Pf , se sigue que MF ó AD será mayor que Mf ó aD : por esta razon AD ó $MF = t + z$, aD ó $Mf = t - z$, $PF = x + m$, $Pf = x - m$, ó $m - x$ (segun estuviere el punto P mas abajo ó mas arriba que el focus f). En estos supuestos , de los triángulos rectángulos MPF , MPf , se saca $tt + 2tz + zz = yy + mm + 2mx + xx$, y $tt - 2tz$

$2tz + zz = yy + mm - 2mx + xx$. Luego si restamos ordenadamente cada miembro de la segunda equacion de los de la primera, resultará $4tz = 4mx$, y de aquí $CD = z = \frac{mx}{t}$. Por consiguiente en ambos casos se verifica que $t : m :: x : z$; esto es, que $CA : CF :: CP : CD$. Fig.

89 Se sigue, pues, que si llamamos CA ó Ca , t ; CF ó Cf , m ; y CP , x ; siempre será $MF = t - \frac{mx}{t}$, y $Mf = t + \frac{mx}{t}$, quando el punto P estuviere mas arriba del centro C ; y por el contrario, saldrá $MF = t + \frac{mx}{t}$, y $Mf = t - \frac{mx}{t}$, quando estuviere mas abajo.

90 El quadrado de una ordenada qualquiera MP al ege Aa , es al rectángulo de las partes AP y Pa de dicho ege, como el quadrado de su conjugado Bb es al quadrado del ege Aa ; quiero decir que $(PM)^2 : AP \times Pa :: (Bb)^2 : (Aa)^2$. 36.

Sentado lo mismo que poco ha (89), si en la equacion $tt \pm 2tz + zz = yy + mm \pm 2mx + xx$ que hallamos (88) por medio del triángulo rectángulo MPF , substituimos en lugar de z su valor $\frac{mx}{t}$, sacaremos $ttyy = t^4 - ttxx - mmtt + mmxx$, y de aquí la proporcion $yy : tt - xx :: tt - mm : tt$, esto es $(PM)^2 : AP \times Pa :: (BC)^2 : (CA)^2 :: (Bb)^2 : (Aa)^2$.

91 Si sobre el ege mayor Aa como diámetro trazamos un círculo, y llamamos $2c$ el otro ege Bb , será por la propiedad (I.474) del círculo $(PN)^2 = AP \times Pa$; luego $(PM)^2 : (PN)^2 :: (CB)^2 : (CA)^2 :: cc : tt$. Por consiguiente $PM : PN :: c : t$. 36.

Fig. De lo dicho (90) sacaremos varias consecuencias muy fundamentales.

92 1.º Si tiramos una ordenada MK al otro ege
 36. Bb , es evidente que $MK = CP = x$, y que $CK = PM = y$. Pero (90) $(PM)^2 : AP \times Pa :: (Bb)^2 : (Aa)^2$, esto es $yy : tt - xx :: 4cc : 4tt$; y por consiguiente $4ccxx = 4cctt - 4ttyy$; luego sacaremos $xx : cc - yy :: 4tt : 4cc$, ó $(MK)^2 : BK \times Kb :: (Aa)^2 : (Bb)^2$; quiero decir que el quadrado de una ordenada qualquiera MK al ege Bb , es al rectángulo de las partes BK y Kb de dicho ege, como el quadrado de su conjugado Aa es al quadrado del ege Bb .

93 2.º Si llamamos al uno qualquiera de los eges
 38. Aa , $2t$; su conjugado Bb , $2c$; su parámetro, p ; cada una
 39. de sus ordenadas PM , y ; cada una de sus abscisas CP , x ; tendremos (90) $(PM)^2 : AP \times Pa :: (Bb)^2 : (Aa)^2$; esto es $yy : tt - xx :: 4cc : 4tt$; $p : 2t = Aa$, una vez que (79) $Aa : Bb :: Bb :: p$ ó $2t : 2c :: 2c : p = \frac{4cc}{2t}$. Multiplicando primero los extremos y medios de la proporcion $yy : tt - xx :: 4cc : 4tt$ y despues los de la proporcion $yy : tt - xx : p : 2t$, sacaremos $yy = cc - \frac{ccxx}{tt}$, é $yy = \frac{1}{2} pt - \frac{pxx}{2t}$. Y como esta propiedad se verifica en todos los puntos de la elipse, cuya posicion determina respecto de los dos eges conjugados Aa , Bb , se sigue que la equacion $yy = cc - \frac{ccxx}{tt}$ ó $yy = \frac{1}{2} pt - \frac{pxx}{2t}$ espresa perfectamente la naturaleza de la elipse comparada con sus eges.

Si en lugar de estar en C el origen de las abscisas x , Fig. estuviese en A , de modo que x fuese AP , sería $AP \times Pa = 2tx - xx$, y tendríamos $yy : 2tx - xx :: 4cc : 4tt$. De donde sacaríamos $yy = \frac{cc}{tt} (2tx - xx)$, que expresa la naturaleza de la elipse quando está en A el origen de sus abscisas.

En el mismo supuesto de contarse las abscisas x desde el extremo A del ege mayor, tendríamos $yy : 2tx - xx :: p : 2t$, de donde sacaríamos $yy = px - \frac{pxx}{2t}$ que tambien representa la naturaleza de la elipse.

94 4.º Si multiplicamos los medios y los extremos de la proporcion $yy : tt - xx :: 4cc : 4tt$ que sacamos poco há, resultará la equacion $yy = \frac{cc}{tt} (tt - xx)$ que, en el supuesto de ser $t = c$, se reducirá á $yy = tt - xx$, que pertenece al círculo. Luego un círculo se puede considerar como una elipse cuyos dos eges son iguales. 38. 39.

95 5.º Si multiplicamos los medios y los extremos de la proporcion $yy : 2tx - xx :: p : 2t$ que sacamos tambien poco há, saldrá $2tyy = 2tpx - pxx$ que si suponemos que t sea infinita, se reducirá (II. 183) á $2tyy = 2tpx$ ó $yy = px$, que es la equacion de la parábola. Luego la elipse no se distingue de una parábola cuyo ege mayor es infinito.

96 6.º Si tiramos dos ordenadas cualesquiera MP , NQ al ege Aa , habrá entre sus quadrados la misma razon que entre los rectángulos $AP \times Pa$, $AQ \times Qa$ de las abscisas correspondientes á dichas ordenadas; porque (90) $(Bb)^2$:

Fig. $(Bb)^2 : (Aa)^2 :: (PM)^2 : AP \times Pa :: (QN)^2 : AQ \times Qa$; y por consiguiente $(PM)^2 : (QN)^2 :: AP \times Pa : AQ \times Qa$.

38. 97 7.º Si por un punto qualquiera P del uno de los eges conjugados Aa se tira una paralela MM al otro ege Bb ; esta paralela encontrará la elipse en dos puntos M , M igualmente distantes por ambos lados del punto P , y no la encontrará en mas. Porque para que los puntos M , M pertenezcan á la elipse, es preciso (93) que cada uno de los quadrados de $PM = y$ tomada al uno y otro lado del ege Aa , sea igual á una misma cantidad $cc - \frac{ccxx}{u}$.

98 8.º De la equation (93) $yy = cc - \frac{ccxx}{u}$ se sigue que quanto mas va creciendo CP ó x al uno y otro lado del centro C , tanto menor será cada ordenada PM ó y á cada lado del uno qualquiera Aa de los eges; por manera que si CP ó x fuere igual á CA ó $Ca = t$, cada PM ó y será nula ó cero, y por el contrario, quanto menor fuere CP ó x , tanto mayor será tambien cada ordenada PM ó y á cada lado del ege Aa ; de forma que si CP ó x fuere cero, cada PM ó y , que entónces será CB ó $Cb = c$, será la mayor ordenada. De donde se infiere

1.º Que si por los extremos B , b del uno de los eges conjugados se tiran paralelas al otro ege, serán tangentes en dichos puntos.

2.º Que la elipse se va apartando cada vez mas por ambos lados del uno qualquiera Aa de los dos eges, corpezando desde el extremo A , hasta encontrar su conjugado

do Bb ; y despues se vá acercando al mismo ege Aa , hasta que le encuentra en el otro extremo a . Fig.

99 9.º De (93) $yy = cc - \frac{cc^2}{tt}$ se sigue tambien 38.
que si tomamos los puntos P , P igualmente distantes por 39.
ambos lados del centro C , las ordenadas PM , PM serán
iguales. De donde se infiere evidentemente que si el uno
de los eges conjugados Bb divide por el medio en un pun-
to K que no sea el centro, una linea qualquiera MM que
remata en la elipse, dicha MM será paralela al otro ege
 Aa . Porque si tiramos las paralelas MP , MP al ege Bb ,
estará la PP dividida por el medio en C , por estarlo MM
en K , y por consiguiente serán iguales las ordenadas PM ,
 PM , luego MM será paralela al ege Aa .

100 10.º Si imaginamos que el plano en que está
trazada la elipse, se doble por el uno de los eges Bb , de
modo que lleguen á juntarse sus dos partes; es evidente
que las dos semielipses coincidirán exactamente una sobre
otra; esto es, los puntos A , M &c. coincidirán con los
puntos a , M &c. por estar (99) divididas por el me-
dio en C , K &c. todas las perpendiculares Aa , MM &c.
á dicho ege; de donde se colige que los dos eges dividen la
elipse en quatro porciones perfectamente iguales y uniformes
que no se diferencian unas de otras sino en su posicion.

101 Si por el un extremo A del uno de los eges 40.
 Aa tiramos una recta qualquiera AM en el uno de los án-
gulos aAL , aAL que forma dicho ege con la linea LAL
paralela á su conjugado Bb ; dicha recta AM encontrará

tam-

Fig. tambien la elipse en otro punto M .

Tomemos en AL á qualquiera de los dos lados del punto A la parte AG igual al parámetro p del ege Aa , y tiremos la GF paralela á dicho ege, que encuentre la AM , prolongada si fuere menester, en F . Tomaremos en la AL y al mismo lado en que está la linea AM respecto del ege Aa , la parte $AL = GF$, y tiraremos por el otro extremo a del ege Aa la recta aL . El punto M donde la aL corta la AM , es uno de los puntos de la elipse.

Porque si tiramos MP paralela á AL , y llamamos Aa , $2t$; AG , p ; GF ó AL , a ; CP , x ; PM , y ; de los triángulos semejantes AGF , MPA , y LAA , sacaremos $AG : GF :: MP : AP$, esto es, $p : a :: y : t \pm x = \frac{ay}{p} = AP$, y $AL : Aa :: PM : aP$, ó $a : 2t :: y : t \pm x = \frac{2ty}{a} = aP$. Por consiguiente siempre tendremos $AP \times Pa = tt - xx = \frac{2tyy}{p}$, ora caiga el punto P mas arriba del centro C , ora caiga debajo; y de aquí sacaremos $yy = \frac{1}{2} pt - \frac{pxx}{2t}$. Luego será PM (93) una ordenada al ege Aa , y por consiguiente el punto M será uno de los de la elipse MAM .

102 En virtud de esto, si dado un ege Aa de una elipse MAM con su parámetro p , tiramos por el uno A de los extremos de este ege una recta qualquiera AM dentro del uno de los ángulos aAL , aAL que forma dicho ege con la linea LAL paralela á su conjugado Bb podremos hallar facilmente el punto M donde la LAL encontrará la elipse MAM .

103 Es evidente tambien que sola la linea LaL pa- Fig. 40.
ralela al ege Bb , puede ser tangente de la elipse MAM
en el punto A que es uno de los extremos de su conju-
gado Aa ; porque no hay mas linea que esta que pasando
por el punto A y prolongada por ambos lados, ni la en-
cuentre en otro de sus puntos, ni entre adentro.

104 El centro C divide en dos partes iguales todos 40.
los diámetros como MCm , y estos no encuentran la elipse
mas que en dos puntos M , m .

Si despues de tirada la ordenada MP , y tomada Cp
igual á CP , tiramos la perpendicular pm que remate en
el punto m de la recta MCm ; es evidente que por ser
iguales y semejantes los triángulos CPM , Cpm , será CM
igual á Cm , y PM á pm . Pero como (99) son iguales
unas á otras las ordenadas que por ambos lados distan igual-
mente del centro C , y PM es una ordenada; se sigue que
tambien pm será una ordenada, y por consiguiente que el
punto m es uno de los de la elipse.

Ademas de esto, es patente que si concebimos que
se mueva desde C ácia A una recta paralela al ege Bb ,
la parte de dicha paralela, que cae dentro del ángulo
 ACM , irá siempre creciendo á medida que creciere CP ,
y por el contrario, siempre irá menguando la parte de di-
cha paralela que estuviere entre el quadrante de elipse AMB
y el ege CA , quiero decir que la ordenada PM (98)
irá siempre menguando; de donde se sigue que la recta CM
que pasa por el centro, no encuentra la elipse mas que
en

Fig. en un punto M al mismo lado del ege; y lo mismo se verificaria respecto del punto m que está al otro lado del ege.

41. 105 Si por un punto qualquiera M de una elipse
 42. tiramos un diámetro MCm , una ordenada MP al uno qualquiera Aa de los dos eges, y una recta MT , de forma que CT sea tercera proporcional á CP y CA ; el diámetro SCs paralelo á MT se llama *Diámetro conjugado* al diámetro Mm ; y recíprocamente al diámetro Mm se le llama conjugado al diámetro Ss ; de suerte que los dos juntos se llaman *Diámetros conjugados*.

106 Todas las rectas que tiradas desde los puntos de la elipse paralelamente al uno de dichos dos diámetros, rematan en el otro, se llaman *Ordenadas* á este último. Así, NO paralela al diámetro Ss es una ordenada á su conjugado Mm .

107 Una linea tercera proporcional á los diámetros conjugados, se llama el *parámetro* del diámetro que forma el primer término de la proporción. Así, una tercera proporcional á Mm y Ss , será el *Parámetro* del diámetro Mm .

108 Luego si llamamos CA , t ; CP , x ; PT , s , será (105) CT ó $x + s = \frac{t^2}{x}$; y así $sx = tt - xx = AP \times Pa$.

41. 109 Si por los extremos M, S de dos diámetros conjugados Mm, Ss , tiramos dos ordenadas MP, SK á un ege Aa la parte CK del ege comprendida entre el centro, y la una de las ordenadas SK , será media proporcional entre las dos partes AP, Pa , en que divide el ege la otra ordenada MP .

quiero decir que será $(CK)^2 = AP \times Pa$.

Fig.

Llamemos CA, t ; CP, x ; PT, s ; CK, m ; y tendremos $AP \times Pa = tt - xx = (108) sx$, y $AK \times Ka = tt - mm = sx + xx - mm$, despues de substituido en lugar de tt su valor $xx + sx$. Sentado esto, por la propiedad (96) de la elipse será $AP \times Pa : AK \times Ka :: (PM)^2 : (KS)^2 :: (TP)^2 : (CK)^2$ por razon de los triángulos semejantes TPM, CKS . Substituyendo en esta proporcion los valores analyticos de sus términos, sacaremos $sx : sx + xx - mm :: ss : mm$, y multiplicando estremos y medios, y transponiendo, resultará finalmente $(CK)^2$ ó $mm = \frac{ssx + ssx}{x + s} = sx = AP \times Pa$.

110 Yá que $(CK)^2 = tt - xx$, se sigue que $(CA)^2 - (CK)^2$, ó $AK \times Ka = xx$. Pero (93) $(CA)^2 : (CB)^2 :: AK \times Ka : (SK)^2$, esto es, $tt : cc :: xx : (SK)^2 = \frac{ccxx}{tt}$; y $(CA)^2 : (CB)^2 :: AP \times Pa : (PM)^2$, ó $tt : cc :: tt - xx : (PM)^2 = cc - \frac{ccxx}{tt}$. Fuera de esto, por razon de los triángulos rectángulos CPM, CKS , será el quadrado $(CM)^2$ ó $(CP)^2 + (PM)^2 = xx + cc - \frac{ccxx}{tt}$, y el quadrado $(CS)^2$ ó $(CK)^2 + (KS)^2 = tt - xx + \frac{ccxx}{tt}$. Luego $(CM)^2 + (CS)^2 = tt + cc$: quiero decir, que la suma de los quadrados de dos diámetros conjugados qualesquiera Mm, Ss es igual á la suma de los quadrados de los dos eges Aa, Bb .

111 El quadrado de una ordenada qualquiera ON al diámetro Mm es al rectángulo formado por las partes MO, Om de dicho diámetro, como el quadrado de su conjugado

Ss

Fig. *Ss es al cuadrado del mismo didmetro Mm : quiero decir que*
 $(ON)^2 : MO \times Om :: (Ss)^2 : (Mm)^2$.

Tiraremos las paralelas NQ , OH al ege Bb , y la paralela OR á su conjugado Aa , que encuentre en R la ordenada NQ prolongada, si fuere menester : llamaremos CP , x ; PM , y ; CA , t ; PT , s ; HQ ú OR , a ; CH , b . Por razon de los triángulos semejantes CPM , CHO , y MPT , NRO tendremos 1.º $CP : PM :: CH : HO$ ó RQ , esto es $x : y :: b : HO$ ó $RQ = \frac{by}{x}$. 2.º $TP : PM :: OR : RN$, ó $s : y :: a : RN = \frac{ay}{s}$.

41. Sentado esto, ya que es siempre NQ la diferencia entre $RQ = \frac{by}{x}$, y $RN = \frac{ay}{s}$, y CQ es la suma de $CH = b$ y $HQ = a$, quando el punto N cae entre los puntos M , S , ó m , s ; y por el contrario siempre es NQ la suma de RQ y RN , y CQ la diferencia entre CH , HQ , quando el punto N cae en otra parte, tendremos $(NQ)^2 = \frac{bbyy}{xx} \pm \frac{2abyy}{sx} + \frac{aavy}{ss}$, y $(CQ)^2 = aa \mp 2ab + bb$; esto es $-\frac{2abyy}{sx}$, y $+\frac{2abyy}{sx}$ en el primer caso, y en el segundo $+\frac{2abyy}{sx}$, y $-\frac{2abyy}{sx}$. Pero (96) $AP \times Pa : AQ \times Qa$ ó $(CA)^2 - (CQ)^2 : (PM)^2 : (QN)^2$, ó substituyendo sus valores analyticos $tt - xx : tt - aa \pm 2ab - bb :: yy : (QN)^2 = \frac{ttyy - aavy \pm 2abyy - bbyy}{tt - xx}$. Comparando uno con otro estos dos valores de $(NQ)^2$, sacaremos la equacion $\frac{bbyy}{xx} \pm \frac{2abyy}{sx} + \frac{aavy}{ss} = \frac{ttyy - aavy \pm 2abyy - bbyy}{tt - xx}$, que, borrando en el un miembro el término $\pm \frac{2abyy}{sx}$, y en el otro el término $\pm \frac{2abyy}{tt - xx}$, que es su igual por ser (108) $sx = tt - xx$, y dividiendo por yy , se reduce á $\frac{bb}{xx} + \frac{aa}{ss} = \frac{tt - aa - bb}{tt - xx}$.

Si multiplicamos por xx , y pasamos bb al otro miembro, hallaremos $\frac{aaxx}{ss}$ ó $\frac{aaxx}{ssxx} = \frac{ttax - aaxx - bbt}{tt - xx}$; multiplicando el primer miembro por $ssxx$, y el segundo por el cuadrado de $tt - xx$ valor de ss (y para esto bastará multiplicar el numerador por $tt - xx$), sacaremos $aax^4 = t^4xx - attxx - bbt^4 - ttx^4 + aax^4 + bbttxx$; borrando en ambos miembros de la última equacion la cantidad aax^4 , transponiendo $attxx$, y dividiendo por $ttxx$, se sacará finalmente $(HQ)^2$ ó $(OR)^2 = aa = tt - xx + bb - \frac{bbt}{xx}$.

Ahora, pues, si llamamos z el semidiámetro CM ó Cm , tendremos por razon de los triángulos semejantes CPM , CHO , $CP : CM :: CH : CO$, ó $x : z :: b : CO = \frac{bx}{z}$; y por consiguiente $MO \times Om = zz - \frac{bbxz}{xx}$. Pero los triángulos semejantes ORN , CKS dán $(ON)^2 : (CS)^2 :: (OR)^2 : (CK)^2 :: MO \times Om : (CM)^2$, ó substituyendo en lugar de los quatro últimos términos sus valores, $tt - xx + bb - \frac{bbt}{xx} : tt - xx :: \frac{axxz - bbtz}{xx} : zz$, una vez que multiplicando estre-
mos y medios resulta un mismo producto: luego $(ON)^2 : MO \times Om :: (CS)^2 : (CM)^2 :: (Ss)^2 : (Mm)^2$.

112 De esto inferiremos

1.º Que lo demostrado (90) respecto de los dos eges Aa y Bb , se verifica tambien en virtud de lo que acabamos de probar en dos diámetros conjugados cualesquiera Mm , Ss . Pero como lo dicho en los números 92, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 102 y 103 es una consecuencia de lo demostrado (90), y se verifica

Fig. igualmente sea ó no recto el ángulo ACB , se sigue, que si en los números referidos suponemos que en lugar de ser los dos eges las líneas Aa , Bb , sean dos diámetros conjugados cualesquiera, también serán ciertos en este supuesto porque se demostrarán del mismo modo.

43. 113 2.º Como queda cierto lo dicho (98 y 103) aun quando las líneas Aa , Bb en vez de ser los dos eges son dos diámetros conjugados cualesquiera como Mm , Ss , se sigue que la línea MT tirada por el uno de los extremos M de un diámetro conjugado qualquiera Mm , paralelamente á su diámetro conjugado Ss , es tangente en M , y que ninguna otra línea mas que esta puede tocar la elipse en dicho punto.

De donde se echa de ver que desde un punto dado en una elipse, no se la puede tirar sino una sola tangente.

- 114 3.º De aquí y de lo dicho (111) se puede inferir que si por un punto qualquiera M de una elipse tiramos una ordenada MP al uno qualquiera Aa de los dos eges, y despues de tomada del lado del punto P , la CT tercera proporcional á CP , CA , tiramos la recta MT , dicha MT será tangente en M . Y recíprocamente, si MT fuere tangente en M , y tiramos la ordenada MP al uno Aa de los dos eges, las partes CP , CA , CT de dicho ege estarán en proporcion geométrica continua.

- 115 4.º Si en lo que dijimos (105, 106 y 107) concebimos que las líneas Aa , Bb no son los dos eges, sino dos

dos diámetros conjugados cualesquiera; se echará de ver que son igualmente ciertas dichas proposiciones una vez que se demuestran del mismo modo que antes, segun lo dá á entender claramente la figura, cuyos triángulos semejantes darán las mismas proporciones que si fuesen Aa y Bb los dos eges.

De donde se infiere 1.º que lo dicho (114) es tambien cierto quando en lugar de ser la linea Aa un ege es un diámetro qualquiera. 2.º Que en este supuesto los diámetros conjugados Mm , Ss pueden ser los dos eges, y que podemos considerar los dos eges como si fueran dos diámetros conjugados que se cruzan á angulos rectos.











116 Si por un punto qualquiera de una elipse cuyo centro sea C , se tira una ordenada MP al uno Aa de los eges, y una perpendicular MG á la tangente MT que pasa por el punto M ; siempre estará CP con PG en la razon dada del ege Aa á su parámetro. 44.


Porque si llamamos el semieje CA ó CA , t ; CP , x ; PM , y ; tendremos (114) $CT = \frac{tt}{x}$, y por consiguiente $PT = \frac{tt - xx}{x}$. De los triángulos rectángulos semejantes TPM , MPG sacaremos $TP : PM :: PM : PG$, ó $\frac{tt - xx}{x} : y :: y : PG = \frac{xyy}{tt - xx}$; de donde resulta la proporcion $CP : PG :: AP \times Pa : (PM)^2$, esto es, $x : \frac{xyy}{tt - xx} :: tt - xx : yyy$; porque multiplicando extremos y medios sale un mismo producto xyy . Pero el rectángulo $AP \times Pa$ es (93) al quadrado $(PM)^2$, como el ege Aa es á su parámetro. Luego &c.

Fig. 117 Si por un punto qualquiera M de una ellipse
 45. tiramos una tangente TMS , y las MF , Mf á los dos fo-
 cus F y f ; los ángulos FMT , fMS que forman dichas líneas
 por ambos lados con la tangente TMS son iguales uno con
 otro.

Porque tirando las perpendiculares FD , fd á dicha
 tangente; el primer ege Aa que la encuentre T , y la
 ordenada PM á dicho ege; y llamando CA ó Ca , t ; CF
 ó Cf , m ; CP , x ; tendremos $MF : Mf :: TF$ ó $CT -$
 $CF : Tf$ ó $CT + Cf$, esto es (89 y 114) $t -$
 $\frac{mx}{t} : t + \frac{mx}{t} :: \frac{tx}{x} - m : \frac{tx}{x} + m$, una vez que resulta un
 mismo producto de la multiplicacion de los medios que
 de la de los extremos. Pero los triángulos semejantes TFD ,
 Tfd dan $TF : Tf :: FD : fd$. Luego la hypotenusa MF
 del triángulo rectángulo MDF será á la hypotenusa Mf
 del triángulo rectángulo Mdf , como el lado DF es al
 lado df ; y por consiguiente serán semejantes los triángu-
 los MDF , Mdf . Luego serán iguales uno con otro los án-
 gulos FMD , fMd ó FMT , fMS opuestos á los lados ho-
 mólogos DF , df .

118 De aquí se evidencia que si se prolonga inde-
 finitamente al uno y otro lado del punto de contacto M la
 tangente TMS , dejará toda la ellipse del lado de sus dos
 focus F , f . Y como esto se verificará esté donde estubiere
 el punto M de la ellipse, se infiere que toda la ellipse será
 cóncava al rededor de sus dos focus, y por consiguiente
 lo será tambien al rededor de su centro.





119 Si por el un extremo A de un diámetro Aa se tira una paralela DAE á su conjugado Bb , que encuentre otros dos diámetros conjugados qualesquiera Mm , Ss en los puntos D , E ; el rectángulo $DA \times AE$ será igual al quadrado de la mitad CB del diámetro Bb ; quiero decir que será $DA \times AE = (CB)^2$. 46.

Tiraremos, para probarlo, por los extremos M , S de los diámetros conjugados Mm , Ss , las ordenas MP , SK al diámetro Aa ; llamaremos CA , t ; CB , c ; CP , x ; PM , y ; y tendremos (109) $(CK)^2 = AP \times Pa = tt - xx$, y por consiguiente $AK \times Ka$ ó $(CA)^2 - (CK)^2 = xx$. Pero (111) $(BC)^2 : (CA)^2 :: (MP)^2 : AP \times Pa$ ó $(CK)^2$, esto es, $cc : tt :: yy : (CK)^2 = \frac{t^2 y^2}{cc}$. Y $(CA)^2 : (CB)^2 :: AK \times Ka : (KS)^2$, ó $tt : cc :: xx : (KS)^2 = \frac{cc xx}{tt}$. Luego sacando las raices quadradas, resulta $CK = \frac{ty}{c}$, y $KS = \frac{cx}{t}$. Pero los triángulos semejantes CPM , CAD , y CKS , CAE dan $CP : PM :: CA : AD$, ó $x : y :: t : AD = \frac{ty}{x}$; y $CK : KS :: CA : AE$, ó $\frac{ty}{c} : \frac{cx}{t} :: t : AE = \frac{ccx}{ty}$. Luego $DA \times AE = cc = (BC)^2$.

120 Si por los extremos M , m , y S , s de los diámetros conjugados Mm , Ss de una elipse, se tiran las rectas EH , FG y GH , FE respectivamente paralelas á sus conjugados, quedará inscripta la elipse en un paralelogramo. 47.
Vamos á probar que

Todos los paralelogramos circunscriptos á la elipse son iguales unos con otros, é iguales al rectángulo de los dos ejes.

Tirémos por el extremo M del diámetro Mm la MP , y

Tom.III.

E 3.

por

Fig. por el extremo S del diámetro Ss , la SQ , ambas ordenadas al primer ege Aa . Llamemos este primer ege $2t$; al segundo Bb , $2c$; CP , x ; SQ , u . Una vez que (114) $CT = \frac{tt}{x}$, será $PT = \frac{tt - xx}{x}$, y en virtud de lo probado (110) será $(SQ)^2 = uu = cc - \frac{cc(CQ)^2}{tt}$; de donde sacaremos despues de multiplicado todo por tt , traspasado y dividido por cc , $(CQ)^2 = tt - \frac{ttuu}{cc}$.

Sentado esto, los triángulos semejantes SQC , MPT darán $(MP)^2 : (PT)^2 :: (SQ)^2 : (QC)^2$; esto es $\frac{cc}{tt}(tt - xx) : \frac{(tt - xx)^2}{x^2} :: u^2 : tt - \frac{ttuu}{cc}$, de donde saldrá $u = \frac{c}{t}x$, y por consiguiente $CP : SQ : t : c$. Por el mismo camino hallariamos $CQ : MP :: t : c$. Luego $CP : SQ :: CQ : MP :: t : c$ y los triángulos SQC , CMP tendrán iguales sus areas. Luego 1.º. $(SQ)^2 = \frac{cc(CP)^2}{tt}$. 2.º. $(QC)^2 = \frac{tt(MP)^2}{cc}$.

Si tiramos la MS , la superficie del triángulo MCS será igual á la superficie del trapecio $SQPM$ menos la superficie de los dos triángulos CPM , CQS . Luego la superficie del espresado triángulo será $= \frac{1}{2}(SQ + MP)(QC + CP) - \frac{1}{2}QC \times SQ - \frac{1}{2}CP \times MP = \frac{1}{2}CQ \times PM + \frac{1}{2}CP \times SQ = \frac{1}{2} \left[\frac{t}{c}(MP)^2 + \frac{c}{t}(CP)^2 \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{t}{c} \times \frac{cc}{tt}(tt - (CP)^2) + \frac{c}{t}(CP)^2 \right] = \frac{1}{2}ct$. Luego la superficie del paralelogramo $CSEM = ct$, y la del paralelogramo total $FEGH = 4ct = 2c \times 2t$. Por consiguiente todos los paralelogramos circunscriptos á la elipse son iguales unos á otros por ser iguales al rectángulo de los dos eges.

48.

121

Question I. Dados dos diámetros conjugados Aa , Bb de una elipse con una recta MCm que pase por su cen-

tro

tro C ; hallar los puntos M, m donde dicha línea encuentre la elipse. Fig. 48.

Tiraremos por el uno A de los extremos del diámetro Aa , una recta indefinita AD paralela á su conjugado Bb , que encuentre en D la CM dada de posición; por el punto A tiraremos á AD la perpendicular $AO = CB$, y por los puntos O, D la OD . Con el radio OA describiremos un círculo que cortará la OD en dos puntos N, n , por los cuales se tirarán las paralelas NM, nm á la OC que vá desde el centro de la elipse al centro del círculo. Los puntos M, m donde dichas paralelas encuentran la CD serán de la elipse, y determinarán por consiguiente los extremos del diámetro MCm dado de posición.

Porque si tiramos las paralelas MP, NQ á AD que encuentren las rectas CA, OA en P y Q ; los triángulos semejantes CDO, MDN , y CDA, CMP , y ODA, ONQ darán $CA : CP :: CD : CM :: OD : ON :: OA : OQ$, esto es $CA : CP :: OA : OQ$. Y por consiguiente si tiramos la recta PQ , será paralela á OC , y también á MN , que según suponemos es paralela á OC . Luego las paralelas MP, NQ serán iguales. Sentado esto, si llamamos CA, t ; CB ó AO ó ON, c ; CP, x ; PM ó NQ, y ; tendremos $CA : CP :: OA : OQ$, ó $t : x :: c : OQ = \frac{cx}{t}$. Y por razón del triángulo OQN rectángulo en Q , $(NQ)^2$ ó $(MP)^2 = (ON)^2 - (OQ)^2$, esto es $y^2 = cc - \frac{cc^2x^2}{t^2}$. Luego MP será una ordenada (93) al diámetro Aa , y por consiguiente el punto M será uno de los de la elipse cuyos diámetros conju-

Fig. gados son las rectas Aa , Bb . Pero por razon de las paralelas NM , OC , nm , el centro C divide por el medio la Mm , ya que por la propiedad del círculo, el punto O divide del mismo modo á la Nn . Luego tambien el punto m será (104) uno de los de la elipse.

Si los diámetros conjugados Aa , Bb fueran los dos eges, las paralelas CO , PQ se confundirian entonces con las rectas CA , AO que no serian sino una sola linea, y en este caso se resolveria, y demostraria aun mas facilmente la cuestion.

48.

122 Cuestion II. *Dados dos diámetros conjugados Aa , Bb de una elipse; hallar los dos eges Mm , Ss ; y demostrar al mismo tiempo que una elipse no puede tener mas que dos.*

Tiraremos por el uno A de los extremos del diámetro Aa la DE paralela á su conjugado Bb , y la AO perpendicular á DE é igual á CB . Tiraremos tambien la OC , y por su medio F la FG que la cruce á ángulos rectos, y que vaya á encontrar en G la DE , en la qual tomaremos al uno, y otro lado del punto G las partes GD , GE cada una igual á GO ó GC . Por último, tirando las CD , CE , los dos eges Mm , Ss estarán sobre estas rectas.

Porque una vez que podemos considerar (115) los dos eges como si fueran dos diámetros conjugados, que forman uno con otro un ángulo recto, encontrarán dichos eges la recta DE en unos puntos D y E , tales que el círculo trazado sobre el diámetro DE , pasará por los puntos C y O , pues siendo el rectángulo $DA \times AE$ igual (119) al

al quadrado de AO , serán rectos los ángulos DOE , DCE . Fig. 48.
 Pero se viene á los ojos que es esto mismo lo que acabamos de hacer en virtud de la construccion, pues por ser las rectas GO, GC, GE, GD iguales todas unas con otras, son radios de un mismo círculo. Pero como no puede haber en la DE sino dos puntos que cumplan á un mismo tiempo con las dos condiciones de que sea recto cada uno de los ángulos DCE y DOE , se sigue que los diámetros conjugados Mm, Ss que forman uno con otro un ángulo recto, serán los mismos eges, y que no pueden ser mas que dos.

Determinaremos su magnitud con tirar las rectas OD, OE , y por los puntos N y R en que encuentran el círculo cuyo radio es OA , tiraremos las paralelas NM, RS . Porque es evidente (121) que los puntos M, S donde encuentran las rectas CD, CE serán puntos de la elipse cuyos diámetros conjugados son Aa y Bb , cuyos puntos serán por consiguiente los extremos de sus eges.

123 Si quisiéramos hallar dos diámetros conjugados Mm, Ss que hiciesen uno con otro un ángulo MCS igual á un ángulo dado, dados otros dos diámetros conjugados Aa, Bb ; se reduciría la operacion á determinar en la recta DE dada de posición, dos puntos D, E , tales que si desde ellos tiráramos á los dos puntos O, C dados fuera de esta linea las rectas DO, OE, CD, CE , fuese recto el ángulo DOE , y el ángulo DCE fuese igual al ángulo dado.

124 Cuestion III. *Dados los dos eges Aa, Bb de una elip-*

Fig. *ellipse*; hallar dos diámetros conjugados Mm , Ss que formen uno con otro el ángulo MCS igual á un ángulo dado.

49. Supondremos que los diámetros Mm , Ss sean con efecto conjugados.
 50. to los que se piden, y que encuentren en los puntos D y E la recta indefinita DE tirada paralelamente al ege mayor Bb por el extremo A del ege menor Aa . Tiraremos desde el centro C de la ellipse, la CF que forme con DE en F el ángulo CFE igual al ángulo dado MCS , y llamaremos CA , t ; CB , c ; AF , a ; AE , z ; de donde resulta AD (119) $= \frac{cc}{t}$, $CE = \sqrt{(tt + zz)}$ por razon del triángulo rectángulo CAE . Sentado esto,

Los triángulos FEC , CED serán semejantes, por tener el ángulo en E comun, y el ángulo CFE igual por construcción al ángulo MCS ; por esta razon $FE : EC :: EC : ED$, ó $z - a : \sqrt{(tt + zz)} :: \sqrt{(tt + zz)} : z + \frac{cc}{t}$. Si multiplicamos los medios y los extremos de esta proporcion, sacaremos la equacion $zz - az + cc = \frac{acc}{t} = tt + zz$ que, borrando en ambos miembros zz , multiplicando despues por z , y dividiendo finalmente por a , se reduce á $zz - \frac{cc}{a}z + \frac{tt}{a}z + cc = 0$. Si para abreviar hacemos $\frac{cc - tt}{a} = 2b$, se transformará la equacion precedente en $zz - 2bz + cc = 0$, ó $zz - 2bz + bb = bb - cc$, de la qual sacaremos $z - b$, ó $b - z = \sqrt{(bb - cc)}$, y por consiguiente la incógnita $AE = z = b \pm \sqrt{(bb - cc)}$. La construcción que subministra esta última equacion es la siguiente.

Despues de prolongado el ege menor Aa hasta O , de modo que AO sea igual á la mitad CB del ege mayor; se tí-

raré CF , que forme con DE tirada paralelamente á Bb por el punto A , el ángulo CFE igual al ángulo dado. Tiraránse tambien OF , y las rectas OH , CG perpendiculares á OF , CF , que concurren con DE en los puntos H , G *. Describáse desde O como centro, y con el radio OK igual á la mitad de GH , que es la parte de AD prolongada, comprendida entre G y H , un arco de círculo que corte DE en los puntos K , K_2 y tomando en DE las partes KD , KE cada una igual á KO , tírense por el centro C de la elipse las rectas DC , EC . Los diámetros Mm , Ss que buscamos, estarán en estas líneas.

Porque por razon de los ángulos rectos FAC , FCG , y FAO , FOH tendremos $AG = \frac{u}{a}$, $AH = \frac{cc}{a}$; y por consiguiente $GH = \frac{cc-u}{a} = 2b$. Luego el radio OK que es igual á la mitad de HG , será igual á b ; y del triángulo rectángulo OAK sacaremos $AK = \sqrt{bb - cc}$, y AE ó $KE \mp AK = b \mp \sqrt{bb - cc}$, y AD ó $KD \pm AK = b \pm \sqrt{bb - cc}$. Sentado esto, si multiplicamos el valor de AE por el de AD , resultará $AE \times AD = cc = (CB)^2$: luego (119) son conjugados los diámetros Mm , Ss . Pero $AE + AD$ ó $DE \times (AE - AF)$ ó $EF = 2b \times [b \mp \sqrt{bb - cc} - a] = 2bb \mp 2b\sqrt{bb - cc} - 2ab = 2bb \mp 2b\sqrt{bb - cc} + tt - cc$, substituyendo en lugar de $2ab$ su valor $cc - tt$; y por razon del triángulo rectángulo

CAE ,
 * No se han señalado en las figuras los puntos H y G sobre DE , porque hubieran salido demasiado grandes; ademas de que es muy facil concebirlos puestos en su verdadero lugar.

Fig. CAE , $(CE)^2 = (AE)^2 + (CA)^2 = 2bb \mp 2b\sqrt{(bb - cc)}$

49. $+tt - cc = DE \times EF$; de donde resulta $FE : EC :$

50. $EC : ED$. Y por consiguiente serán semejantes los triángulos FEC , CED , por tener el ángulo en E común, y los lados adyacentes á dicho ángulo proporcionales. Luego el ángulo MCS será igual al ángulo dado CFE .

Para conocer la magnitud CM , CS de los dos semidiámetros que se buscan; tiraremos las rectas OD , OE , y por los puntos N , R donde encuentran el círculo cuyo radio es OA , las paralelas NM , RS á OC . Porque se viene á los ojos (121) que serán de la elipse los puntos M , S donde encuentran las rectas CD , CE , y que determinarán por consiguiente los extremos de dichos diámetros.

125 De la construccion que acabamos de dar resulta 1.º que para que sea posible la cuestion, es forzoso que $OK = \frac{cc - tt}{2a}$ sea mayor ó igual á $AO = c$; porque á no ser así, el círculo que se trazare con el radio OK , no encontrará la DE en punto alguno, cuya circunstancia es sin embargo necesaria para la construccion.

2.º Que quando OK fuere mayor que OA , siempre se hallarán por medio de los dos puntos K , K dos diferentes diámetros conjugados Mm , Ss que resolverán igualmente la cuestion; pero entonces el diámetro Ss de la fig. 50 será igual al diámetro Mm de la fig. 49, y estará colocado del mismo modo al otro lado del ege Aa , porque AE en la fig. 50 es igual á AD en la fig. 49. Y del mismo modo el diámetro Mm en la fig. 50 es igual al diámetro Ss en la fig. 49, y está colo-

cado del mismo modo al otro lado del ege Aa ; porque AD Fig. de la fig. 50 es igual á AE de la fig. 49. Quiero decir, que los dos diámetros conjugados diferentes Mm , Ss que resuelven igualmente la cuestion, están puestos de un mismo modo al uno y al otro lado del ege Aa , y que en las dos posiciones distintas, sus magnitudes se quedan las mismas.

3.º Que quando $OK = OA$, los dos puntos de inter- 51. seccion K , K coinciden con el punto de contacto A ; y en este caso todo está reducido á tomar las partes AE , AD cada una igual á la mitad CB del ege mayor: de donde resulta evidentemente que no admite este caso mas que una resolucion, y que son iguales unos con otros los dos diámetros conjugados Mm , Ss que le resuelven.

126 Tambien es evidente que quanto mayor es AF 49. $= a$, tanto mayor es tambien el ángulo obtuso CFE dado, 50. y tanto mas mengua la linea $OK = \frac{cc - tt}{2a}$; por manera que 51. quando AF fuere la mayor posible, el ángulo obtuso CFE será tambien el mayor; y por el contrario la linea OK será la menor, quiero decir, será igual á AO . Pero si en este caso tiráramos las rectas Ba , ab , todos los triángulos rectángulos aCB , CAD , aCb , CAE serían iguales unos con 51. otros; por ser cada una de las lineas AE , AD igual á la mitad CB ó Cb del ege Bb , y por ser CA igual á Ca . Luego el ángulo ACM sería igual al ángulo CaB , y el ángulo ACS al ángulo Cab ; y por consiguiente el ángulo dado MCS ó CFE sería tambien igual al ángulo Bab . De donde se sigue

1.º Que si desde el uno de los extremos a del ege menor Aa ,

Fig. *Aa*, se tiran á los extremos *B*, *b* del mayor, las líneas *aB*,
 49. *ab*; el ángulo obtuso dado *CFE* debe ser igual ó menor
 50. que el ángulo *Bab*, para que sea (125) posible la cues-
 51. tion.

2.º Que quando le es igual como en la fig. 51, no hay
 mas que dos diámetros conjugados *Mm*, *Ss* que la resuel-
 van, y son iguales uno con otro.

49. 3.º Que en el caso de ser menor como en las figu-
 50. ras, siempre hay dos diámetros conjugados distintos que re-
 suelven la cuestion: que están en situacion semejante al
 uno y otro lado del ege menor, subsistiendo entre ellos
 uno mismo dicho ángulo, y que su magnitud se mantiene
 tambien la misma en estas dos posiciones distintas.

127 Cuestion IV. *Dados dos diámetros conjugados*
Aa, *Bb* *de una elipse; trazarla con un movimiento continuo*

- I. Se puede resolver esta cuestion buscando (122)
 los dos eges, y trazando despues la curva por lo dicho (87)
 52. II. Tirarémos por el un extremo *A* del uno de los
 53. diámetros dados *Aa*, una perpendicular *AH* al otro *Bb*,
 en cuya perpendicular tomaremos al uno ú al otro lado del
 punto *A* la $AQ = CB$. Y despues de tirada la *CQ*, haremos
 que corra la línea $GF = HQ$ con sus extremos á lo
 largo de las líneas *Bb*, *CQ*, prolongándolas quanto fuere
 menester al uno y otro lado del centro *C*, hasta que despues
 de haber andado succesivamente los quatro ángulos
 que estas líneas forman, se restituya á la misma situacion
 en que se hallaba quando empezó á moverse. Si tomamos

$GM = AQ$, el punto M trazará en este movimiento la Fig. elipse que se pide.

Porque si tiramos GP paralela á QA , que encuentre en P el diámetro Aa , y en O al diámetro Bb ; de los triángulos semejantes CHQ , COG , y CAQ , CPG inferiremos $CQ : CG :: AQ = GM : GP :: HQ = GF : GO$. Y por lo mismo la línea PM será paralela al diámetro Bb . Sentado esto, llamaremos CA , t ; AQ ó CB ó Cb , c ; CP , x ; PM , y , y tendremos $CA : CP :: AQ : GP$, esto es, $t : x :: c : GP = \frac{cx}{t}$. Y del triángulo rectángulo GPM sacaremos $(PM)^2 = (GM)^2 - (GP)^2$, quiero decir $yy = cc - \frac{ccxx}{tt}$. Luego la línea PM será (93 y 86) una ordenada al diámetro Aa de la elipse cuyos diámetros conjugados son las líneas Aa , Bb .

Si los dos diámetros conjugados Aa , Bb fuesen los 54. dos eges, es evidente que las líneas AQ , CQ se confundirían con el diámetro Aa , que sería el uno de los eges, y que el punto H coincidiría con el centro C . Por consiguiente habríamos de tomar en este caso $GF = CQ$, suma ó diferencia de los dos semiejes CA , CB , para hacer que corrieran sus extremos á lo largo de los eges Aa , Bb , prolongados si fuese necesario.










Como las líneas Aa , Bb se cruzan á ángulos rectos en el punto C ; se sigue que, sea la que fuere la situación de la recta GF mientras corre á lo largo de dichas líneas, el círculo cuyo diámetro fuese GF pasará constantemente por el punto C ; y que por consiguiente la línea CD que


Fig. que pasa por el punto D que está en medio de FG , siempre será igual á DF , porque las líneas CD , DF , DG siempre serán radios del espresado círculo. De aquí inferiremos la descripción siguiente

Sean dos rectas CD , DF igual cada una de ellas á la mitad de CQ suma ó diferencia de los dos semiejes CB , CA de tal suerte unidas una con otra en su extremo comun D que puedan dar la vuelta al rededor de dicho punto, como las piernas de un compas al rededor de su charnela. Afíñase el extremo C de la recta CD en el centro de la elipse, y concíbase que el extremo F de la otra recta FD se mueve á lo largo del eje Bb , llevándose consigo la DC movil al rededor del punto fijo C . Es evidente que si tomamos en la FD , prolongada si fuere menester, la parte $FM = CA$, trazaremos en virtud de este movimiento del punto M la elipse que buscamos.

§ 5. 128 Cuestion V. *Dados dos diámetros conjugados Aa Bb de una elipse; hallar muchos de sus puntos.*

I. Por el un extremo A del uno de los diámetros dados Aa , se tirarán la indefinita DAD paralela á su conjugado Bb , y la AO perpendicular á AD é igual á la mitad CB del diámetro Bb ; se tirará OC ; y desde O como centro y con el radio OA , se describirá un círculo. Hecho esto, se tirarán á arbitrio por ambos lados de CA quantas líneas CD , CD &c. se quisieren; y desde los puntos D , D &c. donde encuentran la DAD , al centro O se tirarán las rectas DO , DO &c. que corten la circunferencia del





círculo en los puntos N , N &c. se tirarán las NM , NM Fig. &c. paralelas á OC , que encuentren en M , M &c. las rectas correspondientes CD , CD &c. en las cuales se señalarán al otro lado del centro C unos puntos m , m &c. que estén á la misma distancia de dicho centro que los puntos correspondientes M , M &c. Es evidente por lo dicho (121) que la curva que pasa por todos los puntos M , M &c.; m , m &c. hallados por este camino, tendrá por diámetros conjugados las rectas Aa , Bb .

II. Sobre el uno de los semidiámetros CB , se señalarán 56. las partes CE , EE &c. pequeñas é iguales unas con otras, de una magnitud arbitraria, y quantas cupieren en dicho semidiámetro; se le tirarán las perpendiculares ED , ED &c que encuentren en D , D &c. la circunferencia del círculo cuyo centro sea C , y CB el radio. Se tirará AB , y por el punto E que estuviere mas cerca del centro C , la EP paralela á AB , que encuentre CA en P . En el diámetro Aa se señalarán al uno y otro lado del centro C quantas partes PP , PP &c. iguales á CP cupieren en él; por todos los puntos P , P &c. se tirarán las MPM , MPM &c. paralelas al diámetro Bb , y en cada una de estas se señalarán al uno y otro lado de P las partes PM , PM cada una igual á su correspondiente ED . La curva que pasare por todos estos puntos será la elipse que se pide.

Porque si llamamos CA , t ; CB ó CD , c ; CP , x ; y PM , y ; tendremos en virtud de los triángulos semejantes CAB , CPE , la proporcion $CA:CB::CP:CE$ ó

Fig. $t: c:: x: CE = \frac{cx}{t}$. Y por razon del triángulo CED rectángulo en E , $(ED)^2$ ó $(PM)^2 = (CD)^2 - (CE)^2$, esto es $yy = cc - \frac{c^2xx}{t^2}$. Luego PM será (93 y 112) una ordenada al diámetro Aa . Y como podríamos demostrar lo mismo respecto de todas las lineas PM , por haber siempre una misma razon entre cada CP y su correspondiente CE , que entre CA y CB ; se sigue que la curva que pasare por todos los puntos M hallados segun se ha dicho será la elipse que se pide.

De la Hypérbola.

57. 129 Si en un punto f de un plano aseguramos el un extremo de una regla larga fMO , de forma que pueda moverse con libertad al rededor del mismo punto fijo f , y en el otro extremo O de dicha regla afianzamos el cabo de un hilo OMF que sea menos largo que la regla, y que esté atado por el otro cabo á otro punto F del mismo plano; si hacemos dar la buelta al rededor del punto f la regla fMO , manteniendo al mismo tiempo con el lapiz M siempre muy tirante el hilo OMF , y su parte MO tan arrimada á la regla como si la estuviera pegada, resultará de este movimiento una curva AX , que será una porcion de *Hypérbola*.

Si se pasa la regla al otro lado del punto F , se trazará del mismo modo la otra porcion AZ de la misma *hypérbola*.

Pero si atamos en F el extremo de la misma regla,

y en f el extremo del mismo hilo, trazaremos del mismo modo otra curva *xax* opuesta á la primera, y que tambien se llama *Hypérbola*. Las dos curvas juntas se llaman *Hypérbolas opuestas*. Fig.

130 Los dos puntos fijos F y f se llaman los *Focus*.

131 El *primer Ege* es una línea Aa que pasa por los dos focus F y f , y remata por ambos lados en las *Hypérbolas opuestas*.

132 El *Centro* es un punto C que divide por el medio el primer ege Aa .

133 Si por el centro C se le tira una perpendicular indefinita Bb al primer ege Aa , y desde A como centro trazamos con el intervalo CF un arco de círculo que la corte en los dos puntos B y b ; la parte Bb de dicha perpendicular se llamará el *segundo Ege*.

134 Los dos eges Aa , Bb juntos se llaman *Conjugados*; por manera que el primer ege Aa se llama *conjugado* al segundo Bb ; y recíprocamente el segundo Bb es *conjugado* al primero Aa .

135 Las líneas MP , MK , tiradas desde los puntos M de las *hypérbolas opuestas* paralelamente al uno de los eges conjugados, y que van á rematar en el otro, se llaman *Ordenadas* á este último ege. Así, MP es una *ordenada* al primer ege Aa , y MK lo es al segundo Bb .

136 Una línea tercera proporcional á los dos eges, se llama el *Parámetro* del que ocupa el primer lugar en la proporcion. Así, si hacemos que el primer ege Aa sea al

Fig. segundo Bb como este segundo Bb á una tercera proporcional p ; esta tercera p será el *parámetro* del primer ege Aa .

137 Llamamos *Diámetros* todas las líneas que pasan por el centro C ; los que encuentran las *hypérbolas* opuestas se llaman *primeros Diámetros*, los que no las encuentran aunque se prolonguen al infinito, se llaman *segundos Diámetros*.

138 Una recta que no encuentra una *hypérbola* más que en un punto, y que continuada por ambos lados no se mete adentro, antes sí cae de la parte de afuera, se llama *Tangente* en dicho punto.

58. 139 El hilo FMO ha de ser por precisión mas largo ó menos largo que la regla fMO (129); porque si cogiera de largo lo propio que la regla, el lapiz M trazaria en su movimiento una línea cuyos puntos M estarían todos á igual distancia de F que de f ; pues si del hilo y de la regla restáramos la parte comun MO , los residuos MF , Mf serían siempre iguales el uno al otro. De lo que resulta que el lapiz M trazaria una línea recta indefinita Bb , perpendicular á la recta Ff que pasaría por su punto del medio C .

57. 140 De lo dicho (129) se sigue 1.º que si desde un punto qualquiera M de la una de las *hypérbolas* opuestas tiramos á los dos focus F , f las rectas MF , Mf , su diferencia siempre será una misma. Porque será igual á la diferencia que vá de la longitud de la regla á la del hilo. Las dos líneas MF , Mf se llaman *Radios vectores*.

141 2.º Quando el punto M cae en A , es patente que

MF ,

MF se confunde con AF , y Mf con Af ; y quando el Fig. punto M cae en a , al tiempo de trazar la hypérbola opuesta xaz , es tambien patente que MF se confunde con aF , y Mf con af . Luego ya que la diferencia de dichas dos rectas es siempre una misma, será $Af - AF$ ó $Ff - 2AF = aF - af$ ó $Ff - 2af$; y por lo mismo $AF = af$. De donde resulta

1°. Que el centro C divide por el medio la distancia que hay desde el un focus al otro; porque $CA + AF$ ó $CF = Ca + af$ ó Cf .

2°. Que la diferencia que hay entre las dos rectas MF , Mf es siempre igual al primer ege Aa ; porque en la hypérbola XAZ , siempre se verifica que $Mf - MF = Af - AF$ ó $Af - af$; y en su opuesta xaz , se verifica igualmente que $MF - Mf = aF - af$ ó $aF - AF$.

142 3°. De lo dicho (133) inferiremos

1°. Que el centro C divide en dos partes iguales el segundo ege Bb ; porque los triángulos rectángulos ACB , ACb , serán iguales, pues tienen iguales sus hypotenusas AB , Ab , y el lado AC es comun á los dos.

2°. Que si tomamos en el segundo ege Bb , la parte CE igual á la mitad CA del primero, y tiramos la hypotenusa AE ; el segundo ege Bb será mayor, igual ó menor que el primero Aa , segun fuere la recta CF mayor, igual ó menor que la hypotenusa AE ; porque la hypotenusa Ab , tomada igual á CF , será tambien entonces mayor, igual ó menor que la hypotenusa AE .

Fig. 3.º Que si al uno y otro lado del centro C tomamos en el primer ege Aa , las partes CF , Cf iguales cada una á la hypotenusa AB del triángulo rectángulo CAB , que forman los dos semiejes CA , CB ; los puntos F , f serán los dos focus.

57. 143 4.º Quedándose todo conforme hemos supuesto, si llamamos CF ó AB , m ; Ca ó CA , t ; el triángulo rectángulo ACB dará $(BC)^2 = mm - tt$. Pero $AF = m - t$, y $Fa = m + t$; luego $AF \times Fa = mm - tt$. De donde se infiere que el quadrado de la mitad CB del segundo ege Bb , es igual al rectángulo de AF por Fa , que son las dos partes del primer ege Aa que están respectivamente entre el focus F y sus dos extremos A , a .

144 5.º Ya podríamos trazar las hypérbolas opuestas si fuesen dados los dos eges Aa , Bb , y supiéramos que el ege Aa ha de ser el primero. Porque empezáramos determinando (142) en el primer ege Aa los dos focus F , f , despues afianzaríamos en el punto F el un cabo de un hilo FMO , estando el otro cabo O afianzado en el extremo de una regla OMf , mobil en su otro extremo f al rededor del focus f , y que coja de largo lo mismo que el hilo OMF , mas ó menos (139) la línea Aa . Si trazáramos por medio de esta regla y del hilo dos hypérbolas opuestas XAZ , xaz conforme enseñamos (129), es evidente que sería su primer ege la línea Aa , y la Bb sería el segundo.

Quanto mas larga fuese la regla OMf , tanto mayores sal-

saldrán las porciones de las hypérbolas opuestas ; de forma Fig. que está en nuestra mano trazarlas tan grandes como quiésemos , valiéndonos de una regla , y de un hilo ambos más largos.

145 Si despues de tirada una ordenada MP al primer ege Aa , tomamos en su prolongacion la parte $AD = MF$, del lado del focus F quando el punto M está en la hypérbola XAZ , y del lado del focus f quando está en su opuesta xaz ; será $CA : CF :: CP : CD$.

Llamemos como antes CA ó Ca , t ; CF ó Cf , m ; CP , x ; PM , y ; y CD , z : en el primer caso tendremos AD ó $MF = z - t$, aD ó $Mf = z + t$, $FP = x - m$ ó $m - x$ (conforme esté el punto P mas abajo ó mas arriba que el focus F) $Pf = x + m$; y en el segundo supuesto , AD ó $MF = z + t$, aD ó $Mf = z - t$, $FP = x + m$, $Pf = x - m$ ó $m - x$, segun estuviere el punto P mas arriba ó mas abajo del focus f .

Sentado esto , el triángulo rectángulo MPF dará $zz \mp 2tz + tt = yy + xx \mp 2mx + mm$; conviene á saber , — en el primer caso , y + en el segundo ; y el otro triángulo rectángulo MPf dará $zz \pm 2tz + tt = yy + xx \pm 2mx + mm$, esto es , + en el primer caso , y — en el segundo.

Si restamos ordenadamente en el primer supuesto , la primera equacion de la segunda , y la segunda de la primera , en el segundo supuesto , resultará $4tz = 4mx$; de donde sacaremos $CD = z = \frac{mx}{t}$. Luego $CA : CF :: CP : CD$, pues $t : m :: x : z$.

Fig. 146 Es patente que si llamamos CA ó Ca, t ; CF ó Cf, m ; y CP, x , siempre $MF = \frac{mx}{t} - t$, y $Mf = \frac{mx}{t} + t$, quando el punto M está en la *hypérbole* XAZ cuyo focus es F ; y al contrario saldrá $MF = \frac{mx}{t} + t$, y $Mf = \frac{mx}{t} - t$, quando M estuviere en su opuesta xaz , cuyo focus es f .

147 El quadrado de una ordenada qualquiera PM al 57. primer ege Aa , es al rectángulo de las partes AP y Pa de dicho ege prolongado, como el quadrado de su conjugado Bb , es al quadrado del primer ege Aa : quiero decir, que $(PM)^2 : AP \times Pa :: (Bb)^2 : (Aa)^2$.

Caminando en los mismos supuestos de antes (145) si en la equacion $zz \mp 2tz + tt = yy + xx \mp 2mx + mm$, que inferimos (145) del triángulo rectángulo MPF , substituimos en lugar de z su valor $\frac{mx}{t}$, siempre sacaremos estotra $ttyy = mmxx - mmtt - ttxx + t^4$, que reducida á proporcion dá $yy : xx - tt :: mm - tt : tt$, ó $(PM)^2 : AP \times Pa :: (BC)^2 : (CA)^2 :: (Bb)^2 : (Aa)^2$.

De aquí podemos sacar varias consecuencias muy fundamentales.

148 1.º Si al segundo ege Bb que llamaremos $2c$ le tiramos una ordenada MK , es evidente que $MK = CP = x$, y que $CK = PM = y$. Pero $(PM)^2 : AP \times Pa :: (Bb)^2 : (Aa)^2$, ó $yy : xx - tt :: 4cc : 4tt$; por consiguiente $4ccxx = 4cc tt + 4t tyy$; de donde resulta la proporcion $xx : yy + cc :: 4tt : 4cc$, esto es $(MK)^2 : (CK)^2 + (CB)^2 :: (Aa)^2 : (Bb)^2$.

Quiero decir que el quadrado de una ordenada qualquiera MK al segundo ege Bb , es al quadrado de CK mas el quadrado de CB mitad del segundo ege Bb , como el quadrado de su conjugado Aa , es al quadrado del segundo ege Bb .

149 2.º Si al primero ú segundo ege Aa le llamamos $2t$; á su conjugado Bb , $2c$; á su parámetro p ; á cada una de sus ordenadas PM , y ; y á cada abscisa CP , x : siempre sacaremos (147 y 148) $(PM)^2 : (CP)^2 \mp (CA)^2 :: (Bb)^2 : (Aa)^2 :: p : Aa$, ó $yy : xx \mp tt :: 4cc : 4tt :: p : 2t$, por ser (136) $Aa : Bb :: Bb : p$, ó $2t : 2c :: 2c : p = \frac{4cc}{2t}$; servirá el signo — quando el ege Aa fuere el primero, en cuyo caso podremos substituir en lugar de $(CP)^2 - (CA)^2$ el rectángulo $AP \times Pa$, que es su igual; y al contrario servirá el signo + quando Aa fuere el segundo ege. Multiplicando los extremos y los medios de la primera proporcion $yy : xx \mp tt :: 4cc : 4tt$, y despues los de la segunda $yy : xx \mp tt :: p : 2t$, sacaremos $yy = \frac{ccxx}{t} \mp cc$, é $yy = \frac{pxx}{2t} \mp \frac{1}{2} pt$. Y como esta propiedad se verifica igualmente en todos los puntos de las hypérbolas opuestas, y determina su posicion respecto de los eges; se sigue que la equacion $yy = \frac{ccxx}{t} \mp cc$, ó $yy = \frac{pxx}{2t} \mp \frac{1}{2} pt$ espresa perfectamente la naturaleza de esta curva comparada con sus eges.

Si contáramos las abscisas x desde el vértice A , sería $AP \times Pa = 2tx + xx$, y sacaríamos $yy = \frac{cc}{t} (2tx + xx)$ que tambien espresaria la naturaleza de la hypérbola.

En

Fig. En virtud de este último supuesto sacaremos $yy : 2tx + xx :: p : 2t$, que dá $yy = px + \frac{p^2 x x}{2t}$, que tambien representa la hypérbola.

150 3.º Si tiramos dos ordenadas qualesquiera MP , $59. NQ$ al ege Aa , es evidente que $(MP)^2 : (NQ)^2 :: (CP)^2 \mp (CA)^2 : (CQ)^2 \mp (CA)^2$. Porque $(PM)^2 : (CP)^2 \mp (CA)^2 :: (Bb)^2 : (Aa)^2 :: (QN)^2 : (CQ)^2 \mp (CA)^2$: Luego &c.

Tambien es de notar, que en lugar de $(CP)^2 - (CA)^2$ y de $(CQ)^2 - (CA)^2$ podemos substituir los rectángulos $AP \times Pa$, $AQ \times Qa$, que son sus iguales.

151 4.º Si por un punto qualquiera P del uno de los dos eges Aa , prolongándole si fuere el primero, tiramos una paralela MPM á su conjugado Bb ; encontrará una hypérbola ó las hypérbolas opuestas en dos puntos M, M igualmente distantes por ambos lados del punto P , y no las encontrará en mas puntos. Porque para que los puntos M, M pertenezcan á una hypérbola, ó á las hypérbolas opuestas, es forzoso (149) que cada uno de los cuadrados de PM , que están á cada lado del ege Aa , sea igual á una misma cantidad $\frac{ccxx}{tt} \mp cc$.

152 5.º Una vez que $yy = \frac{ccxx}{tt} \mp cc$, quanto mayor fuere $CP = x$ contada desde el centro C , tanto mayor será tambien cada ordenada $PM = y$, contándola desde el ege Aa al uno y otro lado, y crecerá al infinito; y al contrario, quanto menor fuere CP ó x , tanto menor será tambien PM ó y ; por manera que si fuese $CP = x$ igual á CA ó $Ca = t$, quando el ege Aa es el primero, PM ó y

será entonces nula ó cero ; y quando fuere $CP = x$ nula ó Fig. 60.
 cero, siendo Aa el segundo ege, cada PM que se reduce enton-
 ces á CB ó $Cb = c$, será la menor de todas las orde-
 nadas PM que están al uno y otro lado del centro. De don-
 de resulta claramente

1.º Que si por los extremos B, b del primer ege Bb 60.
 se tiran paralelas al segundo ege Aa , serán tangentes en
 dichos puntos.

2.º Que las hypérbolas opuestas se ván desviando mas
 y más al infinito de sus eges conjugados, empezando desde
 los extremos del primero ; hay sin embargo entre estos eges
 la diferencia de que el primero encuentra cada una de las
 hypérbolas opuestas en un punto, y prolongado pasa por
 dentro de ellas, en lugar de que todo el segundo ege está en-
 tre las hypérbolas opuestas, y aunque se le prolongue al in-
 finito, jamas las llega á encontrar.

153 6.º Tambien se sigue de ser $xy = \frac{ccxx}{xx} = cc$ que 59.
 si tomamos los puntos P, P á iguales distancias por ambos 60.
 lados del centro C , serán iguales las ordenadas PM, PM .
 De donde resulta, que toda linea MM que remata en una
 hypérbola ó en las hypérbolas opuestas, y está dividida en
 dos partes iguales por un ege Bb en un punto K que no sea
 el centro, será paralela á su conjugado Aa . Porque si tira-
 mos las paralelas MP, MP al ege Bb , la linea PP estará
 dividida por el medio en C , una vez que MM lo está en K ;
 y por consiguiente serán iguales las ordenadas PM, PM .
 Luego la MM será paralela al ege Aa .

Fig. 154 Si imaginamos que el plano en que están trazadas las dos *hypérbolas* opuestas, esté doblado á lo largo del ege *Aa*, de forma que lleguen á juntarse sus dos partes; es evidente que quando *Aa* fuere el segundo, las dos *hypérbolas* opuestas coincidirán exactamente una con otra; esto es, los puntos *B*, *M* &c. coincidirán con los *b*, *M* &c. una vez que (151) todas las perpendiculares *Bb*, *MM* &c. á dicho ege están divididas en dos partes iguales en *C*, *P* &c.

159. Por la misma razon quando el ege *Aa* fuere el primero, coincidirán exactamente una con otra las porciones de las *hypérbolas* opuestas, que están al uno y otro lado de dicho ege.

61. 155 Si por el centro *C* se tiran dos rectas indefinitas *CG*, *Cg* paralelas á las lineas *Ab*, *AB* tiradas desde el extremo *A* del primer ege *Aa* á los dos extremos *B*, *b* del segundo, dichas dos rectas se llaman las *Asýmtotas* de la *hypérbola* *MAM*; y si estas mismas se prolongan indefinitamente al otro lado del centro, se llamarán las *asýmtotas* de la *hypérbola* opuesta *MaM*.

156 El quadrado de la parte *CG* ó *Cg* de una *asýmtota* comprehendida entre el centro *C*, y el concurso de la *AB* ó *Ab* tirada por el extremo *A* del primer ege al extremo *B* ó *b* del segundo, se llama la *Potencia* de la *hypérbola* *MAM* ó de su opuesta *MaM*.

157 Es patente 1.º que el ángulo *GCg* que forman las *asýmtotas*, ó su igual *BAb*, será menor, igual ó mayor que un ángulo recto, segun fuere el segundo ege *Bb*

me-

menor, igual ó mayor que el primer ege Aa . Porque quando el primer ege Aa es mayor que el segundo Bb , su mitad CA es mayor que la mitad CB del segundo; y por consiguiente el ángulo CAB del triángulo rectángulo CAB será menor que un ángulo semirecto. Luego los dos ángulos iguales CAB , CAb que forman juntos el ángulo BAb , valdrán menos que un ángulo recto. Los otros dos casos se prueban del mismo modo.

158 2.º De la semejanza de los triángulos BAb , BGC resulta que la asíntota CG parte por el medio en G la línea AB , y que CG es la mitad de AB , por ser BC la mitad de Bb . Del mismo modo probaremos que la asíntota Cg divide por el medio en g la línea Ab , y que Cg es la mitad de Ab . Luego todas las líneas CG , GA , GB , Cg , gA , gb son iguales unas con otras; pues cada una de ellas es igual á la mitad de una ú otra de las líneas AB , Ab , que son iguales (133).

159 3.º La potencia de una hypérbola es igual á la quarta parte de la suma de los quadrados de los dos semi-eges. Porque si llamamos CA , t ; CB , c ; CG , m , tendremos (158) $BA = 2m$, y el triángulo rectángulo ACB dará $(AB)^2 = 4mm = tt + cc$. Luego $(CG)^2 = mm = \frac{tt + cc}{4}$.

160 Si por un punto qualquiera M de la una ó de 61. la otra de las dos hypérbolas opuestas tiramos la recta Rr perpendicular al primer ege Aa , encontrándole en P , y que remate en los puntos R y r de las asíntotas; será el produc-

Fig. *to* $RM \times Mr = (BC)^2 =$ al quadrado de la mitad del segundo ege *Bb*.

Llamaremos *CA*, *t*; *CB*, *c*; *CP*, *x*; *PM*, *y*; y de los triángulos semejantes *ACB*, *CPr*, y *ACb*, *CPR* inferiremos $CA:CB$ ó $Cb::CP:Pr$ ó PR , esto es $t:c::x:PR$ ó $Pr = \frac{cx}{t}$. Luego $RM = PR \pm PM = \frac{cx}{t} \pm y$; y Mr ó $Pr \mp PM = \frac{cx}{t} \mp y$. Por consiguiente $RM \times Mr = \frac{c^2xx}{t^2} - yy = cc = (BC)^2$ ó Pr , con substituir en lugar de yy su valor (149) $\frac{c^2xx}{t^2} - cc$.

161 De donde se sigue 1.º que $(PM)^2 = \frac{c^2xx}{t^2} - cc$ es siempre menor que $(PR)^2$ ó $(Pr)^2 = \frac{c^2xx}{t^2}$, y que por lo mismo todos los puntos de las hypérbolas opuestas están dentro de los ángulos que forman sus asímtotas; por manera que ninguno de ellos puede estar dentro de los ángulos que estan al lado de aquellos.

162 2.º Si por dos puntos cualesquiera *M*, *N* de una hypérbola, ó de las hypérbolas opuestas, tiramos dos líneas rectas *Rr*, *Kk* perpendiculares al primer ege, y que rematen en las asímtotas; es evidente que $RM \times Mr = KN \times Nk$, porque cada uno de estos productos será siempre $= (BC)^2$. Luego $RM:KN::Nk:Mr$.

61. 163 Si por dos puntos cualesquiera *M*, *N* de una hypérbola ó de las hypérbolas opuestas, tiramos dos rectas *Hh*, *Ll* paralelas la una á la otra, y que rematen en las asímtotas; tendremos $HM \times Mh = LN \times Nl$.

Porque si tiramos las rectas *Rr*, *Kk* perpendiculares al primer ege *Aa*, los triángulos *MRH*, *NKL*, y *Mrb*, *Nkl*

Nkl serán semejantes, por ser paralelos sus lados ca la uno al suyo. Tendremos, pues, $RM : KN :: HM : LN$; y $Nk : Mr :: Nl : Mb$. Pero (162) $RM : KN :: Nk : Mr$; luego $HM : LN :: Nl : Mb$, y por consiguiente $HM \times Mb = LN \times Nl$. Fig.

164 Luego 1.º si suponemos que la linea *NL* paralela á *MH* pase por el centro *C*, ó se confunda con *CE*; es constante que los dos puntos *L*, *l* coincidirán con el centro *C*, en cuyo caso será $LN \times Nl = (EC)^2$. De donde se sigue que si desde un punto qualquiera *E* de la una de las hypérbolas opuestas se tira al centro *C* la recta *CE*, y por otro punto qualquiera *M* de la una ó de la otra de dichas hypérbolas, una linea *MHb* paralela á *CE*, que encuentre las asímtotas en *H* y *b*, será $(CE)^2 = HM \times Mb$. 61.

165 2.º Si por un punto qualquiera *N* de la una de las hypérbolaa opuestas, tiramos una recta *Ll*, que remate en las asímtotas, y que encuentre á qualquiera de las dos hypérbolas en otro punto *n*; las partes *LN*, *ln* de dicha recta que estuvieren entre los puntos de las hypérbolas, y las asímtotas, serán iguales una con otra. Porque si llamamos *LN*, *a*; *Nn*, *b*; *nl*, *c*, será $LN \times Nl = ab \mp ac = HM \times Mb = Ln \times nl = bc \mp ac$: luego $a = c$ ó $LN = ln$.

166 3.º Si en la última consecuencia suponemos que la linea *Nn* que remata en las hypérbolas opuestas pase por el centro *C*, ó, lo que es lo mismo, llegue á ser el primer diámetro *ED*; los dos puntos *L*, *l* coincidirán con el centro *C*, y será $NL = EC$, y $nl = CD$. De donde inferiremos que

Fig. que el centro C está en medio de todo primer diámetro DE .








167 4.º Quando dos rectas Mm , Nn paralelas remataren en una hypérbola, ó en las hypérbolas opuestas, y encontraren una asíntota en los puntos H , L ; será $MH \times Hm = NL \times Ln$. Porque si prolongáramos, supuesto que fuera preciso, dichas dos líneas, hasta que encontráran á la otra asíntota en los puntos b , l , las partes MH , mb , y NL , nl serían (165) iguales unas con otras; y por consiguiente ya que $HM \times Mb = LN \times nl$, sería también $MH \times Hm = NL \times Ln$.

62. 168 Si por dos puntos qualesquiera M , N de una hypérbola ó de las hypérbolas opuestas, tiramos dos rectas paralelas MH , NL que rematen en una asíntota; y otras dos rectas también paralelas Mh , Nl , y que rematen en la otra asíntota; será $HM \times Mh = NL \times Nl$.

Pruebase del mismo modo que la proposición que sentamos antes (163).

63. 169 Por consiguiente 1.º Si las rectas MH , Mb , y NL , Nl fuesen paralelas á las asíntotas; los paralelógramos $MHcb$, $NLCI$, y los triángulos CHM , CLN que son sus mitades, serán iguales; por ser recíprocamente proporcionales los lados de dichos paralelógramos que forman los ángulos iguales HMb , LNI .

170 2.º Suponiendo lo mismo que en la última consecuencia, inferiremos que $CH \times HM = CL \times LN$; porque en este supuesto $Mb = CH$, y $Nl = CL$. Esto significa que si por dos puntos qualesquiera M , N de la
una





una, ó de las hypérbolas opuestas, se tiran dos rectas MH , Fig. NL paralelas á la una de las asýmtotas, y que rematen en la otra; siempre será $CH \times HM = CL \times NL$, y por consiguiente $CH:CL::LN:MH$.

171 3.º Por ser el extremo A del primer ege uno 63. de los puntos de la hypérbola, y por ser paralela á la asýmtota Cg la linea AB que corta en G la asýmtota CG ; se sigue (170) que siempre será $CH \times HM = CG \times GA = (158) (CG)^2$, esto es (156), á la potencia de la hypérbola. Por consiguiente si llamamos CG, m ; CH, x ; HM, y ; siempre será $xy = mm$. Y como esta equacion se verifica en todos los puntos de las hypérbolas opuestas, y fija su posicion respecto de sus asýmtotas; resulta que $xy = mm$ espresa la naturaleza de la hypérbola comparada con sus asýmtotas.

172 4.º De ser $MH = y = \frac{mm}{x}$ resulta, que quanto mas crece $CH = x$, tanto mas mengua la $HM = y$; por manera que si fuese x infinitamente grande, sería y infinitamente pequeña, esto es nula ó cero. Es, pues, evidente que la hypérbola AM y su asýmtota CH , prolongándolas, se ván arrimando mas y mas, de suerte que al fin su distancia llega á ser menor que qualquiera cantidad assignable; y que no obstante nunca pueden llegar á tocarse, porque solo se juntarian en el infinito, al qual no es posible que lleguen. Lo propio diremos de la otra asýmtota Cg .

173 5.º De quantas lineas pasan por el centro C ,

Fig. 1.º. las que están como Aa dentro de los ángulos que forman las asímtotas del lado de las hipérbolas, encuentran á cada una de las hipérbolas opuestas en un punto A ó a , no mas; y prolongadas, pasan por dentro de dichas hipérbolas. Porque por razon de los ángulos GCA , gCA y de sus opuestos al vértice, es evidente que la linea Aa se vá desviando mas y mas de ambas asímtotas, en lugar de que las hipérbolas opuestas siempre se las ván arrimando (172) mas y mas. 2.º Las que están como Bb en los ángulos del lado que forman tambien las asímtotas, jamás pueden llegar á encontrar las hipérbolas opuestas aunque se las prolongue al infinito, porque no puede haber dentro de estos ángulos ningun punto de las hipérbolas (161).

De donde se sigue (137) que todos los primeros diámetros caen dentro de los ángulos que forman las asímtotas á la parte de las hipérbolas, y que los segundos caen en los ángulos de al lado.

174 6.º Si por un punto qualquiera H de la una de las asímtotas CE , se tira una paralela MH á la otra Ce ; no encontrará la hipérbola mas que en un solo punto M ; y si se la prolonga, pasará por dentro. Porque se mantienen todos sus puntos á la misma distancia de Ce , siendo así que la hipérbola se la vá arrimando (172) mas y mas.

175 7.º De aquí resulta que si por un punto qualquiera M de una hipérbola, se tiran dos rectas indefinitas MH , Mb paralelas á sus asímtotas Ce , CE ;

1.º Todos los puntos de la *hypérbola* su opuesta Fig. caerán dentro del ángulo *HMb*; por caer todos ellos (161) dentro del ángulo que forman las *asímtotas*, el qual está dentro del ángulo *HMb*.

2.º Las dos porciones de la *hypérbola* estarán en los dos ángulos que están al lado de dicho ángulo; y por consiguiente ninguno de sus puntos estará dentro del ángulo opuesto al vértice al ángulo *HMb*.

3.º Todas las líneas que como *MF* están dentro del ángulo *HMb*, encuentran, prolongadas ácia *F*, la *hypérbola* opuesta en un punto *N*, y pasan por dentro; porque se van desviando mas y mas de las rectas *MH*, *Mb*, y por consiguiente de sus dos *asímtotas* que son paralelas á dichas líneas; pero si se las prolonga ácia el otro lado del punto *M*, entran adentro de la *hypérbola* que pasa por dicho punto, y no la buelven á encontrar mas.

4.º Todas las líneas que como *Ee* están dentro de los ángulos colaterales al ángulo *HMb*, encuentran las dos *asímtotas* de la *hypérbola* que pasa por el punto *M*; por consiguiente quando pasan por dentro de una de sus porciones, la han de encontrar indispensablemente en algun punto *N*, pues van á encontrarse con la *asímtota* que cae á la parte de afuera de dicha porcion.

176 8.º Si por un punto qualquiera *M* de una *hy-* 64.
pérbola, se tira una recta *Ff* que encuentre una de sus *asímtotas* en *F*, y una de las *asímtotas* de la *hypérbola* opuesta en *f*, y se la prolonga ácia *N*, de forma que *fN*

Fig. sea igual á FM ; el punto N será uno de los de la *hypérbola* opuesta. Porque la línea Ff cae dentro del ángulo HMb , y encuentra por consiguiente la *hypérbola* opuesta en algun punto N , segun acabamos de demostrar (175). Luego (165) &c.

2.º Si por un punto qualquiera M de una *hypérbola*, se tira una recta Ee que remate en sus *asýmtotas*, y en dicha línea se toma la parte $eN = EM$; el punto N será tambien uno de los de dicha *hypérbola*. Porque sí tiramos MH paralela á la *asýmtota* Ce , que remate en la otra en H , tomamos en esta segunda *asýmtota* la parte CL igual á HE , y tiramos LN paralela á HM ; en virtud de lo demostrado (174) encontrará la *hypérbola* en un punto N , y por lo dicho (170) será tal el punto N que CL ó $HE : HM :: CH$ ó $EL : LN$; por lo que se echa de ver que la LN encuentra la *hypérbola* en el mismo punto donde encuentra la recta Ee . Pero por razon de las paralelas HM , LN , será $eN = EM$, por ser $CL = HE$. Luego &c.

64. 177 Propongámonos resolver la siguiente cuestion: Dadas las *asýmtotas* CE , Ce de una *hypérbola*, tirar desde un punto M dado en dicha *hypérbola* la *tangente* DMd , y demostrar que no se la puede tirar mas que una.

Despues de tirada desde el punto dado M una paralela MH á la una de las *asýmtotas* Ce , que remate en el punto H de la otra *asýmtota* CE , tomaremos, en esta la parte $HD = HC$. Si por el punto dado M ti-

ramos la recta DM que encuentre la asíntota Ce en un punto d ; 1.º. la línea DMd encontrará la hipérbola en M . Fig.

Porque por razon de los triángulos semejantes CDd , HDM , el punto M divide por el medio la recta Dd que remata en las asíntotas, así como el punto H está en medio de la CD . Pero si fuera posible que encontrase la hipérbola en otro punto O , sería (165) $Od = MD$, y por consiguiente $= Md$, esto es, la parte sería igual al todo; pero como esto es imposible, tambien lo es que la línea DMd encuentre la hipérbola mas que en un punto M . Ademas de esto, si pasára como Ee por dentro, es evidente que encontraría en algun punto N la porcion de la hipérbola por dentro de la qual pasára, pues iría á encontrar en un punto e la asíntota Ce , que cae (161) á la parte de afuera de dicha porcion. Luego es evidente que la recta Dd no encuentra la hipérbola mas que en un punto M , y que no se mete adentro, esto es, que es tangente en dicho punto.

2.º No hay mas línea que la DMd que pueda tocar la hipérbola en un punto M ; porque si tomamos en la asíntota CE la parte HE mayor ó menor que HD , y por el punto dado M tiramos la recta EM que encuentre en e la otra asíntota Ce , es evidente que, por razon de las paralelas MH , Ce , será ME mayor ó menor que Me , pues se ha tomado HE mayor ó menor que HD ó que HC . Sentado esto, si tomamos en la parte mayor Me el punto N , tal que Ne sea igual á ME , es

Fig. evidente que dicho punto (176) será también uno de los de la *hypérbola*, y así la recta *Ee* no la tocará en *M*.

64. 178 Hemos demostrado (172) que quanto mas crece *CH*, tanto mas mengua *HM*; de forma que quando *CH* es infinitamente grande, *HM* es infinitamente pequeña, esto es, nula ó cero. Pero quando *CH* es infinitamente grande, *HD* que es su igual, lo ha de ser también; y por consiguiente las líneas *MD*, *HD*, que por no encontrarse sino en el infinito se pueden considerar como paralelas (I. 326), han de coincidir una con otra; pues en este caso se confundirá el punto *M* con el punto *H*; quiero decir que si se prolongan al infinito la asímtota *CE* y la *hypérbola*, podremos considerar la asímtota como una línea que toca la *hypérbola* en su extremo. Lo mismo decimos de la otra asímtota *Ce*, que se puede considerar como tangente de la *hypérbola* en el otro extremo.

De aquí resulta que podemos considerar las dos asímtotas como si fueran unas tangentes infinitas que tocan las *hypérbolas* opuestas en sus extremos.

179 1.º Como no hay línea alguna sino *DMd* que yendo á rematar en las asímtotas, esté dividida en dos partes iguales en el punto *M*; se sigue que si una recta *DMd* que remate en las asímtotas de una *hypérbola*, la encuentra en un punto *M*, que la divida por el medio, dicha recta será tangente de la *hypérbola* en dicho punto. Y recíprocamente que está dividida en dos partes iguales

les en M una recta Dmd que rematando en las asíntotas de una hipérbola, la toca en dicho punto M . Fig.

180 2.º Si por el punto de contacto M de una tan- 65.
gente qualquiera Dmd , que remata en las asíntotas CL ,
 Cl de una hipérbola, se tira un primer diámetro MCm ;
y por el punto m donde encuentra la hipérbola opuesta,
se tira una paralela Ee á la tangente Dd , que remata en
las asíntotas en E y e ; dicha linea será tangente en m .
Porque por ser (166) CM igual á Cm , serán iguales
y semejantes los triángulos CMD , CmE . Luego mE será
igual á MD . Del mismo modo probaremos que siendo igua-
les y semejantes los triángulos CMd , Cme , será me igual
á Md . Por esta razon el punto m divide por el medio la
recta Ee , una vez que el punto M divide del mismo mo-
do la Dd . Y por consiguiente (179) será tangente en m .

En virtud de esto se echa de ver que son paralelas
unas á otras las tangentes Dd , Ee que pasan por los es-
tremos de un primer diámetro qualquiera Mm ; y que son
tambien iguales quando ván á rematar en las asíntotas.

181 Llámanse *Diámetros conjugados*, dos diámetros 65.
 Mm , Ss quando el uno de ellos Ss es paralelo á las tan-
gentes que pasan por los extremos del otro diámetro Mm ,
y le terminan en S , s las rectas MS , Ms tiradas parale-
lamente á las asíntotas desde el uno de los extremos M
del diámetro Mm .

182 Las lineas tiradas desde unos puntos de las
hipérbolas opuestas paralelamente al uno de los diáme-

Fig. tros conjugados y que rematan en el otro, se llaman *Ordenadas* á este último. Así, *NO* es una ordenada al diámetro *Mm*.

183 Una línea tercera proporcional á dos diámetros conjugados, se llama el *Parámetro* del diámetro que ocupa el primer lugar en la proporción. De todo esto se sigue

184 1.º Que tambien se verifica en los dos eges lo que hemos dicho (181), yá que (152) el segundo ege es paralelo á las tangentes que pasan por el extremo del primero, y tambien remata (155) en dos rectas tiradas paralelamente á las asímtotas desde el uno de los extremos del primer ege. Se echa, pues, de ver que podemos considerar los dos eges como si fueran dos diámetros conjugados que forman uno con otro ángulos rectos.

165. 185 2.º Como el diámetro *SCs* es paralelo á la tangente *DMd*, que pasa por el un extremo *D* del diámetro *MCm*, y encuentra dicha tangente las dos asímtotas *CD*, *Cd* de la hipórbola que pasa por el punto *M*; se sigue que está dentro de los ángulos que están al lado del ángulo *DCd*, que forman las asímtotas de dicha hipórbola, y por lo mismo que es un segundo diámetro.

De donde podemos inferir, que de los dos diámetros conjugados *MCm*, *SCs*, hay siempre uno *Mm* que es primero, y otro *Ss* que es segundo.

186 3.º El centro *C* está en medio del segundo diámetro *SCs*, el qual es tambien igual á la tangente *DMd*, que pasa por el un extremo *M* del primer diámetro *Mm*, su

con-

conjugado , y remata en las asýmtotas. Porque por causa Fig. de las paralelas MS , Cd y Ms , CD , será $CS = Md$, y $Cs = MD$. Pero la DMd está dividida (179) por el medio en el punto de contacto M . Luego &c.

187 4.º Dados dos diámetros conjugados Mm , Ss , 65. y sabiendo qual de ellos es el primer diámetro , bastará para hallar las asýmtotas CD , Cd tirar por el centro C líneas paralelas á las dos rectas MS , Ms , tiradas desde el un extremo M del primer diámetro Mm , á los dos extremos S , s del segundo.

Y recíprocamente, dadas las dos asýmtotas CD , Cd de una hypérbola, y uno de sus puntos M ; bastará , para hallar dos de sus diámetros conjugados MCm , SCs , tirar la MH paralela á la una de las asýmtotas Cd , que encuentre la otra asýmtota CD en H ; y tirar, despues de prolongada ácia S , de modo que $HS = HM$, las rectas CM , CS . Porque si tiramos MD paralela á CS , de los triángulos semejantes CHS , MHD , se seguirá con evidencia que $HD = HC$, por ser $MH = HS$; y por consiguiente (177) será MD tangente en M ; de donde hemos de inferir, que (181) las líneas CM , CS son dos semidiámetros conjugados.

Es, pues, patente que dados de posición y magnitud dos diámetros conjugados Mm , Ss , y sabiendo qual de ellos es un primer diámetro ; se pueden hallar las dos asýmtotas CD , Cd , y el punto M de la una de las hypérbolas opuestas.

Y recíprocamente , dadas las dos asýmtotas CD , Cd
de

Fig. de una *hypérbola*, y uno de sus puntos *M*; se hallarán dos de sus diámetros conjugados *Mm*, *Ss* de posicion y magnitud determinadas, y sabremos qual de ellos será un primer diámetro, y será el que pasare por el punto *M*.

65. 188 5.º Si fuese dado de posicion un segundo diámetro *SCs*, y quisiésemos determinar su magnitud, y hallar el primer diámetro *Mm* su conjugado; le tiráramos donde quisiésemos dentro del ángulo que forman las *asímtotas*, una paralela *Ll*, que rematára en los puntos *L* y *l* de las *asímtotas*, y por su punto del medio *O* tiráramos el primer diámetro *CO*, que encontraria la *hypérbola* en un punto *M*; y si por este punto tiráramos las rectas *MS*, *Ms* paralelas á las *asímtotas*, es evidente por lo dicho (181) que los puntos *S*, *s* donde encontrarían el segundo diámetro *SCs* dado de posicion, determinarían su magnitud, y que el primer diámetro *MCm* sería su conjugado. Porque si por el punto *M* tiráramos la *Dd* paralela á *Ll*, que rematára en las *asímtotas*, estaría dividida por el medio en el punto *M*, por estár dividida *Ll* en dos partes iguales en el punto *O*; y por consiguiente (179) sería tangente en *M*.

De donde resulta, que dado de posicion un segundo diámetro *SCs*, está determinada de tal modo su magnitud, que no es mas que una, igualmente que la posicion y magnitud del primer diámetro *Mm* su conjugado.

189 6.º Dado de posicion y magnitud un segundo diámetro *SCs*, su parámetro, y la posicion de sus ordenadas; será facil hallar la posicion y magnitud del primer diá-

metro MC_m , su conjugado, con su parámetro. Porque si ti- Fig.
ramos por el centro C una paralela indefinita á las ordena-
das al diámetro Ss , señalaremos en dicha paralela dos pun-
tos M, m que estén cada uno á igual distancia, y al uno y
otro lado respectivamente del centro C , de suerte que Mm
sea igual á la media proporcional entre el segundo diámetro
y su parámetro. Buscando despues una tercera proporcional
á las dos líneas Mm, Ss , es evidente (182 y 183) que
 Mm será el primer diámetro conjugado al diámetro Ss , y
que su parámetro será la espresada tercera proporcional.

190 *El quadrado de una ordenada qualquiera NO al 65.*
primer diámetro Mm , es al rectángulo formado por las partes
 MO, Om de dicho diámetro prolongado; como el quadrado
de su conjugado Ss es al quadrado del primer diámetro Mm :
quiero decir que $(ON)^2 : MO \times Om :: (Ss)^2 : (Mm)^2$.

Tiremos por el un extremo M del primer diámetro Mm ,
una paralela Dd al segundo diámetro Ss , que remate en las
asímtotas; será dicha paralela (181) tangente en M ,
y estará (179) dividida por el medio en M . Por lo
que, si prolongamos la ordenada ON , que por lo dicho (182)
es paralela al diámetro Ss , al uno y otro lado del diámetro
 Mm , encontrará las asímtotas en dos puntos L, l que es-
tarán cada uno á la misma distancia del punto O . Sentado
esto, llamemos CM ó Cm, t ; CS ó Cs , ó (186) MD
ó Md, c ; CO, x ; ON, y ; los triángulos semejantes CMD ,
 COL darán esta proporción $CM : MD :: CO : OL$ ú Ol ; es-
to es $t : c :: x : OL$ ú $Ol = \frac{cx}{t}$. Luego LN ó $LO \pm ON =$

Fig. $\frac{cx}{t} \pm y$, y Nl ó $Ol \mp NO = \frac{cx}{t} \mp y$; por consiguiente $LN \times Nl = \frac{ccxx}{tt} - yy = (160) DM \times Md = cc$. Luego $yy : xx - tt :: 4cc : 4tt$, ó $(ON)^2 : MO \times Om :: (Ss)^2 : (Mm)^2$; porque si multiplicamos los extremos y los medios de esta proporcion, sacaremos $4ttyy = 4ccxx - 4cctt$, esto es la misma equacion que antes $\frac{ccxx}{tt} - yy = cc$, despues de divididos ambos miembros por $4tt$, y hecha la transposicion correspondiente.

191 No hay duda alguna en que quanto hemos probado (147) acerca de los dos eges Aa, Bb , se aplica en virtud de la última proposicion á dos diámetros conjugados qualesquiera Mm, Ss . Y como lo dicho (148....153) se funda en lo probado (147), y es verdadero sea recto ó no el ángulo ACB ; se infiere, que si en aquella proposicion, y las consecuencias que de ella inferimos suponemos que las líneas Aa, Bb en vez de ser los dos eges, sean dos diámetros conjugados qualesquiera, todo será verdadero en este último supuesto.

66. 192 Si dos tangentes qualesquiera DE, FG , de una hypérbola MA , que rematan en las asýmtotas, se cortan en un punto O ; los lados de los triángulos CDE, CFG al rededor del ángulo comun C , serán recíprocamente proporcionales.

Si por los puntos de contacto M, A tiramos las paralelas MH, AL á la asýmtota CG ; será cierto por causa de la semejanza de los triángulos CDE, HDM , que será CD dupla de CH , y CE dupla de HM ; por ser DE (179) du-

dupla de DM . Y de la semejanza de los triángulos CFG, LFA , Fig.
resultará ser CF dupla de CL , y CG dupla de LA , por ser
 FG dupla de FA . Pero (170) $CH:CL::LA:HM$:
luego $2CH$ ó $CD:2CL$ ó $CF::2LA$ ó $CG:2HM$ ó CE .

193 Infírese de esta proposicion, que la recta DG
es paralela á la recta FE ; de donde se sigue

1.º Que los triángulos CDE, CFG son iguales; porque
los triángulos FDE, FGE son iguales, pues tienen una
misma base FE , y están entre las mismas paralelas DG, FE ;
y si al uno y al otro le añadimos el mismo triángulo CEF ,
resultarán los dos triángulos CDE, CFG que serán iguales.

2.º Que la linea DE está dividida en los puntos M, O
en la misma razon que la linea FG en los puntos A, O .
Porque si por los puntos de contacto tiramos la recta MA ,
no hay duda en que será paralela á las dos rectas DG, FE ,
pues divide por el medio las rectas DE, FG , que están en-
tre dichas paralelas.

194 Si por un punto qualquiera M de una *hypérbola*, 67.
tiramos una ordenada MP á uno de sus primeros diámetros 68.
 Aa , el que quisiésemos, y una tangente MT que le encuentre
en T ; será $CP:CA::CA:CT$; previniendo que los puntos
 P, T están á un mismo lado respecto del centro C , quando
la recta Aa es un primer diámetro; y al contrario están
en distintos lados respecto del centro, quando es un segundo
diámetro.

1.º Quando la recta Aa fuere un primer diámetro. Se 67.
prolongará la tangente MT hasta que encuentre en D, E
las

Fig. las asímtotas CD , CG ; y la ordenada PM , hasta que encuentre en N la asímtota CD : se tirará despues por el punto A la AK paralela á DE , que encuentre la asímtota CG en K , y la tangente FG que remate en las asímtotas, y que será (182) paralela á PM , y encuentra la otra tangente DE en el punto O .

Sentado esto, AP está con AC , ó FN con FC en la razon compuesta de FN á FD , ó de OM á OD , ó (193) de OA á OG , ó de EK á EG , y de FD á FC , ó (193) de EG á EC . Pero AT está con TC , ó KE con EC en la razon compuesta de EK á EG , y de EG á EC . Luego $AP:AC::AT:TC$, por ser unas mismas las razones componentes de estas dos razones; y por consiguiente $AP + AC$ ó $CP:CA::AT + TC$ ó $CA:CT$.

2.^o Quando la recta Aa fuere un segundo diámetro. Se tirará por el centro C la recta CK paralela á la ordenada PM , que encuentre la hypérbola en B , y la tangente MT en R , y por el punto de contacto M se tirará la MK paralela á Aa ; no hay duda en que CB será el primer semi-diámetro conjugado al segundo Aa , y por lo mismo MK será ordenada á dicho diámetro.

Sentado esto, si llamamos CA ó Ca , t ; CB , c ; CP ó MK , x ; PM ó CK , y , tendremos en virtud de lo que acabamos de demostrar en el caso primero, $CR = \frac{cc}{y}$, y por consiguiente RK ó $CK - CR = \frac{yy - cc}{y}$. Pero los triángulos semejantes KRM , CRT dán $KR:RC::MK:CT$, esto es $\frac{yy - cc}{y} : \frac{cc}{y} :: x : CT = \frac{ccx}{yy - cc} = \frac{tt}{x}$, substituyendo en lu-

gar

gar de $yy - cc$ su valor $\frac{ccxx}{tt}$ sacado de la equacion $yy =$ Fig.
 $\frac{ccxx}{t} + cc$ (148 y 141) : quiero decir , que $CP :$
 $CA :: CA : CT$.

195 Si por un punto qualquiera M de una hypérbola 69.
 cuyo centro es C , se tira una ordenada MP al uno ó al otro 70.
 ege Aa , y una perpendicular MG á la tangente MT que pa-
 sa por M ; siempre se verificará que CP estará con PG en
 la razon dada del ege Aa á su parámetro.

Porque si llamamos el semiege CA ó Ca, t ; CP , x ;
 PM, y ; tendremos (194) $CT = \frac{t}{x}$; y por consiguient-
 e $PT = \frac{xx - tt}{x}$, segun fuere Aa el primero ó el segundo
 ege. Los triángulos rectángulos semejantes TPM , MPG
 dán $TP : PM :: PM : PG$, ó $\frac{xx - tt}{x} : y :: y : PG = \frac{xy}{xx - tt}$,
 de donde sacaremos $CP : PG :: (CP)^2 \mp (CA)^2 : (PM)^2$, ó
 $x : \frac{xy}{xx - tt} :: xx \mp tt : yy$; una vez que resulta un mismo pro-
 ducto xyy de la multiplicacion de los medios que de la de
 los extremos. Pero $(CP)^2 \mp (CA)^2$ es á $(PM)^2$, como (149)
 el ege Aa es á su parámetro. Luego CP está tambien con
 PG en la misma razon.

196 Si desde un punto qualquiera M de una hypér- 71.
 bola , se tiran á sus dos focus F , f las rectas MF , Mf ; la
 tangente MT que pasáre por dicho punto M , dividirá en dos
 partes iguales el ángulo FMe.











Porque si tiramos las perpendiculares FD , fd á la tan-
 gente MT ; el primer ege Aa que pase por los focus F , f , y
 encuentre la tangente en T ; y la ordenada MP á dicho ege ;
 y llamamos CA ó Ca, t ; CF ó Cf, m ; CP , x ; tendremos
MF :

Fig. $MF : Mf :: TF \text{ ó } CF - CT : Tf \text{ ó } Cf + CT$, esto es (146 y 194) $\frac{mx}{t} - t : \frac{mx}{t} + t :: m - \frac{t}{x} : m + \frac{t}{x}$, por ser igual el producto de los medios al de los extremos. Pero los triángulos rectángulos semejantes TFD , Tfd dan $TF : Tf :: FD : fd$; luego la hypotenusa MF del triángulo rectángulo MDF , será á la hypotenusa Mf del triángulo rectángulo Mdf , como el lado DF es al lado df , y por consiguiente serán semejantes estos dos triángulos. Luego serán iguales uno con otro los ángulos FMD , fMd opuestos á los lados homólogos DF , df .

197 De aquí resulta , que si se prolonga indefinitamente por ambos lados del punto de contacto M la tangente MT , dejará toda la hypérbola AM del lado de su focus interior F . Y como se verifica esto mismo esté donde estuviere en la hypérbola el punto M , se viene á los ojos que toda ella será cóncava al rededor de su focus interior F .

198 La diferencia de los quadrados de dos diámetros conjugados qualesquiera Mm , Ss es igual á la diferencia de los quadrados de los dos eges Aa , Bb ; quiero decir , que será $(CS)^2 - (CM)^2 = (CB)^2 - (CA)^2$ ó $(CM)^2 - (CS)^2 = (CA)^2 - (CB)^2$.

Si tiramos las rectas MS , AB , serán paralelas á la asímtota Cg , y además de esto las dividirá por el medio en H y G la otra asímtota CG , por ser (155 y 181) paralelas á dicha asímtota las rectas Ms , Ab , y estar divididos (186) por el medio en C los segundos diámetros Ss , Bb . Por esta razon, si á la asímtota CG se le tiran las perpen-





pendiculares AF , BE , ML , SK , resultarán los triángulos Fig. GAF , GBE , y HML , HSK iguales y semejantes. Senta-
do esto, llamaremos CG ó (158) GA , m ; GE ó GF , a ;
 AF ó BE , b ; CH , x ; HM , y ; y sacaremos $CE = m + a$,
 $CF = m - a$, $(CE)^2 + (EB)^2$ ó $(CB)^2 = mm + 2am$
 $+ aa + bb$, $(CF)^2 + (FA)^2$ ó $(CA)^2 = mm - 2am +$
 $aa + bb$, y por consiguiente $(CB)^2 - (CA)^2 = 4am$. Pero
los triángulos semejantes GAF , HML dán $GA : AF :: HM :$
 ML ó KS , esto es, $m : b :: y : ML$ ó $KS = \frac{by}{m}$; y $GA :$
 $GF :: HM : HL$ ó HK , esto es, $m : a :: y : HL$ ó $HK =$
 $\frac{ay}{m}$. Luego $CK = x + \frac{ay}{m}$, $CL = x - \frac{ay}{m}$; $(CK)^2 + (KS)^2$
ó $(CS)^2 = xx + \frac{2axy}{m} + \frac{a^2yy}{mm} + \frac{b^2yy}{mm}$, $(CL)^2 + (LM)^2$ ó
 $(CM)^2 = xx - \frac{2axy}{m} + \frac{a^2yy}{mm} + \frac{b^2yy}{mm}$; y por consiguiente
 $(CS)^2 - (CM)^2 = \frac{4axy}{m} = 4am$, substituyendo en lugar de
 xy su valor (171) mm . Luego $(CS)^2 - (CM)^2 =$
 $(CB)^2 - (CA)^2$.

Si el ángulo GCg que forman las asímtotas fuera águ-
do en lugar de ser obtuso, como lo es en la figura y lo
supone la prueba de la proposicion; en este caso sería CF
mayor que CE , y demostraríamos del mismo modo que
 $(CM)^2 - (CS)^2 = (CA)^2 - (CB)^2$. Pero si fuera recto
el ángulo GCg que forman las asímtotas, no hay duda en
que las rectas AB , MS serían perpendiculares á la asím-
tota CG , y por lo mismo serían iguales el uno al otro
los dos semidiámetros conjugados CM , CS , como tambien
los dos semiejes CA , CB . Y como en este caso la dife-
rencia de los dos diámetros conjugados Mm , Ss es nula, y

Fig. 10 es tambien la de los dos eges Aa , Bb ; queda verdadera en todos los casos la proposicion.

199 De aquí resulta claramente que un primer diámetro qualquiera Mm será menor, mayor ó igual al segundo diámetro Ss su conjugado, segun fuere obtuso, agudo ó recto el ángulo GCg que forman las asímtotas.

200 *El rectángulo de los dos eges Aa , Bb es igual al*
 73. *paralelógramo de los diámetros conjugados Mm , Ss , quiero decir que será $Aa \times Bb = Mm \times Ss$.*

Por lo dicho (158) $CN = AN = m$, y $CP \times PM = xy = mm = CN \times NA$, siendo CP, x , y PM, y ; de donde sacaremos $CN:CP::MP:NA$. Luego los triángulos CNA , CPM tienen los ángulos P y N iguales, por ser paralelas las líneas (155 y 181) AN y MP , y recíprocos los lados que los forman. Si desde los puntos M y A bajamos á las bases de estos triángulos, las perpendiculares Mp , An , los triángulos PpM , NnA serán semejantes, porque sobre tener cada uno un ángulo recto en p y n , tienen el ángulo MPp igual al ángulo ANn ; luego $PM:NA::Mp:An$, y por lo mismo $CN:CP::Mp:An$, y $CN \times nA = CP \times pM$; pero $CN \times nA$ es igual al triángulo CAP duplo de ACN , por ser $CP = 2CN$, y $CP \times pM$ es duplo del triángulo $CPM = CMQ$, luego será igual al triángulo CMR duplo de CMQ por ser $CQ = QR$ (porque los triángulos RDC , RMQ dán $RC:RQ::RD:RM$; y como $RM = \frac{1}{2}RD$ (165); luego $RQ = CQ = MP$); luego el rectángulo $CBPA$, de los semieges duplo del triángulo CPM

es igual al paralelogramo $CSMR$ duplo del triángulo CMQ Fig. que forman los dos semidiámetros conjugados CS , CM ; Luego tambien el rectángulo de los eges será igual al rectángulo de los diámetros conjugados.

201 Quando dos hypérbolas opuestas tienen iguales uno con otro dos cualesquiera de sus diámetros conjugados, ó quando es recto el ángulo que forman sus asýmtotas, se llaman *Hypérbolas equiláteras*.

202 Luego si desde un punto qualquiera M de una 74. hypérbola equilatera, se tira una ordenada MP á uno qualquiera Aa de sus diámetros, será (149 y 191) $(MP)^2 = (CP)^2 \mp (CA)^2$; es á saber $-$, quando Aa fuere un primer diámetro, y $+$, quando fuere un segundo. Porque siempre será su igual el diámetro conjugado al diámetro Aa (199).

203 Supongamos dos hypérbolas opuestas AM , am , 75. cuyos eges sean la recta Aa el primero, y la recta Bb el segundo; y supongamos tambien otras dos hypérbolas opuestas BS , bs cuyos eges sean al reves la recta Bb el primero, y la recta Aa el segundo. Estas últimas hypérbolas BS , bs se llaman *conjugadas* á las dos primeras AM , am , y las quatro juntas se llaman *Hypérbolas conjugadas*.

204 Es evidente que las rectas Ba , Ab son paralelas, porque las rectas Aa , Bb que rematan en dichas lineas se cortan (132 y 133) por el medio en C . De donde se sigue (155) que las asýmtotas de la hypérbola BS conjugada á AM , son la recta CG asýmtota de la hypérbola AM , y la recta Cg que es la otra asýmtota de la hy-

Fig. pérbola AM , prolongada indefinitamente ácia C ; porque pasan ambas líneas por el centro C , y son paralelas á las dos rectas Ba , BA tiradas desde el extremo B del primer ege Bb de la hypérbola BS á los dos extremos A , a del segundo. Se evidencia pues que las dos rectas CG , Cg paralelas á Ab , AB indefinitamente prolongadas por ambos lados del centro C , son no solo las asýmtotas de las hypérbolas opuestas AM , am , sino tambien de las otras dos BS , bs sus conjugadas.

75. 205 Si por un punto qualquiera H de una asýmtota CG comun á las dos hypérbolas AM , BS , se tira una paralela MS á la otra asýmtota Cg ; esta paralela encontrará las dos hypérbolas en unos puntos M , S que están á iguales distancias por ambos lados del punto H .

Porque 1.º La recta MS encontrará (174) cada una de las hypérbolas AM , BS en un punto. 2.º Por razon de la hypérbola AM , el rectángulo (171) $CH \times HM = CG \times GA$, y por causa de la hypérbola BS , el rectángulo $CH \times HS = CG \times GB$. Luego ya que (158) $GB = GA$, se infiere que $CH \times HS = CH \times HM$, y así $HS = HM$.

206 Resulta, pues, 1.º que si desde los puntos M , S de las dos hypérbolas AM , BS se tiran los diámetros Mc_m , Sc_s , que rematen en las otras dos hypérbolas am , bs ; el diámetro Ss será (187) el segundo diámetro conjugado al primero Mm de las dos hypérbolas opuestas AM , am ; y recíprocamente que el diámetro Mm será el segundo diámetro conjugado al primero Ss de las dos hypérbo-

bolas BS ; bs . Por consiguiente dos diámetros conjugados Fig. cualesquiera Mm , Ss de dos hipórbolas opuestas AM , am , son tambien dos diámetros conjugados de las otras dos hipórbolas BS , bs sus conjugadas ; con la diferencia de que el primer diámetro Mm se convierte en segundo, y al contrario , el segundo Ss se convierte en primero.

207 2.º Que las hipórbolas conjugadas BS , bs á las dos hipórbolas AM , am pasan por los extremos S , s de todos los segundos diámetros SCs de dichas hipórbolas ; y recíprocamente, las hipórbolas AM , am pasan por los extremos M , m de todos los segundos diámetros MCm de las dos hipórbolas BS , bs sus conjugadas.

208 Cuestion I. *Dados dos diámetros conjugados cualesquiera , y sabiendo qual de ellos es el primero ; ó lo que es (187) lo mismo , dadas las asýmtotas CD , CF de una hipórbola , con uno qualquiera M de sus puntos ; tirar dos diámetros conjugados Aa , Bb que formen uno con otro un ángulo igual á un ángulo dado.* 76.
77.
78.

Despues de haber cortado en un círculo qualquiera cuyo centro sea o , un arco dcf capaz del ángulo DCF que forman las asýmtotas , tirarémos por el medio e de la cuerda df , la recta ec que forme con dicha cuerda al uno ú otro lado el ángulo dec ó fec igual al ángulo dado ; y por el punto c , donde encuentra el arco dcf , tirarémos las rectas cd , cf . Hecho esto , tomaremos en las asýmtotas las partes CD , CF iguales á las cuerdas cd , cf : y despues de tirada DF , tirarémos el segundo diámetro Bb pa-

Fig. paralelo á dicha línea , y el primer diámetro Aa que pase por su medio E . Estos dos diámetros Aa , Bb formarán uno con otro un ángulo igual al ángulo dado , y serán conjugados el uno al otro.

Porque el ángulo dcf es igual por construccion al ángulo DCF que forman las asýntotas ; y son por consiguiente iguales y semejantes los triángulos DCF , dcf , y DCE , dce . Luego el ángulo BCa que forman uno con otro los dos diámetros, será igual al ángulo DEC ó dec igual por construccion, al ángulo dado. Ademas de esto , si por el punto A que , segun suponemos , es el uno de los extremos del primer diámetro Aa , tiramos una paralela á DF ; no hay duda en que dicho punto estará en el medio de esta paralela, una vez que E está en medio de DF , y por lo mismo (179) será tangente en A ; de donde se infiere (181) que serán conjugados los diámetros Aa , Bb .

Para determinar su magnitud , tiraremos por el punto dado M una paralela MKL al primer diámetro Aa , que encuentre la asýntota CD en K , y la otra asýntota CF prolongada mas allá del centro C , en L . Si tomamos CA media proporcional entre KM y KL , se viene á los ojos (164) que el punto A será el uno de los extremos del diámetro primero Aa ; y así , tirando las rectas AB , ab paralelas á las asýntotas CF , CD , dichas rectas determinarán (181) en sus puntos de concurso B , b la magnitud del segundo diámetro Bb .

Como se pueden tirar dos líneas distintas ec , ec que
for-

formen á ambos lados de la cuerda df ángulos dec , fec Fig. iguales al ángulo dado, quando este ángulo no es recto; 76. se sigue que siempre que ocurra este caso, se podrán hallar dos distintos diámetros conjugados Aa , Bb que resolverán igualmente la cuestion, segun se echa de ver en las figg. 77 y 78. Pero es digno de notarse que los diámetros conjugados Aa , Bb de la fig. 78 están en la misma 78. posicion, respecto de la asíntota CF , que los de la fig. 77. 77. respecto de la otra asíntota CD , y que su magnitud subsiste siempre una misma en estas dos posiciones diferentes. Porque

1.º Tirando desde el centro o al medio e de la cuerda df , la recta oe , será perpendicular á dicha cuerda, y por consiguiente serán iguales los ángulos oec , oec ; por esta razon si tiramos los radios oc , oc , los triángulos oec , oec que tienen el lado oe comun, los ángulos oec , oec , y los lados oc , oc iguales unos á otros, tendrán tambien iguales sus terceros lados ec , ec . Luego los triángulos fec , dec , que tienen los lados ef , ed , y ec , ec , y los ángulos fec , dec iguales, serán iguales, y semejantes; luego el ángulo ecf ó ECF de la fig. 78 es igual al ángulo ecd ó ECD de la fig. 77; y así, la posicion que tiene el diámetro Aa de la fig. 78 respecto de la asíntota CF , es semejante á la del diámetro Aa de la fig. 77 respecto de la otra asíntota CD .

2.º Si tiramos en la fig. 78 la linea MI , que forme 78. con la asíntota CF , prolongada ácia el lado del centro C ,

Fig. el ángulo MIC igual al ángulo MLC ó ECF de la fig. 77; se viene á los ojos que las líneas MI , Mk de la fig. 78 serán iguales á las líneas ML , MK de la fig. 77, una vez que, segun suponemos, la posicion del punto M respecto de las asýmtotas es una misma en ambas figuras. Pero el ángulo MIL suplemento del ángulo MIC en la fig. 78 ó de ECF en la fig. 77 es igual al ángulo MKk suplemento del ángulo ECD de la fig. 78 ó ECF de la fig. 77; por consiguiente en la fig. 78 son semejantes los dos triángulos LMI , kMK por tener el ángulo en M comun, é iguales los ángulos en los puntos I , K ; de donde se saca $LM : MI :: kM : MK$. Luego $LM \times MK = MI \times Mk$ ó $LM \times MK$ de la fig. 77. En lo que se manifiesta (164) que son iguales los primeros semidiámetros CA , CA de las figg. 77 y 78. Lo mismo sucede con el diámetro Bb ; porque penden su posicion y magnitud de las del primer diámetro Aa al qual es conjugado.

79. Como no se puede tirar mas que una línea ec que
 80. forme á qualquiera lado de la cuerda df un ángulo igual al ángulo dado, quando este ángulo es recto; se infiere que no puede haber mas que dos diámetros conjugados Aa , Bb que formen uno con otro un ángulo recto, y que por consiguiente serán (184) los dos eges. Pero siendo en este caso isósceles el triángulo dcf ó DCF , el primer ege Aa dividirá por el medio el ángulo DCF que forman las asýmtotas; por lo que se echa de ver que hallaremos la

posición de los dos eges, solo con tirar dos rectas Aa, Bb Fig. perpendiculares la una á la otra, tales que la una Aa divida por el medio el ángulo DCF que forman las asímtotas; hecho esto, se determinará su magnitud segun acabamos de declarar respecto de los diámetros conjugados.

Tambien se pueden hallar los dos eges del modo siguiente. Por el punto dado M tírese una paralela MH á la una de las asímtotas CF , y que remate en la otra CD en H . Tómese en la asímtota CD la parte CG igual á una media proporcional entre CH, HM ; y tírese por el punto G una paralela AB á CF , tal que sea igual á CG cada una de sus partes GA, GB . Es evidente que las lineas CA, CB serán (171 y 158) los dos semiejes de magnitud y posicion.

209 Se evidencia pues 1.º que no hay mas que dos diámetros conjugados que formen uno con otro un ángulo recto, y que por lo mismo no puede haber mas que dos eges. 2.º Que siempre que quisiéremos podremos hallar dos distintos diámetros conjugados que formen uno con otro un ángulo igual á un ángulo dado, como no sea recto dicho ángulo; que los dos primeros están colocados respecto de la una asímtota del mismo modo que los otros dos respecto de la otra asímtota; de donde se sigue que están puestos de un mismo modo al uno y otro lado de los dos eges, una vez que los dos eges dividen en dos partes iguales los ángulos que forman las asímtotas; y finalmente

Fig. te que su magnitud subsiste una misma en las dos posiciones distintas.

210 Cuestion II. *Dados dos diámetros conjugados cualesquiera, y conociendo qual de ellos es el primero; ó lo que es (187) lo mismo: dadas las asýmtotas de dos hypérbolas opuestas, y uno qualquiera de sus puntos, trazar dichas hypérbolas en virtud de un movimiento continuo.*

I. Buscaremos los dos eges, conforme acabamos de enseñar (208), y trazaremos despues las dos hypérbolas opuestas por lo dicho (144).

81. II. Sean Aa, Bb los diámetros conjugados dados, y Aa el primero; ó si no, sean CG, Cg las asýmtotas dadas, con el punto A , uno de las hypérbolas opuestas. Despues de tirada por el punto dado A una paralela AG á la una de las asýmtotas Cg , y que vaya á rematar en el punto G de la otra, se hará correr á lo largo de la asýmtota CG , indefinidamente prolongada por ambos lados del centro C , una recta HK igual á CG , que se lleve con su extremo H una paralela HM á la asýmtota Cg , y con el otro extremo K , una recta KA mobil al rededor del punto fijo A . La interseccion continua M de las rectas AK, HM trazará en virtud de este movimiento las dos hypérbolas opuestas que se piden.

Porque por razon de los triángulos semejantes KHM, KGA , siempre será KH ó $CG : HM :: KG$ ó $CH : GA$, y por consiguiente $CH \times HM = CG \times GA$. Luego el punto M será (171) uno de los de la hypérbola, que pasa por el

el punto dado A , y cuyas asímtotas son las rectas dadas CG , Cg ; ó será de la *hypérbola opuesta*. Fig.

211 Cuestion III. *Hallar por medio de los mismos datos que en la cuestion antecedente, quantos puntos se quisiere de las hypérbolas opuestas.*

I. Sean CD , CE las asímtotas dadas, y A el punto 82.
dado. Si tiramos por dicho punto A tantas líneas DE , DE ,
 DE &c. quantas queramos, que rematen en las asímtotas;
y tomamos en dichas rectas las partes EM , EM , EM &c.
iguales á AD , AD , AD &c. cada una á su correspon-
diente; es evidente (176) 1.º Que los puntos M, M ,
 M, M , serán puntos de la *hypérbola* que pasáre por el pun-
to A , quando los puntos E, E, E &c. cayeren debajo del
centro. 2.º Que las asímtotas de dichas *hypérbolas* serán
las rectas CD , CE . Luego si por todos los puntos M, M, M ,
&c. que están dentro del ángulo que forman las asímtotas,
hacemos que pase una línea curva, y otra por los puntos
 M, M, M , &c. que están dentro del ángulo opuesto al vérti-
ce al primero; dichas dos curvas serán las *hypérbolas opues-*
tas que se piden.












II. Sean las rectas Aa , Bb los dos diámetros conjugados dados, y Aa el segundo. Señalaremos en el primer semi-
diámetro CB , prolongado indefinitamente ácia B , quan-
tas partes CE , EE , EE &c. quisiésemos, con tal que sean
pequeñas, é iguales unas con otras. Tiraremos por el pun-
to E mas próximo al centro C , la recta EP paralela á BA ;
y en el segundo diámetro Aa tomaremos al uno y otro lado
del

Fig. del centro C , otras tantas partes CP, PP, PP &c. pequeñas é iguales, como partes CE, EE, EE &c. hubiese. Tiraremos CD perpendicular é igual á CB , y por todos los puntos P, P, P &c. las paralelas MPM, MPM, MPM , &c. al primer diámetro Bb , y en cada una de estas tomaremos á cada lado del punto P las partes PM, PM cada una igual á su correspondiente ED . Las dos curvas que pasaren por todos los puntos M hallados por este camino, serán las dos hipórbolas opuestas que se piden.

Porque si llamamos CA, t ; CB ó CD, c ; CP, x ; PM, y : los triángulos semejantes CAB, CPE darán esta proporcion $CA:CB::CP:CE$, ó $t:c::x:CE=\frac{cx}{t}$. Y por razon del triángulo ECD rectángulo en C , y cuya hypotenusa ED se ha omitido por evitar la complicacion de la figura, será $(ED)^2$ ó $(PM)^2=(CE)^2+(CD)^2$ ó $yy=\frac{ccxx}{t^2}+cc$. Luego (149 y 191) la recta PM será una ordenada al semidiámetro Aa , cuyo conjugado es el primero Bb ; y como segundo aplica esta demostracion á todas las lineas PM , una vez que cada CP está siempre con su correspondiente CE en la misma razon que CA con CB , se sigue &c.

84. Quando son iguales uno con otro los diámetros conjugados, quiero decir (201), quando son equiláteras las hipórbolas que se piden; es aun mucho mas facil la construccion. Porque tirando CD perpendicular é igual á CA , y por un punto qualquiera P del diámetro Aa , una paralela MPM al primer diámetro Bb ; bastará tomar en dicha linea al uno y otro lado del punto P , las partes PM, PM cada

una





una igual á PD , para sacar dos puntos de las hyperbolas Fig. opuestas. Porque si imaginamos tirada la hypotenusa PD en cada uno de los triángulos PCD , rectángulos en C , siempre será $(PD)^2$ ó $(PM)^2 = (CP)^2 + (CD)^2$ ó $(CA)^2$; y por lo mismo la recta PM será (202) una ordenada al segundo diámetro Aa , cuyo conjugado es el primero Bb su igual.

Formacion de las secciones cónicas en el sólido , y consideraciones sobre algunos modos de trazarlas.

212 Hemos dicho (32) que se llaman secciones cónicas las tres curvas , cuyas propiedades hemos declarado poco ha, porque resultan de la seccion hecha de un cono recto con un plano; bien que no nos queda que decir acerca de ellas, atendidos los fines que llevamos , nos detendremos sin embargo otro rato en su consideracion, para manifestar como se originan con efecto de la seccion del espresado sólido. Y despues daremos un método muy util en la práctica para trazarlas , que es un punto esencialísimo en esta materia.

Consideraremos primero la seccion del cilindro , é indagaremos qué curva resulta de cortar este sólido con un plano. Desde luego se echa de ver , que si se corta un cilindro recto (lo propio sucederá si fuere escaleno) con un plano que pase por su ege , ó por una línea paralela al ege, 85. dejará trazadas en la superficie del cilindro dos líneas rectas paralelas MA , NB , y que la seccion del mismo sólido por un plano paralelo á las bases , será un círculo (I. 558).

213. Supongamos ahora que se corte un cilindro recto

por

Fig. por un plano KRH , tal que ni sea paralelo á las bases, ni pá-
 85. se por el ege, ni por línea alguna paralela al ege, y que la
 seccion comun del plano secante, y del plano de la base AB
 sea la recta L . Tírese en esta base el diámetro AB , tal que,
 prolongado si fuere menester, encuentre perpendicularmente
 la recta L . Concibamos que por AB y el ege del cilindro pase
 el plano $AMNB$; y reparemos en las dos líneas AM , BN ,
 que le terminan, los dos puntos K , H comunes al plano se-
 cante, y á la superficie cilíndrica. Tírese KH , y por un
 punto qualquiera Z de esta línea, tírese en el plano $AMNB$
 la QZP , paralela é igual á AB . Imaginemos tambien que
 por la recta QP pasa un plano QRP , paralelo á la base, de
 lo que resultará, conforme hemos dicho, un círculo. La
 recta RZ , interseccion comun del plano secante y del pla-
 no QRP paralelo á la base, está á un tiempo en ambos pla-
 nos: luego ya que L seccion comun del plano de la base,
 y del plano secante es perpendicular á AB , la RZ intersec-
 cion comun del plano secante y del plano QRP paralelo á la
 base, será perpendicular á QP , paralela á AB .

Sentado todo esto, llamaremos KZ , x ; ZR , y ; QZ , z ;
 KH , a ; $QP = AB = MN = b$. En estos supuestos la equa-
 cion del círculo dará $QZ \times ZP = (ZR)^2$ ó $bz - zz = yy$.
 Los triángulos semejantes HZP , QZK darán $HZ : ZK ::$
 $PZ : ZQ$, ó $HZ + ZK : ZK :: PZ + ZQ : ZQ$;
 esto es $a : x :: b : \frac{bx}{a} = ZQ = z$; substituyendo este valor de
 z en $yy = bz - zz$, saldrá $yy = \frac{bx}{a} - \frac{bbxx}{aa}$; reduciendo el
 segundo miembro á un mismo denominador, sacaremos

$\frac{abbx - bxx}{aa}$, que se reduce á $\frac{bb}{aa}(ax - xx)$, y por consiguiente $yy = \frac{bb}{aa}(ax - xx)$ que es la equacion característica de la elipse, cuyo ege mayor es a , y el menor es b (93). Fig.

214 Del mismo modo demostraríamos que la seccion 86.
KRHRK de un cilindro escaleno, por un plano perpendicular á AM, que tampoco será paralelo á la base, ni pasará por el ege, será una elipse.

215 Pero si el sólido que se corta con un plano fue- 87.
re un cono, resultarán distintas curvas, segun variáre la posicion del plano secante. Si se corta el cono CHI por un plano AMB, de modo que este plano encuentre los dos lados CH, CI á un mismo lado respecto del vértice; la seccion AMM'B, que resultare, será una elipse. Hemos de exceptuar el caso en que el plano secante formase con el lado CI el mismo ángulo que forma el otro lado CH con la base, en cuyo caso la seccion sería un círculo; porque esto no puede suceder sino en el caso de ser la direccion del plano secante paralela á la base del cono.

Quando el plano secante no encuentra el uno de los lados 88.
CH sino prolongado, resulta la hypérbola AMM'.

Finalmente la seccion que resultará será una parábola 89.
AMM', si el plano secante fuese paralelo al uno CH de los lados del cono. Son, pues, tres las proposiciones que hemos de demostrar.

1.º Si imaginamos que el cono CHI está cortado con un plano, que pase por una recta tirada desde el vértice C al centro del círculo de su base; esto es, que pase por el ege del

Fig. del cono, resultará de esta sección el triángulo BCD que
 87. llamaremos *Triángulo por el ege*. Cortemos ahora el cono
 88. por tres planos AMM' , FMG , $HM'I$ perpendiculares á este triángulo, de modo que los dos últimos sean paralelos á la base del cono. Las dos secciones FMG , $HM'I$ serán círculos que encontrarán la sección AMM' en M y M' . Las intersecciones FG , HI de los planos de estos círculos y del triángulo por el ege, serán los diámetros de los mismos círculos. Las intersecciones PM , $P'M$ de dichos círculos con el plano AMM' serán (I. 548) perpendiculares al plano del triángulo por el ege, y serán á un tiempo ordenadas de dichos círculos, y de la sección AMM' .

Sentado esto, los triángulos semejantes APG , $AP'I$ dán $AP : AP' :: PG : P'I$, y los triángulos semejantes BFP , BHP' dán $PB : P'B :: FP : HP'$; si multiplicamos estas dos proporciones ordenadamente, saldrá $AP \times PB : AP' \times P'B :: FP \times PG : HP' \times P'I$; pero por la propiedad del círculo sabemos que $FP \times PG = (PM)^2$, y $HP' \times P'I = (P'M)^2$; luego $AP \times PB : AP' \times P'B :: (PM)^2 : (P'M')^2$; luego los cuadrados de las ordenadas de la sección AMM' son uno con otro, como los productos de las abscisas; y como estas abscisas caen á distintos lados respecto de la ordenada, será AM
 87. una elipse, y quando caen á un mismo lado, respecto de una
 88. misma ordenada, la sección es una hypérbola.

En virtud de los mismos supuestos, y por la naturaleza del círculo, tendremos $(PM)^2 = FP \times PG$, $(P'M')^2 =$
 HP'

$HP' \times P'I$, ó porque las paralelas PP' , FH , y FP , HP' dán Fig.
 $FP = HP'$, $(P'M')^2 = FP \times P'I$; luego $(PM)^2 : (P'M')^2 :: 89.$
 $FP \times PG : FP \times P'I :: PG : P'I :: AP : AP'$, por razon de
 los triángulos semejantes APG , $AP'I$; luego los quadrados
 de las ordenadas tienen unos con otros la misma razon que
 las abscisas : luego la curva es una parábola.

216 De lo dicho (93 y 149) consta , que si to-
 mamos , así en la elipse como en la hypérbola , el origen de
 las abscisas en el vértice , pertenecerá la equacion $yy = px$
 $\mp \frac{pxx}{2t}$ á ambas curvas ; y como en el supuesto de ser infini-
 ta $2t$, la misma equacion representa (95) la parábo-
 la ; hemos de inferir que la equacion $yy = px \mp \frac{pxx}{2t}$ espresa
 todas tres secciones cónicas , en el supuesto de estar en el
 vértice el origen de las abscisas.

217 Entre los varios artificios que se han inventado
 para trazar las tres curvas , en cuya consideracion nos he-
 mos detenido hasta aquí , hay uno , que en sentir de muchos
 prácticos, merece alguna preferencia respecto de los demás.
 Consiste en mirar una seccion cónica como el rastro de un
 punto que se mueve por medio de un instrumento , estando
 ajustado su movimiento á ciertas condiciones determinadas.

Aunque está fundado , y se puede poner en prácti-
 ca (33 , 72 y 129) , este método de trazar las
 secciones cónicas , sin embargo no las pinta con toda la
 exactitud que es menester. Porque como tiene el lapiz el
 hilo de que se hace uso , mas ó menos tirante en unos
 puntos que en otros , no puede salir exacta la descripcion

Fig. de la curva. Si en lugar del hilo se substituyese una cadenilla, bien podría ser que se mantuviera siempre igualmente tirante; pero tampoco serviría este recurso para trazar la curva, antes al contrario no se trazaría sino un polígono de muchos lados, bien que pequeños, y sería el polígono inscripto en la curva que se quisiera trazar. Por estas consideraciones merecería la preferencia algun instrumento compuesto de reglas sólidas y firmes, que no padeciese los defectos que hemos tocado. Pero como no hay ninguno, que yo sepa, que pueda servir para las tres secciones cónicas, pues no le hay con esta circunstancia para la hipórbola, hemos de acudir á otro artificio fundado en la resolucion de la cuestion siguiente.

218 *Hallar un método para trazar la que se quisiere de las tres secciones cónicas, como sea dado su diámetro, su parámetro, la posicion de sus ordenadas, y se sepa tambien si el diámetro dado es primero ó segundo, quando la curva fuese una hipórbola.*

90. Si se hubiese de trazar una parábola; sea AHL un triángulo isósceles, del qual el un lado AH esté en el diámetro dado AP , prolongado indefinitamente al uno y otro lado de su origen A , y el otro lado AL esté sobre la tangente indefinita LAL que pasa por el vértice A . Imaginemos que su base HL se mueva siempre paralela á sí misma, llevándose por el uno de sus extremos L la indefinita LM paralela á AP , y por el otro extremo H , la linea HF paralela á AL , é igual al parámetro dado del diá-

diámetro AP , la qual se lleva tambien por su otro estre- Fig.
mo F la recta FA mobil al rededor del punto fijo A . La
interseccion continua M de las dos rectas FA , LM tra-
zará, quando la linea HL se mueve dentro del ángulo HAL ,
y su opuesto al vértice, la parábola MAM que se pide.

Porque si tiramos la ordenada MP al diámetro AP ,
los triángulos semejantes AHF , APM darán AH ó AL ó
 $PM: HF :: AP: PM$, y por consiguiente $(PM)^2 = AP$
 $\times HF$; luego &c.

Quando los puntos F y L están á lados opuestos res-
pecto del diámetro AP , el punto H ha de estar mas arri-
ba del origen A del espresado diámetro.

Por lo que mira á las demas secciones, se practicará
lo propio, y no habrá mas diferencia sino en que la linea
 LM que para trazar la parábola, ha de ser paralela al 91.
diámetro Aa , se ha de mover, quando se trate de las de- 92.
más secciones, al rededor del punto a del mismo diáme-
tro. Quando se hubiese de trazar la hypérbola, supone-
mos que sea un primer diámetro el diámetro dado; porque
si fuese un segundo diámetro, hallaríamos por lo dicho (188)
el primero su conjugado y su parámetro.

Porque si tiramos MP ordenada al diámetro Aa , los
triángulos semejantes aPM , aAL , y APM , AHF dán
 $aP: PM :: aA: AL$ ó AH ; y $AP: PM :: AH: HF$. Si
multiplicamos ordenadamente estas dos proporciones, saca-
remos $aP \times PA: (PM)^2 :: aA \times AH: AH \times HF :: aA:$
 HF ; luego (93, 112, 149 y 191) &c.

Fig. Prevenimos que en la elipse los puntos H , a han de caer á partes opuestas respecto del punto A , y á un mismo lado en la hypérbola, quando los puntos F , L están á partes opuestas respecto del diámetro Aa .

219 De esto se infiere lo que se deberá hacer para hallar el parámetro HF de un diámetro dado Aa , quando
90. fuese dada su ordenada PM . Porque 1.º en la parábola se tomará en el diámetro AP la parte $AH = PM$, y tirando la línea HF paralela á PM , y terminada en F por la línea AM tirada desde el origen A del diámetro por el extremo M de la ordenada; es evidente que la HF será el parámetro del diámetro AP .

2.º En las demás secciones, tiráremos por el uno de
91. los extremos a del diámetro dado Aa la línea AM que
92. encuentra la tangente AL , que pasa por el otro extremo A , en el punto L ; y tomando en el diámetro Aa la parte $AH = AL$, tiráremos HF paralela á PM , que encontrará en F la línea AM , y será el parámetro del diámetro Aa .

220 De lo dicho sacaremos un método uniforme y muy exacto en la práctica para *trazar por muchos puntos una seccion cónica*. Le propondremos para la elipse, y será facil aplicarle á las otras dos secciones.

93. En la tangente AL , que pasa por el un extremo A del diámetro dado Aa , se tomará la parte AG igual á su parámetro, y se tirará la indefinita GF paralela á Aa ; se tirarán por el punto A tantas líneas rectas AF , AF &c.

quan-

quantas se quisiere. En la tangente indefinita AL se tomarán Fig. las partes AL , AL &c. iguales á las correspondientes GF , GF &c. y se tirarán las rectas aL , aL &c. Las intersecciones M , M &c. de las rectas correspondientes FA , La ; FA , La &c. serán puntos de la elipse cuyo diámetro es la línea Aa , la tangente la línea AL , y el parámetro del diámetro Aa , la línea AG .

Para probar que la curva es con efecto una elipse, tírese FH paralela á AG , y por el punto L la HL correspondiente al punto F . El triángulo HAL será isósceles, pues $AL = GF$ ó AH segun suponemos, y HF será igual al parámetro del diámetro Aa ; concuerda, pues, esta construccion con lo dicho (218).

Como llegan á ser muy grandes las líneas GF , AL quando se han de hallar los puntos M que están inmediatos al punto a ; podrán servir para hallar estos puntos la tangente al que pasa por el otro extremo a del diámetro Aa , y la línea gf paralela á Aa , conforme lo está diciendo la figura.

Si se tiran las ordenadas MP , MP &c. paralelas á la tangente AL , y se prolongan al otro lado del diámetro Aa hasta M , M &c. de modo que todas estén divididas en dos partes iguales por el espresado diámetro; es constante que los últimos puntos M serán tambien de la elipse.

Podría servir una misma abertura de compas GF ó AL para señalar en las líneas GF , AL tantos puntos F , F &c. L , L &c. como se quisiere; porque siendo en











Fig. virtud de esto iguales unas con otras todas estas partes, cada GF sería igual á la correspondiente AL , y este es el fundamento de la demostracion.

De algunas otras Curvas algebraicas.

Además de las tres secciones cónicas cuyas principales propiedades hemos manifestado, hay otras curvas cuyo conocimiento es importante, por haberlas hecho famosas los fines para que se inventaron, y el uso que de ellas se hace en algunos casos particulares.

De las Parábolas é Hypérbolas de varios grados, y particularmente de la Parábola cúbica.

94. 221 Supongamos que representando a una línea dada, sea AC una línea recta indefinita cuyo origen esté en el punto fijo A ; y AMB una línea curva, tal que tirando desde uno de sus puntos qualquiera M una recta MP que forme con la AC un ángulo dado APM , y llamando AP , x ; PM , y , sea siempre $ax = yy$; es evidente (60) que la curva AMB será una parábola cuyo diámetro será la línea AC , la recta PM una ordenada á dicho diámetro, y el parámetro del mismo diámetro la línea a . Pero si suponemos que la naturaleza de la curva AMB esté cifrada en la equacion $y^3 = aax$, ó en esto tra $y^3 = axx$; la línea curva se llamará *Parábola cúbica*, ó de *tercer grado* (21). Si la equacion fuere $y^4 = a^3x$, ó $y^4 = ax^3$, la línea curva AMB será una *Pa-*
rá-





rábola de cuarto grado; y así prosiguiendo.

Fig.

222 Supongamos ahora que representando siempre 95.
 a una línea dada, sea AC una línea recta cuyo origen esté en el punto fijo A , y BM una línea curva, tal que tirando desde uno de sus puntos qualquiera M la recta MP que haga con AC un ángulo dado APM , y llamando AP , x ; PM , y , sea siempre $xy = aa$. Es evidente (171) que esta línea curva será una *Hypérbola*, cuyas asýmtotas serán la línea AC , y la línea AD paralela á PM , y su pôtencia será el quadrado aa . Pero si la equacion que representa la naturaleza de la curva BM fuere $xxxy = a^3$, la línea curva sería una *Hypérbola cúbica* ó de *tercer grado* (21). Si la equacion fuere $x^3y = a^4$, la línea curva BM sería una *Hypérbola de cuarto grado*; y así prosiguiendo.

223 Sentado todo esto, supongamos que represente 94.
 m un número entero qualquiera que sea el esponente de 95.
 la potencia de la línea AP ó x ; que tambien represente n el esponente de la potencia de la otra indeterminada y , y para mas brevedad que $a = 1$; la equacion $y^n = x^m a^{n-m}$ que se transformará en $y^n = x^m$, representará la naturaleza de las parábolas de todos los grados al infinito. Los mismos supuestos transformarán la equacion $x^m y^n = a^{m+n}$ en $x^m y^n = 1$, que representará en general la naturaleza de las *hypérbolas* de todos los grados.

224 Si por el origen fijo A de la línea AC tira- 94.
 mos una línea recta indefinita AD paralela á PM , y des- 95.
 pues de tirada MK paralela á AC , que encuentra AD en

Fig. el punto K , llamamos AK , x ; KM , y ; es evidente que la indeterminada x que antes representaba la línea AP ó MK , será en el nuevo supuesto y , pues $AK = PM$; y al contrario y que representaba PM ó AK , será en el nuevo caso x , pues $KM = AP$; de donde inferiremos.

94. 1.º Que si la curva AMB fuese una parábola vulgar, será su equacion $yy = ax$ ó $xx = ay$, segun la comparemos con la línea AC ó con la línea AD , y la equacion de la parábola cúbica que es $y^3 = axx$ quando referimos sus puntos á la línea AC , será $x^3 = aay$ quando los refieramos á la línea AD ; y en general, si la equacion de la línea curva AMB fuese $y^n = x^m a^{n-m}$ refiriéndola á la línea recta AC , será $x^n = y^m a^{n-m}$ quando consideráremos su relacion con la línea AD . Suponemos aquí que n es mayor que m .

2.º Que la Hypérbola vulgar tiene siempre la misma equacion $xy = aa$, ora se refieran sus puntos á la línea AC , ora se refieran á la línea AD ; que la equacion de la hypérbola cúbica que es $xxxy = a^3$, quando se refieren sus puntos á la línea AC , será $xyy = a^3$, refiriéndolos á la línea AD ; y en general, que la equacion de la hypérbola que es $x^m y^n = a^{m+n}$, quando se refieren sus puntos á la línea AC , será $x^n y^m = a^{m+n}$, si los refiriésemos á la línea AD .

225 De aquí se sigue que hay dos parábolas cúbicas, siendo la equacion de la una $y^3 = aax$ ó $x^3 = aay$, y la de la otra $y^3 = axx$, ó $x^3 = ayy$; pero no hay mas que una hypérbola cúbica $xxxy = a^3$ ó $xyy = a^3$. Porque las indeterminadas x é y no se pueden combinar sino de

los

los quatro modos espresados para representar las parábolas Fig. cúbicas, y de los dos segundos para representar las hypérbolas cúbicas. Pero como las quatro primeras equaciones pertenecen á dos curvas diferentes, y las dos segundas á una misma, se sigue &c.

226 Las líneas AC , AD son las asýmtotas no solo 95. de la hypérbola vulgar, sino tambien de las hypérbolas de todos los grados al infinito. Porque si consideramos la equacion general $x^m y^n = a^{m+n}$ ó $y^n = \frac{a^{m+n}}{x^n}$ que representa la naturaleza de qualquiera hypérbola, quando se refieren sus puntos á la línea AC ; echaremos de ver que quanto mas creciere x , tanto mas disminuirá y^n , y por consiguiente PM menguará; de manera que siendo x infinitamente grande, será y nula ó cero; quiero decir que la hypérbola BM y la línea AC , prolongadas ambas al infinito, se arrimarán mas y mas, hasta que por fin se junten á una distancia infinita, en cuya circunstancia consiste la esencia de la asýmtota (172). Si referimos los puntos de la misma hypérbola á la línea AD , en cuyo supuesto será AK , x , y KM , y ; tendremos $x^n y^m = a^{m+n}$ ó $y^m = \frac{a^{m+n}}{x^n}$. Luego quanto mas creciere x , tanto mas menguará y ; por consiguiente será tambien la línea AD asýmtota de la misma hypérbola.

227 Tiremos ahora desde un punto dado M á la 94. segunda parábola cúbica AMB cuya naturaleza está cifra-
da

Fig. da en la equacion $y^3 = axx$, la tangente MT .

Supondremos el arco MN infinitamente pequeño; y tiraremos NQ paralela á PM , y MR paralela á AC : el pequeño triángulo MRN será semejante al grande TPM , pues podemos mirar el pequeño arco MN como la prolongacion de la tangente TM . Sentado esto, llamaremos la subtangente TP , s ; la recta PQ ó MR , e ; y de los triángulos semejantes TPM , MRN sacaremos $RN = \frac{ey}{s}$. Ahora bien, si substituimos el cubo de $QN = y + \frac{ey}{s}$ en lugar de y^3 en la equacion $y^3 = axx$, que representa la naturaleza de la curva AMB ; y en lugar de xx el quadrado de $AQ = x + e$, resultará la equacion $y^3 + \frac{3ey^3}{s} + \frac{3eey^3}{ss} + \frac{e^3y^3}{s^3} = axx + 2eax + eea$, que espresará la relacion entre AQ y QN . Si restamos la primera equacion de la segunda, y dividimos lo que saliere por e , resultará $\frac{3y^3}{s} + \frac{3ey^3}{ss} + \frac{eey^3}{s^3} = 2ax + ea$. Borrando finalmente en esta todos los términos en que está e (II. 183), sale $\frac{3y^3}{s} = 2ax$, y por consiguiente $PT = s = \frac{3y^3}{2ax} = \frac{3}{2}x$, despues de substituido axx en lugar de y^3 .

228 Considerando con algun cuidado el último cálculo, echaremos de ver que para llegar al resultado que buscamos, basta substituir en lugar de una potencia de y los dos primeros términos de la misma potencia de $y + \frac{ey}{s}$. Porque como todos los demás están multiplicados por alguna potencia de e , se han de despreciar (II. 185 y II. 183). Lo propio sucede quando en lugar de una potencia de x substituimos la misma potencia de $x + e$. Pero (II. 99) los dos

dos primeros términos de una potencia qualquiera m de $x+e$ Fig. 94.
 ó de $(x+e)^m$ son $x^m + mex^{m-1}$; y los dos primeros términos de una potencia qualquiera n de $y + \frac{ey}{s}$, ó de

$$(y + \frac{ey}{s})^n \text{ son } y^n + \frac{ney^n}{s}.$$

229 Por consiguiente lo que se ha de practicar para 94.
 sacar la espresion general de la subtangente PT de las parábolas de todos los grados al infinito, se reduce á valerse de la equacion general $y^n = x^m a^{m-n}$, que haciendo $a = 1$, es $y^n = x^m$, cuya equacion representa la naturaleza de todas estas parábolas.

Se substituirán en la equacion general $y^n = x^m$ en lugar de y^n , los dos primeros términos de la potencia n de $y + \frac{ey}{s}$, esto es $y^n + \frac{ney^n}{s}$, y en lugar de x^m los dos primeros términos de $(x+e)^m$, esto es $x^m + mex^{m-1}$, y resultará $y^n + \frac{ney^n}{s} = x^m + mex^{m-1}$, restaremos la primera equacion de la

segunda, dividiremos por e , saldrá $\frac{ny^n}{s} = mx^{m-1}$; y por

consiguiente $s = \frac{ny^n}{mx^{m-1}} = \frac{n}{m}x$, despues de substituido en lugar de y^n su valor x^m .

230 Por el mismo método sacaremos la espresion de 95.
 la subtangente de las hypérbolas de todos los grados al infinito.

Porque despues de practicada la misma preparacion,
 que

Fig. que egecutamos respecto de las parábolas, substituiremos en la equacion general $x^m y^n = a^{m+n}$ que representa la relacion entre AP y PM , en lugar de x^m los dos primeros términos de $(x + e)^m$; esto es $x^m + m e x^{m-1}$, y en lugar de y^n los dos primeros términos de $(y - \frac{ey}{s})^n$, esto es $y^n - \frac{n e y^n}{s}$; y egecutando la multiplicacion correspondiente, re-

$$\text{sultará } x^m y^n + m e y^n x^{m-1} - \frac{n e y^n x^m}{s} - \frac{m n e e y^n x^{m-1}}{s}$$

$= a^{m+n}$. Restando esta segunda equacion de la primera, y

dividiendo despues por $e y^n$, saldrá $m x^{m-1} - \frac{n x^m}{s} -$

$$\frac{m n e x^{m-1}}{s} = 0; \text{ y borrando el término } - \frac{m n e x^{m-1}}{s} \text{ por}$$

lo dicho (227), sale por fin PT ó $s = \frac{n x^m}{m x^{m-1}} = \frac{n}{m} x$.

93. 231 Luego para tirar la tangente MT en un punto

94. dado M de una parábola ó hypérbola, sea el que fuere su grado, en el supuesto de ser la equacion de la parábola $y^n = x^m a^{n-m}$, y $x^m y^n = a^{m+n}$ la de la hypérbola, basta tomar la subtangente $PT = \frac{n}{m} AP$ del mismo lado que el punto A , respecto del punto P , quando fuere la curva una parábola; ó del lado opuesto si fuere una hypérbola.

96. 232 Para declarar la generacion de la parábola cúbica, supondremos dadas de posicion dos lineas rectas indefinitas BC , DE que se corten en el punto A , y en el ángulo BAD una parábola AM de un grado qualquiera, cu-

ya naturaleza es tal que tirando desde uno qualquiera de sus puntos M la MP paralela á DE , que encuentre BC en el punto P , y llamando AP, x ; PM, y ; la dada $AB, 1$; siempre se verifique $x^m = y^n$; en cuya equacion espresan m y n los esponentes respectivos de x é y , los cuales serán los que se quisiere, con tal que siempre sea m mayor que n . Manifiesta la espresada equacion 1.º que siendo $x = 0$, es tambien $y = 0$, y que quanto mayor fuere x , tanto mayor será y . 2.º Que la subtangente $PT = \frac{n}{m}x$ (231) es siempre menor que x , pues suponemos que n sea menor que m . De donde se infiere, que la parábola AM , sea el que fuere su grado, siempre pasará por el punto A ; que se apartará mas y mas al infinito de la recta BC que consideraremos como su diámetro, ácia la qual estará su convexidad. Pero como la curva AM , que está en el ángulo DAB no es mas que una porcion de la espresada parábola, resta indagar en qual de los ángulos DAC, CAE, EAB , se ha de proseguir; en cuya investigacion hay tres casos distintos que considerar.

I. Quando el esponente m de la potencia de x fuere un número par, y el esponente n de la potencia de y un número impar, la raiz m de x^m será $\mp x$, y la raiz n de y^n solo será $+y$. Por consiguiente x podrá ser positiva, y negativa, pero y solo será positiva; luego la parábola AM se proseguirá en el ángulo DAC , que está al lado del ángulo BAD ; de suerte que si por un punto qualquiera K de la linea AD , se tira una paralela á BC , encontrará la parábola MAM' en dos puntos M y M' , que estarán cada uno á la misma distancia

Fig. cia del punto K . Esta parábola será la vulgar cuya equacion es $xx = ay$, ó $xx = y$, haciendo el parámetro $= 1$.

II. Quando ambos esponentes m y n fuesen números impares, la raiz m de x^m será solo $+x$, y la raiz n de y^n , será solo $+y$. Pero como la equacion $-x^m = -y^n$ es la misma que $x^m = y^n$, y la raiz m de $-x^m$ es $-x$, y la raiz n de $-y^n$ es $-y$; se infiere que x ó AP , é y ó PM podrá ser positiva, y negativa, con la circunstancia de que quando AP fuere positiva, lo será tambien PM , y al reves. Por consiguiente la parábola AM se continuará en el ángulo CAE opuesto al vértice al ángulo BAD , en una posicion del todo semejante, pero trastornada: de suerte que tomando $AP' = AP$, y tirando $P'M'$, que forme con AP' el ángulo $AP'M'$ igual al ángulo APM , la línea $P'M'$ encontrará la porcion AM' que está en el ángulo CAE , en un punto M' tal que $P'M' = PM$. Esta curva se llama la *primera parábola cúbica*, y es su equacion $x^3 = aay$, ó $x^3 = y$ con hacer $a = 1$.

III. Quando el esponente m de la potencia x^m fuese impar, y el esponente n de y^n par; la raiz m de x^m será siempre $+x$, y la raiz n de y^n será $\pm y$. Porque supongamos, por exemplo que sea AM una segunda parábola cúbica, cuya equacion es $x^3 = ayy$ ó $x^3 = yy$, es evidente que la raiz cúbica de x^3 es solo x , y que la de yy es $\pm y$. De donde resulta, que la parábola AM se ha de continuar en el ángulo BAE que está al lado del ángulo BAD : de suerte que si por un punto qualquiera P de la línea AB , tiramos una parale-

la

la á *DE*, encontrará la parábola entera *MAM'* en dos puntos *M*, *M'* que estarán á igual distancia del punto *P*. Fig.

Es constante que todos estos tres casos están cifrados en la equacion $x^m = y^n$; porque si *m* y *n* fuesen ambos pares, se sacaría de cada miembro la raíz quadrada quantas veces se pudiera, con lo que se reduciría por fin la equacion á otra, en la qual el uno de los esponentes sería impar por precision. Tambien se puede siempre suponer que *m* es mayor que *n*; porque si fuese menor, y tubiéramos, por egemplo, $aax = y^3$, con referir los puntos de la parábola *AM* á los de la línea *DE*, y llamar *AK*, *x*; *KM*, *y*, sacaríamos estotra equacion $x^3 = ayy$, que tambien espresaría la naturaleza de la misma parábola *AM*, en la qual *m* es mayor que *n*. 99.

De la Conchoide.

2 3 3 Supongamos que siendo *BD*, *AH* dos rectas indefinitas que se cortan á ángulos rectos en el punto *A*, la *DB* se mueva al rededor del punto *B*, que se llama el *Polo*: de manera que siempre pase sobre la *GH*, que llamaremos la *Directriz*, y que en qualquiera posicion que esté *BD*, sus partes *QM*, *AD* y *Qm*, *Ad* &c. sean siempre iguales la una á la otra; la curva que pasare por todos los puntos *M*, *D*, *M'* será la *Conchoide superior*, y la que pasare por todos los puntos *mdm'* se llamará la *Conchoide inferior*.

2 3 4 Para sacar la equacion de esta curva, tiraremos la *MP* perpendicular á *AH*, y llamaremos *AD* = *QM*, *a*; *AB*, *b*; *PM*, *y*; *AP*, *x*; del triángulo rectángulo *QPM*,

Fig. sacaremos $PQ = \sqrt{(aa - yy)}$, y $AQ = x - \sqrt{(aa - yy)}$. Sentado esto, los triángulos semejantes BAQ , QPM darán $BA : AQ :: MP : PQ$, esto es $b : x - \sqrt{(aa - yy)} :: y : \sqrt{(aa - yy)}$; multiplicando extremos y medios, saldrá $xy - y\sqrt{(aa - yy)} = b\sqrt{(aa - yy)}$; trasladando á un solo miembro todo lo que está multiplicado por el radical, y reduciendo, saldrá $xy = (b + y)\sqrt{(aa - yy)}$, y quadrando $x^2y^2 = (b + y)^2 \times (aa - yy)$; esta será la equacion de la conchoide superior.

2 3 5 Para sacar la de la conchoide inferior, tiraremos la ordenada mF que llamaremos y , y será x la abscisa AF ; QF será $\sqrt{(aa - yy)}$, y $AQ = x + \sqrt{(aa - yy)}$. Sentado esto, de los triángulos semejantes QAB , QFm , sacaremos $QA : AB :: QF : Fm$, ó $x + \sqrt{(aa - yy)} : b :: \sqrt{(aa - yy)} : y$; luego $xy + y\sqrt{(aa - yy)} = b\sqrt{(aa - yy)}$; luego $xy = (b - y)\sqrt{(aa - yy)}$, y quadrando, será $x^2y^2 = (b - y)^2 \times (aa - yy)$ la equacion de la conchoide inferior.

Es la conchoide una curva geométrica. Porque 1.º la podemos concebir trazada por un movimiento continuo, con suponer que la línea BD ó BM pasa siempre por el centro del círculo MHm , corriendo siempre dicho centro sobre la directriz GH , y señalando la interseccion continua M una curva MDM' . 2.º La relacion entre cada punto M de la curva, y de la recta GH se espresa exactamente por una equacion, que es siempre la misma respecto de todos los puntos de la curva. 3.º Se verifica en la conchoide lo dicho (10) acerca de las curvas geométricas. Las abs-

abscisas positivas se toman en la línea AH desde A ácia G , Fig. y las abscisas negativas desde A ácia H ; las ordenadas MP son todas paralelas á BA . La directriz GH es el ege y D el vértice de la curva.

De la Cisoide.

236 Despues de trazado el semicírculo AHB , y tí- 101.
rada la tangente indefinita BG , tírense desde el punto A á la tangente, una infinidat de líneas AG , Ag , que todas cortarán la circunferencia del semicírculo. Hágase $AD = FG$, $Ad = fg$ &c. la línea curva ADd que pasa por todos los puntos D , d se llama *Cisoide*, cuyo inventor fue Diocles. Por medio del otro semicírculo se trazaría la otra porcion AK de la misma curva.

Para hallar la equacion de la cisoide respecto de uno de sus puntos qualquiera D , tirarémcs desde el punto D la perpendicular DC á AB , y desde el punto F donde la ADG corta la circunferencia del círculo, la FE tambien perpendicular á AB ; será $AC = EB$, porque siendo paralelas las dos líneas CD , EF , cortarán proporcionalmente los lados AG , AB del triángulo ABG ; pero en virtud de la construccion $AD = FG$, será, pues, tambien $AC = EB$.

Sentado esto, el diámetro AB es el ege de la cisoide; A , su vértice; las abscisas AC , AE se toman en el ege; y las ordenadas CD , Ed son paralelas. Llamemos el ege AB , a ; la abscisa $AC = BE$, x ; la ordenada CD , y ; será $AE = AB - EB = a - x$, y $(EF)^2 = AE \times EB = ax - xx$; será por consiguiente $EF = \sqrt{(ax - xx)}$.

Fig. Los triángulos equiángulos ACD , AEF dán $AC:CD::$

10-1. $AE:EF$, esto es, $x:y::a-x:\sqrt{(ax-xx)}$. Luego multiplicando extremos, y medios, tendremos $ay-xy = x\sqrt{(ax-xx)}$; quadrando ambos miembros, resultará $a^2y^2 - 2axy + xxy = ax^3 - x^4$, y dividiéndolos por $a-x$, sacaremos $x^3 = ayy - xyy$, que será la equacion de la cisoide.

La cisoide pasa por el punto H , que está en medio de la semicircunferencia; porque si desde el centro C' tiramos la $C'H$ perpendicular al diámetro, será paralela á la base BL del triángulo ABL . Tendremos, pues, $AC':C'B::AH:HL$, pero $AC'=C'B$; luego $AH=HL$, y será A uno de los puntos de la cisoide.

Las razones con que hemos probado que la conchoide es una curva algebraica, manifiestan que lo es tambien la cisoide.

De los Lugares geométricos.

237 Toda linea que está cifrada en una equacion qualquiera suele llamarse el *Lugar* de dicha equacion, de manera que lo mismo es hallar el lugar de una equacion propuesta, que trazar la linea recta ó curva que representa. Por consiguiente para hallar el lugar de una equacion indeterminada, es menester, segun llevamos dicho (12) darla succesivamente varios valores á la abscisa x , con lo que se transformará la variable y que es la ordenada, en cantidad incógnita, cuyos diferentes valores penderán de los

los que se le dieren sucesivamente á la abscisa x ; y la Fig. línea recta ó curva que pasare por los extremos de todos los diferentes valores de la ordenada y , hallados por este camino, será el lugar de la equacion propuesta.

Es de suma importancia la doctrina de los lugares geométricos, pues en ella estriba la construccion geométrica de las equaciones. Pero como yá hemos declarado en el tomo segundo de esta obra los métodos que sirven para construir las equaciones del primero y segundo grado, nos ceñiremos á tratar de los lugares geométricos cuya construccion es indispensable para la resolucion geométrica de las equaciones de tercero y quarto grado.

Como todos estos lugares representan alguna de las tres secciones cónicas de que hemos tratado, manifestaremos su construccion por el mismo orden que hemos guardado en la investigacion de las propiedades de las espresadas curvas.

De los Lugares pertenecientes á la parábola.

238 Sean dos rectas incógnitas é indeterminadas 102. AP que llamaremos x ; PM , que llamaremos y ; y e , m , 103. n , r , s líneas rectas dadas.

1.º Despues de tomada en la línea AP la parte AB 102. $=m$, tiraremos las rectas $BE = n$, $AD = r$, paralelas á PM y del mismo lado que ella; por el punto A la recta AE que llamaremos e , y por el punto D la recta indefinita DG paralela á AE ; en la DG tomaremos la parte

Fig. $DC = s$ ácia PM , y con el diámetro CG , cuyo parámetro sea $CH = p$, y las ordenadas sean rectas paralelas á PM , trazaremos una parábola CM que coja ácia el mismo lado que AP . La porcion de esta parábola que estuviere dentro del ángulo PAD , que forma la AP con la AD tirada por el punto fijo A paralelamente á PM y ácia el mismo lado, será el lugar de la equacion general ó fórmula siguiente

$$\left. \begin{aligned} xy - \frac{2n}{m} xy + \frac{nn}{mm} xx - 2ry + \frac{2nr}{m} x + rr \\ - \frac{ep}{m} x + ps \end{aligned} \right\} = 0$$

Porque si desde un punto qualquiera M de dicha porcion de parábola, tiramos la linea PM que forme con AP un ángulo dado ó tomado á arbitrio APM , y que encuentre las paralelas AE , DG en los puntos F , G ; los triángulos semejantes ABE , APF darán $AB:AE::AP:AF$ ó DG , esto es $m:e::x:DG = \frac{ex}{m}$. Darán tambien los mismos triángulos $AB:BE::AP:PF$, esto es $m:n::x:PF = \frac{nx}{m}$; y por consiguiente GM ó $PM - PF - FG = y - \frac{nx}{m} - r$, y CG ó $DG - DC = \frac{ex}{m} - s$. Pero la propiedad de la parábola (60) dá $(GM)^2 = CG \times CH$, cuya equacion se transforma en la fórmula general propuesta, con substituir en lugar de las lineas sus valores analyticos; luego &c.

103. 2.º Por el punto fijo A tiraremos una recta indefinida AQ paralela á PM y del mismo lado; tomaremos en dicha linea la parte $AB = m$, y tiraremos $BE = n$ paralela á AP del mismo lado que PM , y por los puntos in-

indeterminados A, E la línea AE que llamaremos e ; y Fig. tomando en la AP la parte $AD = r$ del mismo lado que PM , tiraremos la recta indefinita DG paralela á AE , en la qual tomarémos la parte $DC = s$ tambien del mismo lado que PM . Concluída esta preparacion, con el diámetro CG cuyo parámetro sea $CH = p$, y las ordenadas sean rectas paralelas á AP , trazaremos una parábola CM que coja ácia el mismo lado que AQ . La porcion de esta parábola que estuviere dentro del ángulo BAP , será el lugar de esta segunda equacion general ó fórmula

$$xx - \frac{2n}{m}yx + \frac{nn}{mm}yy - 2rx + \frac{2nr}{m}y + rr \left\{ = 0 \right.$$

Porque si por uno de sus puntos qualquiera M tiramos la línea MQ paralela á AP , que encuentre las paralelas AE, DG en los puntos F, G ; serán semejantes los triángulos ABE, AQF , y darán las dos proporciones siguientes. 1.º $AB:AE::AQ=PM:AF=DG$, esto es, $m:e::y:DG=\frac{ey}{m}$. 2.º $AB:BE::AQ:QF$, esto es, $m:n::y:QF=\frac{ny}{m}$. Luego GM ó $QM - QF - FG = x - \frac{ny}{m} - r$ y CG ó $DG - DC = \frac{ey}{m} - s$. Y como la propiedad de la parábola dá $(GM)^2 = CG \times CH$, sacarémos la espresada fórmula, con substituir en esta última equacion en lugar de las líneas sus valores analýticos.

239 Acerca de las dos fórmulas que hemos dado conviene hacer dos prevenciones de suma importancia. 1.º En la primera está el quadrado yy sin fraccion, y en la segunda lo está el quadrado xx . 2.º En ambas fórmulas los quadra-

Fig. dos xx é yy están con las mismas líneas, por manera que el quadrado $\frac{nn}{mm}$ de la mitad de la fraccion $\frac{2n}{m}$ que multiplica el rectángulo xy , multiplica tambien el uno de los quadrados xx ó yy ; de donde hemos de inferir que si el rectángulo xy faltase en alguna de las dos fórmulas, tambien faltaria el quadrado $\frac{nnxx}{mm}$ ó $\frac{nnyy}{mm}$, porque en este caso sería nula la fraccion $\frac{2n}{m}$.

240 Sentado esto, será facil construir el lugar de una equacion dada, tal que no lleve el rectángulo xy , y falte por lo mismo uno de los quadrados xx é yy ; ó que si llevare el rectángulo xy , lleve tambien con unos mismos signos ambos quadrados xx é yy , por manera que el quadrado de la mitad de la fraccion que multiplicare xy sea igual á la fraccion que multiplicare el quadrado de la una de las dos incógnitas. Suponemos que el uno de dichos dos quadrados está sin fraccion alguna.

Esto se conseguirá comparando cada término de la equacion dada con su correspondiente en la primera fórmula, si llevare el quadrado yy sin fraccion; ó con su correspondiente en la segunda fórmula, si llevare sin fraccion el quadrado xx . De la comparacion de dichos términos homólogos, se inferirán los valores de las cantidades e, m, n, p, r, s que servirán para trazar del mismo modo que antes una parábola que será el lugar de la equacion propuesta. Pero será indispensable tener presente

241 1.º Que se podrá tomar la linea $AB = m$ positiva y de la longitud que se quisiese. 2.º Siendo dadas las
 103. lineas $AB = m$, y $BE = n$, será tambien dada la linea
 AE



$AE = e$, pues es dado el ángulo ABE . 3.º Quando $BE =$ Fig.
 $n = 0$, la linea AE se confunde con AB , esto es con
 AP en la construccion de la primera fórmula, y con AQ
 en la construccion de la segunda; en cuyo supuesto será
 $AB = m = AE = e$, porque entonces coincidirán los
 puntos B, E . 4.º Quando fuere negativo el valor de algu-
 na de las cantidades n, r, s , se deberá tirar la linea que re-
 presentare del lado opuesto respecto de PM , pero se tirará
 del mismo lado si fuere positivo, conforme lo hemos prac-
 ticado antes (238).

242 Si acaso el valor del parámetro $CH = p$ fuese
 negativo, deberá trazarse la parábola en una direccion con-
 traria á la propuesta (238): quiero decir ácia el otro
 lado respecto de AP , para construir la primera fórmula, y
 al otro lado respecto de AQ para construir la segunda. To-
 do esto lo aclararán los egemplos siguientes.

243 Cuestion I. *Construir el lugar de la equacion*
 $yy - 2ay - bx + cc = 0$.

Como el quadrado yy está en la propuesta sin fraccion,
 nos valdremos de la primera fórmula (238), y de la
 comparacion de los términos homólogos sacaremos 1.º $\frac{2n}{m}$
 $= 0$, porque como la propuesta no lleva el rectángulo xy ,
 le podemos considerar como si le multiplicase cero; de don-
 de sacaremos $n = 0$, y por consiguiente (241) $m = e$.
 Borraremos, pues, en la fórmula todos los términos que lle-
 van $\frac{n}{m}$, substituiremos en lugar de m su valor e , y sacare-
 mos $yy - 2ry - px + rr + ps = 0$. 2.º De la compa-

Fig. racion de $-2ry$ con $-2ay$, que son dos términos homólogos, sacaremos $r = a$. 3.º De $-px = -bx$, sacaremos $p = b$. 4.º Finalmente la comparacion de los términos homólogos que no llevan ninguna de las dos incógnitas x é y , dán $rr + ps = cc$, y substituyendo en lugar de r y p sus valores respectivos a y b , sacaremos $s = \frac{cc - aa}{b}$, que será negativa quando a fuere mayor que c , segun suponemos. Como de la comparacion de los dos primeros términos no sacaríamos nada, hemos escusado compararlos. Una vez determinados los valores de n, r, p, s , construiremos el lugar imitando la construccion de la segunda fórmula (238), y teniendo presente lo prevenido (241).

104. Ya que $BE = n = 0$, los puntos B y E coinciden, y la línea AE se confunde con AP (241); por este motivo tiraremos por el punto fijo A la línea $AD = r = a$ paralela á PM , y del mismo lado, por ser positivo su valor. Tiraremos despues DG paralela á AP , en la qual tomaremos $DC = \frac{aa - cc}{b} = -s$ del lado opuesto á PM ; porque $s = \frac{cc - aa}{b}$ que es un valor negativo. Finalmente, con el diámetro CG , cuyo parámetro sea $CH = p = b$, y las ordenadas sean rectas paralelas á PM , trazaremos una parábola (218), y sus dos porciones OMM , RMS , comprendidas dentro del ángulo PAO que forma la línea AP con la AO tirada paralelamente á PM , y del mismo lado, será el lugar de la equacion propuesta.

Porque si por uno qualquiera M de sus puntos tiramos la MP que forme con AP el ángulo dado ó arbitrario APM ,

y que encuentre DG en el punto G , tendremos $GM = y$ Fig.
 $= a$, ó $GM = a - y$, segun estuviere el punto M mas ar-
 riba ó mas abajo que el diámetro CG ; y CG ó $DG + CD$
 $= x + \frac{aa - cc}{b}$, y por lo mismo (60) $(GM)^2 = CG$
 $\times CH$, ó $yy = 2ay + aa = bx + aa - cc$, ó $yy = 2ay$
 $= bx + cc = 0$, que es la misma equacion propuesta.

244 Si prolongáramos AO al otro lado de A ácia X ; 104.
 1.º la porcion indefinita SM de la parábola, comprehendi-
 da dentro del ángulo SAX , sería el lugar de todos los va-
 lores negativos de la incógnita y , correspondientes á los va-
 lores positivos de la otra incógnita x en la equacion pro-
 puesta. Porque si tomáramos AP mayor que AS , y tirára-
 mos PM paralela á AX , y del mismo lado, que encuentra la
 porcion SM en M ; sería $PM = -y$, y por lo mismo la
 recta GM ó $GP + PM = a - y$, y se sacaria del mismo
 modo que antes la equacion propuesta, por medio de la pro-
 piedad de la parábola.

2.º La porcion RCO de la misma parábola, que está
 dentro del ángulo TAO opuesto al vértice al ángulo SAX ,
 será el lugar de todos los valores positivos de la incógnita
 y en la equacion propuesta, correspondientes á los valores
 negativos de la otra incógnita x ; porque con hacer $AP =$
 $= -x$, se sacará la equacion propuesta.

3.º Si hubiere una porcion de dicha parábola dentro
 del ángulo TAX opuesto al vértice al ángulo PAO , sería el
 lugar de todos los valores negativos de la incógnita y , cor-
 respondientes á los valores negativos de la otra incógnita x .

Por

Fig. Por manera que la espresada parábola es el lugar cabal de todos los valores ya positivos, ya negativos de la incógnita y , que corresponden á todos los valores positivos y negativos de la otra incógnita x en la equacion $yy - 2ay - bx + cc = 0$.

104. Por donde se echa de ver que en este egemplo hay dos valores positivos PM , PM de la incógnita y , que corresponden á un mismo valor AP de la otra incógnita x , quando dicha linea es menor que AS ; que hay un valor positivo PM , y un valor negativo $-PM$ quando AP es mayor que AS ; que no hay mas que un valor positivo SV de y , siendo el otro cero, quando $AP = AS$; que hay dos valores positivos PM , PM de la incógnita y , correspondientes al mismo valor negativo $-AP$ de la incógnita x , quando AP es menor que AT ; que dichos dos valores llegan á ser iguales cada uno á la tangente TC , quando $AP = AT$; y finalmente, que si tomáramos $AP = -x$ mayor que AT , entónces la aplicada PM no encontraría la parábola en punto alguno, y no habría por consiguiente valor alguno positivo ó negativo de la incógnita y , que pudiese corresponder á dicho valor negativo $-AP$ de la otra incógnita x ; quiero decir que en este caso ambos valores de la incógnita y serían imaginarios.

Todo lo que acabamos de decir se aplica igualmente á los demás egemplos que traeremos, así respecto de la parábola, como respecto de las demás secciones cónicas; por

ma-

manera que la seccion cónica que resultare de la construccion, será no solo el lugar de todos los valores positivos de la incógnita x ; sino tambien el lugar de todos los valores positivos y negativos de la incógnita y , correspondientes á todos los valores positivos y negativos de la otra incógnita x .

245 Cuestion II. *Construir el lugar de la equacion*
 $yy + \frac{2b}{a}xy + \frac{bb}{aa}xx + 2cy - bx + cc = 0$.

Por estar aquí sin fraccion el quadrado yy , usaremos, como en la cuestion antecedente, de la primera fórmula (238); y de la comparacion de los términos homólogos sacaremos 1.º $\frac{2n}{m} = -\frac{2b}{a}$, que dá $n = -b$, haciendo $m = a$ (241). 2.º $\frac{nn}{mm} = \frac{bb}{aa}$, que dá $n = -b$; 3.º $r = -c$; 4.º $\frac{2nr - ep}{m} = -b$, y por lo mismo $p = \frac{ab + 2bc}{e}$, despues de substituidos en lugar de m, n, r sus valores $a, -b, -c$. 5.º $rr + ps = cc$, que dá $s = 0$, con substituir en lugar de rr su valor cc . Una vez determinados los valores de m, n, r, p, s , construiremos el lugar de la equacion propuesta imitando la construccion de la primera fórmula (238) como sigue.

Tomaremos en la linea AP la parte $AB = m = a$; 105, tiraremos las rectas $BE = b = -n$, $AD = c = -r$ paralelas á PM , y del lado opuesto, porque $n = -b$, y $r = -c$ son valores negativos. Por los puntos determinados A, E tiraremos la linea $AE = e$ que es dada, y por el punto D la linea DG paralela á AE . Hecho esto, como $DC = s$ es cero, el punto C coincide con D , por

Fig. cuyo motivo con el diámetro DG , cuyo parámetro sea $DH = p = \frac{ab+2bc}{e}$, y las ordenadas sean rectas paralelas á PM , trazaremos (218) una parábola ; su porción OM que está dentro del ángulo PAH , donde suponemos que han de estar todos los puntos M , será el lugar de la equacion propuesta.

Porque si por uno qualquiera de sus puntos M , tiramos la MP que forme con la AP el ángulo dado ó arbitrario APM , y que encuentre las paralelas AE , DG en los puntos F , G ; los triángulos ABE , APF serán semejantes, y darán las dos proporciones siguientes 1.º $AB:AE :: AP:AF = DG$, esto es $a:e :: x:DG = \frac{ex}{a}$. 2.º $AB:BE :: AP:PF$, ó $a:b :: x:PF = \frac{bx}{a}$. Luego $GM = PM + PF + FG = y + \frac{bx}{a} + c$. Y como la propiedad de la parábola dá $(GM)^2 = GD \times DH$, tendremos $yy + \frac{2b}{a}xy + \frac{bb}{aa}xx + 2cy - bx + cc = 0$, despues de substituidos en lugar de las lineas sus valores analýticos, y traspasados todos los términos al primer miembro.

105. 246 Acerca de esta construccion hay que hacer algunas prevenciones importantes. 1.º Si la linea AP no cortára la parábola y no hiciera mas que tocarla, ó estuviera toda fuera de la curva, se inferiría que ninguno de los puntos M que buscamos, podria estar dentro del ángulo PAH , conforme supusimos al tiempo de hacer la construccion; y no habria por consiguiente valor alguno positivo de la incógnita y , que correspondiese á un valor positivo de la otra incógnita x , fuese la que se quisiere su lon-

longitud. Esta prevencion es transcendental á todos los casos parecidos al propuesto, así respecto de la parábola, como respecto de todas las demás secciones cónicas.

247 2.º Si en lugar de hacer $AB = m = a$ la hiciéramos igual á otra cantidad distinta de a , fuese la que fuese, los valores de $BE = n$, y $AE = e$ serían distintos á la verdad; pero las razones $\frac{n}{m}$, $\frac{e}{m}$ permanecerían las mismas; porque en el triángulo ABE el ángulo ABE es dado, y lo es tambien la razon del lado AB al lado AE , que en este egeemplo es $\frac{n}{m} = \frac{b}{a}$. Y como en los valores de p , r , s no puede haber otras razones que $\frac{n}{m}$, $\frac{e}{m}$, se sigue que dichos valores serán siempre unos mismos qualquiera valor positivo que se le dé á la linea $AB = m$; de suerte que hemos hecho $m = a$ solo para que saliese menos complicada la construccion.

248 Question III. *Construir el lugar de la equacion*
 $xx + \frac{2b}{a}xy + \frac{bb}{aa}yy - 2cx + by - \frac{2bc}{a}y = 0$.

Por llevar esta equacion el quadrado xx sin fraccion, uso de la segunda fórmula (238); y de la comparacion de los términos homólogos saco 1.º $\frac{2n}{m} = -\frac{2b}{a}$, que dá $n = -b$, con hacer $m = a$. 2.º $\frac{nn}{mm} = \frac{bb}{aa}$; y por ser $m = a$, sale $n = -b$, lo mismo que antes. 3.º $r = c$. 4.º $\frac{2nr - ep}{m} = b - \frac{2bc}{a}$, que dá $p = -\frac{ab}{e}$, con substituir en lugar de m , n , r sus valores respectivos a , $-b$, c . 5.º $rr + ps = 0$, porque la propuesta no lleva término alguno conocido que se pueda comparar con el término todo conocido $rr + ps$ de la fórmula; de donde sacare-

mos

Fig. mos $s = -\frac{rr}{p} = \frac{ecc}{ab}$, con substituir en lugar de r y p sus valores c y $-\frac{ab}{c}$. Una vez determinados los valores de las cantidades m, n, r &c. construyo el lugar que se pide usando de la construccion de la segunda fórmula, y teniendo presente lo prevenido (241 y 242).

106. A este efecto tiro por el punto fijo A una linea indefinita AQ paralela á PM , tomo en dicha linea la parte $AB = m = a$; y por el punto B tiro $BE = b = -n$ paralela á AP , y del lado opuesto á PM , por ser negativo el valor de n ; y por los puntos determinados A, E tiro la linea $AE = e$ que es dada. Tomo en la AP la parte $AD = r = c$ ácia el lado de PM , tiro la recta indefinita DG paralela á AE , en la qual tomo la parte $DC = s = \frac{ecc}{ab}$ del lado PM . Hecho esto, con el diámetro GC cuyo parámetro es $CH = \frac{ab}{c} = -p$, y las ordenadas lineas paralelas á AP , trazo (218) una parábola que coja (242) ácia el lado opuesto á AQ , por ser negativo el valor de $p = -\frac{ab}{c}$. La porcion OMR de esta parábola, que está dentro del ángulo PAB , será el lugar que se pide.

Porque si por uno qualquiera M de sus puntos, tiro la MQ paralela á AP , que encuentre las paralelas AE, DG en los puntos F, G , los triángulos ABE y AQF serán semejantes. Tendremos pues $AB:AE::AQ=PM:AF=$
 $=DG$, ó $a:e::y:DG = \frac{ey}{a}$. 2.º $AB:BE::AQ:QF$, esto es, $a:b::y:QF = \frac{by}{a}$. Luego $GM = QM + FQ$
 $= FG = x + \frac{by}{a} = c$, ó $GM = FG - FQ - QM =$

$c - \frac{by}{a} - x$, segun á qué lado del diámetro CD estubie- Fig.
 re el punto M ; y la abscisa $CG = CD - DG = \frac{ecc}{ab} -$
 $\frac{ey}{a}$. Pero por la propiedad de la parábola (60) $(GM)^2$
 $= CG \times CH$, esto es $xx + \frac{2b}{a}xy + \frac{bb}{aa}yy = 2cx + by$
 $- \frac{2bc}{a}y = 0$ despues de substituidos en lugar de las li-
 neas sus valores &c.

249 Se viene á los ojos que si de la comparacion de
 los términos homólogos resultase $p = 0$, sería imposible
 la construccion de la parábola. Pero entónces la equacion
 propuesta podrá siempre bajar un grado, por manera que
 será el lugar de una linea recta, y esto lo manifiestan las
 fórmulas mismas (238). Porque si en la primera bor-
 ramos los términos que llevan p , sale $yy - \frac{2n}{m}xy + \frac{nn}{mm}xx$
 $- 2ry + \frac{2nr}{m}x + rr = 0$, cuya raiz quadrada es
 $y - \frac{nx}{m} - r = 0$, ó $y = \frac{nx}{m} + r$, cuyo lugar es una linea
 recta que se construirá por lo dicho (29).

250 Cuestion IV. Hallar el lugar de la equacion
 $xx - ay = 0$.















Por estar sin fraccion el quadrado xx en la propues-
 ta, uso de la segunda fórmula (238); y de la compa-
 racion de los términos homólogos saco 1.º $\frac{2n}{m} = 0$, por-
 que falta xy en la propuesta; $n = 0$, y por lo mismo
 (241) $m = e$. 2.º $\frac{nn}{mm} = 0$, porque tambien falta yy ,
 de donde infiero $n = 0$. 3.º $r = 0$, porque no tiene la
 propuesta término alguno que lleve la primera potencia de
 x ; por lo que, borrando en la fórmula todos los términos
 en que están $\frac{n}{m}$ y r , y substituyendo en lugar de e su va-
 lor


Fig. lor m , resulta $xx - py + ps = 0$, cuyos términos compararé con los de la propuesta. 4.º de $-py = -ay$ saco $p = a$. 5.º Como no lleva la propuesta término alguno enteramente conocido que comparar con ps , se sigue que $ps = 0$, y que por lo mismo $s = 0$. Una vez determinados por este medio los valores de n, r, p, s , servirán para construir el lugar que se pide, imitando la construccion de la segunda fórmula (238), y teniendo presente lo prevenido (241).

107. Porque $BE = n = 0$, la linea AE coincide con AQ tirada paralelamente á PM y del mismo lado, lo propio digo de DG , porque $AD = r = 0$. Pero ya que $CD = s = 0$, el punto C coincide con D que coincide con A segun acabamos de ver. Por consiguiente trazo una parábola (218) con el diámetro AQ , cuyo parámetro el $AH = p = a$, y cuyas ordenadas sean rectas MQ paralelas á AP ; y la porcion indefinita AM que está dentro del ángulo PAQ es el lugar que busco.

Porque si por uno qualquiera M de sus puntos tiramos las rectas MP, MQ paralelas á AQ, AP , tendremos por la propiedad de la parábola (60) $(QM)^2 = AQ \times AH$, esto es $xx = ay$, y $xx - ay = 0$ que es la misma equacion propuesta.

251 Es constante que si substituímos en la fórmula general (238) en lugar de m, n, r, s, p los valores que se hallaren comparando sus términos con los de la equacion propuesta, sea la que fuere, con tal que tenga las





las condiciones especificadas en la cuestion , que la espresada fórmula se transformará en la equacion propuesta ; y por consiguiente que si tomamos dichos valores en la construccion de la fórmula , el lugar de la fórmula general se transformará en el de la equacion propuesta. Luego &c.

De los Lugares pertenecientes á la elipse ó al círculo.

252 Sean dos lineas rectas incógnitas é indeterminadas AP , que llamaremos x , y PM , que llamaremos y ; y sean tambien m, n, p, r, s, t lineas rectas dadas. 108.

En la linea AP tomaremos la parte $AB = m$; y tirando las rectas $BE = n$, $AD = r$ paralelas á PM y del mismo lado que ella, tiraremos por el punto A la recta AE que es dada , y la llamaremos e ; y por el punto D , la recta indefinita DG paralela á AE , en la qual tomaremos la parte $DC = s$ del lado de PM , y al uno y otro lado del punto C , las partes CK, CL cada una igual á t ; trazaremos despues una elipse (218) con el diámetro $LK = 2t$, cuyo parámetro sea $KH = p$, y las ordenadas sean rectas paralelas á PM . La porcion OMR de la espresada elipse, comprendida dentro del ángulo PAD que forma la linea AP con la AD tirada por el punto fijo A paralelamente á PM y del mismo lado, será el lugar de la equacion general ó fórmula que sigue

$$\left. \begin{aligned} xy - \frac{2n}{m} xy + \frac{nn}{mm} xx - 2ry + \frac{2nr}{m} x + rr \\ + \frac{cep}{2mt} - \frac{2eps}{2mt} - \frac{ptt}{2t} + \frac{pss}{2t} \end{aligned} \right\} = 0$$

Tom.III.

L

Por-

Fig. Porque si por un punto qualquiera M de dicha porcion de elipse tiramos la MP que forme con AP el ángulo dado ó arbitrario APM , y que encuentre las paralelas AE , DG en los puntos F , G ; serán semejantes los triángulos ABE , APF , y sacaremos AF ó $DG = \frac{ex}{m}$, y $PF = \frac{nx}{m}$. Tendremos, pues, $GM = y - \frac{nx}{m} - r$, y $CG = \frac{ex}{m} - s$. Pero la propiedad de la elipse (112 y 93) dá $KL : KH :: LG \times GK$ ó $(CK)^2 = (CG)^2 : (GM)^2$; esto es,

$$2t : p :: tt - ss + \frac{2esx}{m} - \frac{eexx}{mm} : yy - \frac{2n}{m}xy - 2ry + \frac{\frac{nn}{mm}xx + \frac{2nr}{m}x + rr}{2t} + \frac{2epsx}{2mt} - \frac{eepxx}{2mme}. \text{ Luego \&c.}$$

Si el diámetro $KL = 2t$ y su parámetro $KH = p$ fuesen iguales, sería siempre $(GM)^2 = LG \times GK$; y por consiguiente si fuese recto el ángulo CGM , la elipse sería entónces un círculo cuyo diámetro sería la linea KL .

253 Es evidente que en esta fórmula están siempre los quadrados yy y xx con unos mismos signos, y que quando está tambien el rectángulo xy , el quadrado $\frac{nn}{mm}$ de la mitad de la fraccion $\frac{2n}{m}$ que multiplica dicho rectángulo, ha de ser menor que la fraccion $\frac{nn}{mm} + \frac{eep}{2mme}$ que multiplica el quadrado xx .

254 En virtud de esto será facil construir el lugar de una equacion dada, en la qual estén los dos quadrados xx é yy con los mismos signos sin el rectángulo xy , ó con él, de modo que el quadrado de la mitad de la fraccion que le multiplica, sea menor que la fraccion que multiplica el quadrado xx . En todo esto suponemos que esté sin fraccion el quadrado yy .

Para cuyo fin se cotejarán los términos de la equacion propuesta con sus homólogos en la fórmula general (252), de cuyo cotejo se sacarán los valores de las cantidades m, n, p, r, s, t , y con ellos se trazará conforme hemos dicho (252), y teniendo presente lo prevenido (241), una elipse que será el lugar de la equacion propuesta.

255. Question I. *Hallar el lugar de la equacion $yy + xy + \frac{1}{2}xx - 2ay + bx + cc$, en la qual el quadrado de $\frac{1}{2}$ mitad de la fraccion $\frac{1}{1}$ ó 1 que multiplica xy , es menor que la fraccion $\frac{1}{2}$ que multiplica xx .*

De la comparacion de los términos de la fórmula con sus homólogos en la propuesta, sacaremos 1.º $\frac{2n}{m} = -1$; porque como no hay en este caso fraccion alguna literal que multiplique el rectángulo xy , le podemos considerar como multiplicado por la unidad, y por consiguiente si hacemos $m = a$, tendremos $n = -\frac{1}{2}a$. 2.º $\frac{nn}{mm} + \frac{ep}{2mte} = \frac{1}{2}$, de donde sacaremos $\frac{p}{t} = \frac{mm - 2nn}{ce} = \frac{aa}{2ce}$, substituyendo en lugar de m y n sus valores respectivos $a, -\frac{1}{2}a$; y por consiguiente $p = \frac{aat}{2ce}$. 3.º $r = a$. 4.º $\frac{2nr}{m} - \frac{2eps}{2mt} = b$, y substituyendo en lugar de $m, n, r, \frac{p}{t}$ sus valores respectivos $a, -\frac{1}{2}a, a, \frac{aa}{2ce}$, sale $s = \frac{-2ae - 2eb}{a}$. 5.º $rr - \frac{pte}{2t} + \frac{pss}{2t} = cc$, y por lo mismo $tt = ss + \frac{2trr}{p} - \frac{2tcc}{p} = ss + 4ee - \frac{4cee}{aa}$, despues de substituido en lugar de $\frac{p}{t}, r$ sus valores $\frac{aa}{2ce}, a$, que hemos hallado. Una vez hallados por este camino los valores m, n, r, s, p, t , se trazará la elipse imitando la construccion dada (252), y teniendo

Fig. do presente lo prevenido (241), del modo siguiente.

109. En la linea AP se tomará la parte $AB = m = a$, y tirando paralelamente á PM y del mismo lado la $AD = r = a$, y del lado opuesto la recta $BE = \frac{1}{2}a = -n$, porque $n = -\frac{1}{2}a$ que es un valor negativo; se tirará por el punto A la recta $AE = e$, que es dada, y por el punto D la recta DG paralela á AE , en la qual se tomará la parte $DC = \frac{2ac+2bc}{a} = -s$ del lado opuesto á PM ; y al uno y otro lado del punto C , las partes CK, CL cada una igual á $t = \sqrt{(ss + 4ee - \frac{4cce}{aa})}$. Se trazará despues una elipse (218) con el diámetro LK , cuyas ordenadas sean rectas paralelas á PM , y cuyo parámetro sea la linea $KH = p = \frac{aat}{2ce}$. Su porcion OMR que está dentro del ángulo PAD , será el lugar de la equacion propuesta.

Porque si por uno de sus puntos M , seá el que fuere, tiramos la linea PM que forme con AP el ángulo dado ú arbitrario APM , y que encuentre las paralelas AE, DG en los puntos F, G ; serán semejantes los triángulos ABE, APF . Tendremos pues $AB:AE::AP:AF$ ó DG , esto es, $a:e::x:DG = \frac{ex}{a}$; y $AB:BE::AP:PF$, ó $a:\frac{1}{2}a::x:PF = \frac{1}{2}x$. Por consiguiente $GM = y + \frac{1}{2}x - a$, y CG ó $DG + DC = \frac{ex}{a} - s$, por ser $DC = -s$. Pero la propiedad de la elipse (112 y 93) dá $KL:KH::LG \times GK$ ó $(CK)^2 = (CG)^2: (GM)^2$, esto es $2t: \frac{aat}{2ce}:: tt - ss + \frac{2cex}{a} - \frac{ceex}{aa}: xy + xy - 2ay + \frac{1}{2}xx - ax + aa$. Si en lugar de $tt - ss$ y s substituímos sus valores respectivos $4ee - \frac{4cce}{aa}$ y $-\frac{2ac-2bc}{a}$, multiplicamos

des-

despues los extremos y los medios, y dividimos ambos pro- Fig.
ductos por $2t$, sacaremos la misma equacion propuesta.

256 Si acaso $ss + 4ee$ fuese igual ó menor que $\frac{4cce}{aa}$, el valor de t sería nulo ó imaginario, y sería imposible trazar la elipse que debería ser el lugar de la equacion propuesta. Y como dicha equacion incluiría por precision algun absurdo, se sigue que ninguna linea podría ser su lugar; quiero decir que todos los valores de la incógnita y , que deberían corresponder á todos los valores positivos y negativos de la otra incógnita x , serían todos imaginarios.

Esto lo hace patente la fórmula (252) general, porque trasladando algunos términos, se transforma en $yy - \frac{2n}{m}xy - 2ry + \frac{nn}{mm}xx + \frac{2nr}{m}x + rr = \frac{ptt - pss}{2t} + \frac{2pcsx}{2mt} - \frac{ecpxx}{2mmt}$, en cuya equacion el primer miembro es el quadrado de $y - \frac{n}{m}x - r$; y el segundo es el quadrado de t menos el quadrado de $s - \frac{cx}{m}$, multiplicado por la fraccion $\frac{p}{2t}$. Es evidente que si el valor del quadrado tt fuere nulo ó negativo, será negativo el valor del espresado segundo miembro, y por consiguiente en ambos casos tendremos un quadrado, esto es, el primer miembro igual á un valor negativo, que es una contradiccion manifiesta.

257 Question II. Construir el lugar de la equacion $yy + \frac{b}{a}xy + xx + cy + fx - ag = 0$; en el supuesto (253) de ser $\frac{bb}{4aa}$ menor que la fraccion $\frac{1}{4}$ ó 1 que multiplica xx , esto es, de ser b menor que $2a$.

De la comparacion de los términos de la propuesta con sus homólogos en la fórmula general (252), sacare-

Fig. mos 1.º $\frac{2n}{m} = -\frac{b}{a}$; y haciendo $m = a$, sacaremos $n = -\frac{1}{2}b$. 2.º $\frac{nn}{mm} + \frac{cep}{2mmt} = 1$; y substituyendo en lugar de m y n sus valores a y $-\frac{1}{2}b$, sacaremos $\frac{p}{t} = \frac{4aa-bb}{2ce}$, y $p = \frac{4aat-bbt}{2ce}$. 3.º $r = -\frac{1}{2}c$. 4.º $s = \frac{bce-2afe}{4aa-bb}$. 5.º $t = \sqrt{\left(ss + \frac{ccce+4agce}{4aa-bb}\right)}$, de donde sacaremos la siguiente construccíon.

110. En la linea recta indefinita AP tomaremos la parte $AB = m = a$, y tiraremos paralelamente á PM , y del lado opuesto las rectas $BE = \frac{1}{2}b = -n$, $AD = \frac{1}{2}c = -r$; por el punto A tiraremos la recta $AE = e$, que es dada, y por el punto D la recta DG paralela á AE , en la qual tomaremos la parte $DC = s = \frac{bce-2afe}{4aa-bb}$ del mismo lado que PM , si fuere bc mayor que $2af$, conforme suponemos; y del otro lado, si fuese menor; tomaremos despues al uno y otro lado del punto C , las partes CK y CL igual cada una de ellas á $t = \sqrt{\left(ss + \frac{ccce+4agce}{4aa-bb}\right)}$. Hecho esto, trazaremos (218) una elipse con el diámetro $LK = 2t$, cuyas ordenadas sean rectas paralelas á PM , y el parámetro una linea $KH = p = \frac{4aat-bbt}{2ce}$. Su porción OR será el lugar de la equacion propuesta.

Porque si por uno qualquiera de sus puntos M tiramos la recta MP que forme con AP el ángulo dado ú arbitrario APM , y que encuentre las paralelas AE , LK en los puntos F , G ; será $PF = \frac{bx}{2a}$, y AF ó $DG = \frac{ex}{a}$; será pues $MG = MP + PF + FG = y + \frac{bx}{2a} + \frac{1}{2}c$, y $CG = \frac{ex}{a} - s$, ó $s - \frac{ex}{a}$. Pero la propiedad de la elipse es que $LK : KH :: LG \times GK : (GM)^2$ ó $2t : \frac{4aat-bbt}{2ce} :: tt - ss +$

$\frac{2esx}{a} - \frac{eeex}{aa} : yy + \frac{b}{a}xy + cy + \frac{bbxx}{4aa} + \frac{bc}{2a}x + \frac{1}{4}cc$. Si en Fig. lugar de $tt - ss$, y s substituimos sus valores respectivos $\frac{cce + 4agee}{4aa - bb}$ y $\frac{bce - 2afe}{4aa - bb}$, multiplicamos despues los extremos y medios, y dividimos por $2t$, resultará la equacion propuesta.

Si el ángulo AEB fuese recto, el ángulo CGM lo sería tambien; y el diámetro $LK = 2t$ sería igual al parámetro $KH = \frac{4aat - bbt}{2ce}$, pues $ee = aa - \frac{1}{4}bb$, por ser rectángulo el triángulo AEB . En este caso la elipse sería un círculo, cuyo radio sería la recta CK ó $CL = t = \sqrt{ss + \frac{1}{4}cc + ag}$, y $DC = s = \frac{bc - 2af}{4e}$, con lo que sería mucho mas sencilla la construccion.

258 Cuestion III. Hallar el lugar de la equacion $yy + xx - ax = 0$.

De la comparacion de los términos de la propuesta con sus homólogos en la fórmula general (252), sacaremos 1.º $\frac{2n}{m} = 0$, pues una vez que no está el término xy , le hemos de suponer multiplicado por cero; de donde sacaremos $n = 0$, y por lo mismo $m = e$. 2.º $\frac{nn}{mm} + \frac{cep}{2mmt} = 1$, esto es $\frac{p}{2t} = 1$, despues de substituidos en lugar de m y n sus valores 0 y e , y finalmente $p = 2t$. 3.º $r = 0$, porque una vez que en la propuesta no está la primera potencia de la incógnita y , la hemos de suponer multiplicada por cero; por lo que, si borramos en la fórmula general (252) todos los términos que llevan $\frac{n}{m}$ y r , y substituimos en lugar de e y $\frac{p}{2t}$ sus valores m y 1, se transformará en estotra $yy + xx - 2sx - tt + ss = 0$, cuyos términos hemos de

Fig. cotejar con los de la propuesta. $4^{\circ} 2s = a$, y $s = \frac{1}{2}a$.
 $5^{\circ} ss - tt = 0$, porque no tiene la propuesta término alguno enteramente conocido, y por lo mismo $tt = ss = \frac{1}{4}aa$, y sacando la raíz quadrada, $t = \frac{1}{2}a$. Una vez determinados estos valores, construiremos la elipse practicando lo que sigue.

III. Ya que $BE = n = 0$, AE coincide con AP , que tambien coincide con DG , por ser tambien $AD = r = 0$; por manera que el punto D coincide con el punto A . Por cuyo motivo tomaremos en la AP la parte $AC = s = \frac{1}{2}a$ del lado de PM ; y al uno y otro lado del punto C , las partes CK, CL cada una igual á $t = \frac{1}{2}a$ (en el caso actual el punto L coincide con A); trazaremos despues con el diámetro AK (218), cuyas ordenadas sean rectas paralelas á PM , y cuyo parámetro sea la linea $KH = p = 2t = a$, una elipse que será el lugar de la equacion propuesta.

Porque si por uno qualquiera M de sus dos puntos tiramos la recta MP , que forme con AP el ángulo dado ó arbitrario APM , tendremos (112 y 93) $AK:KH :: AP \times PK:(PM)^2$, esto es, $a:a :: ax - xx:yy$. De donde sale $yy + xx - ax = 0$.

Se viene á los ojos que si el ángulo APM fuese recto, la elipse sería un círculo cuyo diámetro seria la linea $AK = a$.

259 Hay dos casos en que el lugar de la equacion propuesta es un círculo.

1.º Quando ambos quadrados xx é yy están con los mis-

mismos signos , y sin quebrados en la equacion , que tam- Fig.
bien lleva el rectángulo xy , siendo al mismo tiempo recto
el ángulo AEB . Esto sucede quando tirando AF perpen-
dicular á PM , la razon entre PF y AP , que es la misma
que hay entre BE y AB , tiene por esponente la mitad de
la fraccion que multiplica el rectángulo xy . El lugar de la
equacion será en este caso un círculo , conforme hemos vis-
to (254) , y la misma fórmula general está diciendo
el por qué.

Porque de la comparacion de los términos homólogos
que llevan el quadrado xx , sacaremos esta equacion $\frac{nn}{mm} +$
 $\frac{ee}{2mm} = 1$; de donde saldrá $\frac{p}{2e} = \frac{mm-nn}{ee} = 1$, porque el
triángulo rectángulo AEB dá $mm = nn + ee$. Pero una vez
que el ángulo AEB es recto , el ángulo CGM que forma
el diámetro LK con sus ordenadas , será tambien recto ; y
por consiguiente por ser el diámetro LK igual á su paráme-
tro KH , se infiere que la elipse será en este caso un círculo.

2.º Quando los quadrados xx é yy están ambos en la
propuesta con los mismos signos , y sin fraccion en la equa-
cion que no lleva el rectángulo xy , siendo al mismo tiem-
po recto el ángulo APM , su lugar siempre será un círculo ,
conforme hemos visto (258) , y se prueba por la mis-
ma fórmula general.

Porque una vez que el rectángulo xy no está en la
equacion propuesta , la fraccion $\frac{2n}{m}$ de la fórmula será nu-
la ó cero , y por lo mismo $BE = n = 0$, y $m = e$. De
donde resulta 1.º que el diámetro LK es paralelo á la linea
 AP ,

Fig. *AP*, y que por consiguiente siendo el ángulo *CGM*, que forma con sus ordenadas, igual al ángulo *APM*, será recto.

2.º Que la fracción $\frac{nn}{mm} + \frac{ccp}{2mmt}$ que multiplica el quadrado *xx* en la fórmula, será $\frac{p}{2t}$, y será por lo mismo $\frac{p}{2t} = 1$; quieró decir, que el diámetro *LK* será igual á su parámetro *KH*.

La elipse que es el lugar de la equacion propuesta, será por consiguiente un círculo en este caso. Y como entonces la fórmula general se transforma en estotra

$$\left. \begin{array}{l} xy + xx - 2ry - 2sx + rr \\ - tt \\ + ss \end{array} \right\} = 0$$

se podrá, si se quisiere abreviar este cálculo, hacer uso de esta fórmula para hallar en virtud del cotejo de sus términos con los de la propuesta, los valores de *r*, *s*, *t*, que sirven para trazar el círculo, que será su lugar.

De los Lugares pertenecientes á la hypérbola referida á sus diámetros.

- 260 Suponiendo lo mismo que para la elipse (252),
 112. con el diámetro $LK = 2t$, cuyo parámetro sea $KH = p$,
 113. y las ordenadas sean rectas paralelas á *PM*, trazaremos (218) una hypérbola ó dos hypérbolas opuestas. Su porcion *MO*, ó sus porciones comprehendidas dentro del ángulo *PAD* que forma la linea *AP* con la linea *AD*, tirada por el punto fijo *A* paralelamente á *PM* y del mismo lado, será el lugar de esta fórmula ó equacion general

$$\left. \begin{aligned} yy - \frac{2n}{m}xy + \frac{nn}{mm}xx - 2ry + \frac{2nr}{m}x + rr \\ - \frac{cep}{2mmt} + \frac{2cps}{2mt} \pm \frac{ptt}{2t} \pm \frac{pss}{2t} \end{aligned} \right\} = 0.$$

Fig.

en la qual será $+\frac{ptt}{2t}$ quando el diámetro LK fuere un primer diámetro, y $-\frac{ptt}{2t}$ quando fuere un segundo diámetro.

Porque si por uno qualquiera M de sus puntos tiramos la linea MP que forme con AP el ángulo dado ó arbitrario APM , y que encuentre las paralelas AE , DG en los puntos F , G ; tendremos por la propiedad de la hypérbola (149 y 191) $KL:KH(CG)^2 \pm (CK)^2:(GM)^2$, esto es, $2t:p::\frac{ecxx}{mm}-\frac{2esx}{m}+ss \pm tt:\frac{pecxx}{2mmt}-\frac{2cpsx}{2mt}+\frac{pss}{2t} \pm \frac{ptt}{2t} =$
 $yy - \frac{2n}{m}xy - 2ry + \frac{nn}{mm}xx + \frac{2nr}{m}x + rr$. Luego &c.

Si el diámetro $KL = 2t$, y su parámetro $KH = p$ fuesen iguales, la hypérbola será equilátera.

261 Se infiere de lo que acabamos de decir 1.º que los dos quadrados xx é yy están siempre con signos diferentes en esta fórmula, quando no lleva el rectángulo xy ; ó quando está dicho rectángulo, siendo $\frac{cep}{2mmt}$ mayor que $\frac{nn}{mm}$.

2.º que pueden estar con los mismos signos, pero con la condicion de que esté el rectángulo xy , y que el quadrado $\frac{nn}{mm}$ de la mitad de la fraccion que le multiplica, sea mayor que la fraccion $\frac{nn}{mm} - \frac{cep}{2mmt}$ que multiplica el quadrado xx .

262 En virtud de esto se podrá construir el lugar de una equacion dada en que esten ambos quadrados xx é yy con signos diferentes, ó con los mismos signos, con tal que esté el rectángulo xy , y que el quadrado de la mitad de la fraccion que le multiplica, sea mayor que la fracion
 cion

Fig. cion que multiplica el quadrado xx . También suponemos que el quadrado yy esté sin fracciones, conforme manifestaremos en los egemplos.

263 Cuestion I. *Hallar el lugar de la equacion*
 $yy + \frac{2b}{a}xy + \frac{f}{a}xx + 2cy - 2gx - hh = 0$, en el supuesto de ser el quadrado $\frac{bb}{aa}$ mayor que $\frac{f}{a}$.

De la comparacion de los términos homólogos de la propuesta con los de la fórmula general, sacaremos 1.º $\frac{2n}{m} = -\frac{2b}{a}$, y por consiguiente, si hacemos $m = a$, tendremos $n = -b$. 2.º $\frac{cep}{2mmt} - \frac{nn}{mm} = -\frac{f}{a}$, luego $\frac{p}{2t} = \frac{bb-af}{ce}$, y $p = \frac{2bbt-2aft}{ce}$. 3.º $r = -c$. 4.º $\frac{2nr}{m} + \frac{2eps}{2mt} = -2g$, y substituyendo en lugar de $m, n, r, \frac{p}{2t}$ sus valores respectivos que acabamos de hallar, sacaremos $s = \frac{-bce-age}{bb-af}$. 5.º $tt = ss - \frac{2rnt-2hht}{p} = ss - \frac{ecce-eehh}{bb-af}$, es á saber $+tt$ quando el quadrado ss es mayor que $\frac{ecce-eehh}{bb-af}$, y $-tt$ quando es menor, porque el quadrado tt ha de ser positivo; estos dos casos son distintos. Una vez determinados los valores de m, n, r, s, t, p , construiremos el lugar, imitando lo que practicamos antes (260).

114. Tomaremos en la linea AP la parte $AB = a$, y tiraremos paralelamente á PM y del lado opuesto las rectas $BE = b = -n$, $AD = c = -r$; por los puntos A, E tiraremos la recta $AE = e$, que es dada, y por el punto D la recta indefinita DG paralela á AE , en la qual tomaremos la parte $DC = \frac{eag+ctc}{bb-af} = -s$ del lado opuesto á PM , y al uno y otro lado del punto C las partes CL, CK igual cada una de ellas á $t = \sqrt{\left(ss - \frac{ecce-eehh}{bb-af}\right)}$ ó $\sqrt{\left(\frac{ecce+eehh}{bb-af} - ss\right)}$, según

gun fuere ss mayor ó menor que $\frac{eccc+eehh}{bb-af}$. Hecho esto, con Fig. el diámetro LK , cuyas ordenadas sean rectas paralelas á PM , y cuyo parámetro sea la linea $KH=p=\frac{2bbt-2aft}{ee}$, trazaremos una hypérbola; previniendo que LK ha de ser un pri- 114. mer diámetro en el primer caso, y un segundo diámetro en 115. el segundo caso; la porcion OM de la espresada hypérbola, será el lugar de la equacion propuesta.

Porque si por uno qualquiera M de sus puntos tiramos una paralela PM á la AD , que encuentre las lineas AB , AE , DG en los puntos P , F , G ; será $PF=\frac{bx}{a}$, y $AF=DG=\frac{ex}{a}$, y por consiguiente $MG=y+\frac{bx}{a}+c$, CG ó $DG+CD=\frac{ex}{a}-s$, por ser $CD=-s$. Pero la propiedad de la hypérbola dá $LK:KH::(CG)^2\pm(CK)^2:(GM)^2$, esto es, $2t:\frac{2bbt-2aft}{ee}::\frac{eexx}{aa}-\frac{2esx}{a}+ss\pm tt:xy+\frac{2b}{a}xy+2cy+\frac{bb}{aa}xx+\frac{2bc}{a}x+cc$; y si en lugar de $ss\pm tt$ y s substituimos sus valores respectivos $\frac{eccc+eehh}{bb-af}$ y $\frac{bcc-age}{bb-af}$, multiplicamos despues los extremos y los medios, y dividimos por $2t$, sacaremos la misma equacion propuesta.

264 Si acaso $ss=\frac{eccc-eehh}{bb-af}$, el valor de tt será cero, y será imposible la construccion de la hypérbola. Pero en este caso la equacion propuesta bajará siempre de grado; por manera que su lugar no será yá, como debiera, una ó dos hypérbolas opuestas, sino una ó dos lineas rectas. Con efecto en el egeemplo propuesto hemos reducido la equacion propuesta á esta proporcion $ee:bb-af::\frac{eexx}{aa}-\frac{2esx}{a}+ss\pm tt:xy+\frac{2b}{a}xy+\frac{bb}{aa}xx+2cy+\frac{2bc}{a}x+cc$; de lo que, borrando tt que es nulo, multiplicando los extremos y los medios,

Fig. dios, y sacando de cada miembro la raíz quadrada, resultará $ey + \frac{ebx}{a} + ec = \left(\frac{ex}{a} - s\right) \times \sqrt{(bb - af)}$; y substituyendo en lugar de $-s$ su valor $\frac{bce + age}{bb - af}$, y dividiendo ambos miembros por e , se sacará esta equacion $y + \frac{bx}{a} + c = \frac{x\sqrt{(bb - af)}}{a} + \frac{ag + bc}{\sqrt{(bb - af)}}$, ó $y = \frac{-b + \sqrt{(bb - af)}}{a} x + \frac{ag + bc}{\sqrt{(bb - af)}} - c$, que con hacer $\frac{n}{m} = \frac{b - \sqrt{(bb - af)}}{a}$, y $p = \frac{ag + bc}{\sqrt{(bb - af)}} - c$, se transforma en estotra $y = p - \frac{n}{m}x$, cuyo lugar es una linea recta por lo dicho (29).

La razon de esto se saca facilísimamente de la misma fórmula general; porque si en la espresada fórmula general borramos el término $\pm \frac{prt}{2t}$ en que está el quadrado tt , que suponemos $= 0$, se transformará, con trasladar algunos términos, y sacar la raíz quadrada, en estotra $y - \frac{n}{m}x - r = \left(\frac{ex}{m} - s\right) \sqrt{\frac{p}{2t}}$ ó $\left(s - \frac{ex}{m}\right) \sqrt{\frac{p}{2t}}$ que no lleva mas que potencias lineares de las incógnitas x é y , y cuyo lugar será por consiguiente líneas rectas.

265 Question II. *Trazar el lugar de la equacion* $yy - xx + 2ay + ax = 0$.

De la comparacion de los términos homólogos sacaremos 1.º $\frac{2n}{m} = 0$, porque falta el término xy ; luego $n = 0$, y por consiguiente $m = e$. 2.º $\frac{p}{2t} = 1$; luego $p = 2t$. 3.º $r = -a$. 4.º $\frac{2ps}{2t} = a$, y $s = \frac{1}{2}a$. 5.º $rr \mp \frac{prt}{2t} - \frac{pts}{2t} = 0$, y por tanto $\mp tt = ss - \frac{2rrt}{p} = -\frac{3}{4}aa$, con substituir en lugar de r , $\frac{2t}{p}$, s sus valores respectivos $-a$, 1 , $\frac{1}{2}a$; de donde inferiremos que en el último término de la fórmula se ha de tomar $-tt$, y no $+tt$, para que el valor de tt sea positivo. Construiremos el lugar como sigue.

Ya

Ya que $AD = r = -a$, tiraremos por el punto A pa- Fig.
ralelamente á PM , y al lado opuesto la linea $AD = a$; y 116.
como $BE = n = 0$, tiraremos por el punto D la recta DG
paralela á AP , en la qual tomaremos la parte $DC = s =$
 $\frac{1}{2}a$ del mismo lado de PM , y al uno y otro lado del punto
 C las partes CL , CK cada una igual á $t = \sqrt{\frac{3}{4}aa}$. Despues
con el segundo diámetro LK , porque hemos tomado $-tt$
en el último término de la fórmula, cuyas ordenadas sean
rectas paralelas á PM , y el parámetro sea la recta $KH = p$
 $= 2t = LK$, trazaremos una hypérbola, cuya porcion
 OM será el lugar de la equacion propuesta.

Porque si por uno qualquiera M de sus puntos tiramos
una paralela MP á AD , que encuentre las rectas AP , DG
en los puntos P , G ; tendremos $MG = y + a$, CG ó $DG -$
 $DC = x - \frac{1}{2}a$, y por la propiedad de la hypérbola LK :
 $KH :: (CG)^2 + (CK)^2 : (GM)^2$, esto es $2t : 2t :: xx -$
 $ax + \frac{1}{4}aa + tt : yy + 2ay + aa$, que se transforma
en la equacion propuesta con substituir $\frac{3}{4}aa$ en lugar de tt .
Es patente que la hypérbola es equilátera.

266 Acerca de esta construccion hemos de conside-
rar que quando los dos quadrados xx é yy se hallan con dis-
tintos signos y sin fraccion en una equacion en que no está
el rectángulo xy ; su lugar siempre será una hypérbola equi-
látera. Porque la fraccion $\frac{2n}{m}$ de la fórmula será nula ó cero,
y por consiguiente $BE = n = 0$, y $m = e$. Luego la frac-
cion $\frac{nn}{mm} = \frac{ee}{2mm}$ que multiplica el quadrado xx en la fór-
mula llega á ser $-\frac{p}{2e}$, y será $-\frac{p}{2e} = 1$; quiero decir, que
el

Fig. el diámetro LK será igual á su parámetro KH , ó lo que es lo propio, la hypérbola será equilátera. Y como en este caso la fórmula general se transforma en estotra

$$\left. \begin{array}{l} xy - xx - 2ry + 2sx + rr \\ \quad \quad \quad + tt \\ \quad \quad \quad - ss \end{array} \right\} = 0$$

podrá servir para hallar los valores de r, s, t , estos servirán para trazar la hypérbola equilátera, que será el lugar de la equacion propuesta; con lo qué se abreviará el cálculo.

De los Lugares que pertenecen á la hypérbola comparada con sus asýmtotas.

267 Formemos con las dos líneas $AP = x, PM = y$ un ángulo arbitrario APM , y supongamos que m, n, p, r, s representen líneas rectas dadas.

1.º Tomarémos en la línea AP la parte $AB = m$; y despues de tiradas las rectas $BE = n, AD = r$, paralelas á PM y del mismo lado; tiraremos por el punto A la recta dada $AE = e$, y por el punto D la recta indefinita DG paralela á AE , y tomando en ella las partes $DC = s, CK = e$ ácia el lado que coge AP , tirarémos paralelamente á PM y del mismo lado la recta indefinita CL , y la $KH = p$. Hecho esto, trazarémos (210 y 211) entre las asýmtotas CL, CK una hypérbola que pase por el punto H , y será el lugar de la fórmula siguiente

$$\left. \begin{array}{l} xy - \frac{n}{m} xx - \frac{ms}{e} y + \frac{ns}{e} x + \frac{mrs}{e} \\ \quad \quad \quad - rx - mp \end{array} \right\} = 0$$

Por-

Porque $GM = y - \frac{nx}{m} - r$, $CG = \frac{ex}{m} - s$, y la Fig. propiedad de la hypérbola (171) dará $CG \times GM = CK \times KH$ ó $\frac{exy}{m} - sy - \frac{enxx}{mm} + \frac{nsx}{m} - \frac{erx}{m} + rs = ep$; de donde sacaremos, despejando el término xy , y escribiendo en orden los demás términos, la misma fórmula.

2.º Por el punto fijo A tiraremos una linea indefinida AQ paralela á PM y del mismo lado que ella; y despues de tomada en dicha linea la parte $AB = m$, tiraremos $BE = n$ paralela á AP y del mismo lado, y por los puntos indeterminados A , E la linea AE , que llamaremos e ; tomaremos en la AP la parte $AD = r$ del mismo lado de PM ; tiraremos la recta indefinita DG paralela á AE , en la qual tomaremos las partes $DC = s$, $CK = e$ del lado que coge PM , y tiraremos paralelamente á AP y del mismo lado, la recta indefinita CL , y la $KH = p$. Trazaremos finalmente (210 y 211) entre las asímtotas CL , CK una hypérbola que pasará por el punto H , y será el lugar de la fórmula siguiente

$$xy - \frac{n}{m}xy - \frac{ms}{e}x + \frac{ns}{e}y + \frac{mrs}{e} = 0.$$

$$- ry - mp.$$

Porque si desde uno qualquiera M de sus puntos, tiramos la MQ paralela á AP , y que encuentre las paralelas AE , DG en los puntos F , G ; los triángulos semejantes ABE , AQF darán $AB : AE :: AQ$ ó $PM : AF$ ó DG , esto es, $m : e :: y : DG = \frac{ey}{m}$; y $AB : BE :: AQ : QF$, esto es, $m : n :: y : QF = \frac{ny}{m}$. Luego $GM = x - \frac{ny}{m} - r$, $CG = \frac{ey}{m} - s$. Y como por la propiedad de la hypérbo-

Fig. la $CG \times GM = CK \times KH$, sacaremos la misma fórmula con substituir en lugar de las líneas sus valores analyticos, y despejar el término xy .

268 Se echa de ver 1.º que el término xy nunca falta en ninguna de las dos fórmulas (267); porque como no está multiplicado por fraccion ninguna, no se la puede suponer nula para conseguir que desaparezca xy . 2.º Que no pueden llevar mas que el uno de los quadros xx ó yy , que se desaparecerá quando fuere nula la fraccion $\frac{n}{m}$ que le multiplica.

269 Ya podremos hallar el lugar de toda equacion que llevare el rectángulo xy , y ninguno de los dos quadros xx é yy , ó no mas que el uno de ellos.

Para conseguirlo, despejarémos la cantidad xy , y cotejarémos los términos de la equacion propuesta con sus correspondientes en la primera fórmula, quando llevare el quadado xx , y con los de la segunda, si llevare el quadado yy , y con los términos de qualquiera de las dos fórmulas á arbitrio, quando no llevare ni xx ni yy . Del cotejo de los términos homólogos inferirémos los valores de las cantidades m, n, p, r, s , que servirán para trazar una hypérbola éntre sus asýntotas conforme hemos hecho poco há (267), teniendo presente que se habrán de tomar en lados opuestos á AP ó PM las líneas cuyos valores fueren negativos.

270 Cuestion I. ¿Qual es el lugar de la equacion $xy - \frac{b}{a} xx - cy = 0$?

Por

Por llevar la propuesta el quadrado xx , corejo sus términos con los de la primera fórmula, y saco 1.º $\frac{n}{m} = \frac{b}{a}$, y si hago $m = a$, sacaré $n = b$. 2.º $\frac{ms}{c} = c$; luego $s = \frac{ec}{a}$. 3.º $\frac{ns}{c} - r = 0$, porque en la propuesta no está la primera potencia de x , y por consiguiente $r = \frac{bc}{a}$. 4.º $\frac{mrs}{c} - mp = 0$, porque no hay en la propuesta ningun término constante; luego $p = \frac{rs}{c} = \frac{bcc}{aa}$. Y como los valores de $AP = m$, $BE = n$, $CD = s$, $AD = r$, $KH = p$ son todos positivos, construyo el lugar del mismo modo que antes (267).

Porque $GM = y - \frac{bx}{a} - \frac{bc}{a}$, CG ó $DG - DC = \frac{ex - ec}{a}$, y por la propiedad de la hypérbola será $CG \times GM = CK \times KH$, que será la misma equacion propuesta, si substituímos en lugar de las líneas sus valores analíticos. 117.

271 Cuestion II. Construir el lugar de la equacion $xy + \frac{b}{a}yy - cy - ff = 0$.

Por llevar esta equacion el quadrado yy , me valdré de la segunda fórmula; y de la comparacion de los términos homólogos sacaré 1.º $\frac{n}{m} = -\frac{b}{a}$, y si hago $m = a$, tendré $n = -b$. 2.º $\frac{ms}{c} = 0$, y $s = 0$. 3.º $r = c$. 4.º $mp = ff$, y $p = \frac{ff}{a}$; de donde inferiré la siguiente construccion.

Por el punto fijo A tiraré una línea indefinita AQ paralela á PM y del mismo lado que ella; y despues de tomada en dicha línea la parte $AB = m = a$, tiraré $BE = b = -n$ paralela á AP y al otro lado, y por los puntos A , E la línea $AE = e$. Tomaré en la AP la par-

Fig. te $AD = r = c$ del mismo lado que PM , y tiraré la recta indefinida DG paralela á AE , y porque coinciden uno con otro los puntos C, D , por ser $CD = s = 0$, tomo en dicha linea la parte $DK = e$ del lado que coge PM , y despues de tiradas paralelamente á AP y del mismo lado la linea $KH = p = \frac{ff}{a}$, y la recta indefinida DL , que en el caso actual coincide con AP , trazaré entre las asy'mtotas DL, DK una hypérbola que pasará por el punto H , y será el lugar de la propuesta.

Porque si por uno qualquiera M de sus puntos tiro MQ paralela á AP , y que encuentre en los puntos F, G las paralelas AE, DG ; será GM ó $MQ + QF - FG = x + \frac{by}{a} - c$, DG ó $AF = \frac{cy}{a}$, y por consiguiente $DG \times GM = \frac{exy}{a} + \frac{ebyy}{aa} - \frac{ecy}{a} = CK \times KH = \frac{eff}{a}$, de donde sacaré la misma equacion propuesta, con despejar la cantidad xy .

272 Si la diéramos á la línea arbitraria $AB = m$ un valor distinto de a , tambien serían otros los valores de $CK = e$, y $KH = p$, pero serían siempre unos mismos los valores del rectángulo $CK \times KH = ep$, y los de las rectas $AD = r$, $CD = s$; porque no hay en su espresion sino las razones $\frac{n}{m}, \frac{n}{e}, \frac{m}{e}$, que son constantes, porque en el triángulo ABE es dado el ángulo ABE , y es tambien dada la razon $\frac{n}{m} = \frac{b}{a}$ en el caso actual, cuya razon es la que hay entre $AB = m$, y $BE = n$. Y como la hypérbola que ha de pasar por el punto H , será siempre la misma (171), sea la que fuere la magnitud de las lineas

neas $CK = e$, y $KH = p$, con tal que no varíe el rectángulo $CK \times KH$; se infiere que se construirá siempre una misma hipérbola, sea el que fuere el valor de la línea $AB = m$.

273 Cuestión III. Hallar el lugar de la equation $xy - ay + bx + cc = 0$.

Por no llevar la propuesta ninguno de los dos cuadrados xx é yy , está á nuestro arbitrio valernos de la que quisiéremos de las dos fórmulas generales. Nos valdremos, pues, de la primera, y cotejando sus términos con los de la propuesta, sacaremos 1.º $\frac{n}{m} = 0$; luego $n = 0$, y $m = e$; haremos $m = a$. 2.º $\frac{ms}{e}$ ó $s = a$. 3.º $r = -b$; pues $\frac{ns}{e} = 0$. 4.º $rs - mp = cc$, y $p = -b - \frac{cc}{a}$. Una vez determinados los valores de m, n, r, s, p , construiremos el lugar como sigue.

Por ser $AD = r = -b$, tiraremos paralelamente á PM y del lado opuesto la $AD = b$; y por ser $BE = n = 0$, tiraremos la recta indefinida GD paralela á AP , y tomando en esta las partes $DC = s = a$, $CK = e = m = a$ del lado que coge AP , tiraremos la recta indefinida CL , y la $KH = b + \frac{cc}{a} = -p$ paralela á PM y del lado opuesto. Trazaremos despues la hipérbola opuesta á la hipérbola que pasare por el punto H , y tuviere por asíntotas las rectas CL, CK ; su porcion indefinida OM que está dentro del ángulo PAS , que forma la recta indefinida AP con la AS paralela á PM y del mismo lado, será el lugar de la propuesta.

Fig. Porque GM ó $PG + PM = y + b$, y CG ó $CD - DG = a - x$; y por consiguiente $CG \times GM = ay - xy + ab - bx = CK \times KH = ab + cc$, de donde sacaremos la propuesta.

No hubiera servido trazar la hypérbola que pasaría por el punto H ; porque ninguno de sus puntos estaría dentro del ángulo PAS , dentro del qual se supone que han de estar los puntos M .














274 Si acaso de la comparacion de los términos de la fórmula con los de la propuesta resultare $p = 0$, sería imposible trazar la hypérbola que debería ser el lugar de la propuesta, pues sería nula su potencia que ha de ser igual al rectángulo pe . Pero en este caso siempre bajaría de grado la equacion, y sería su lugar una linea recta; porque si en la primera fórmula (167), por egemplo, borramos el término mp , se transformará en $xy - \frac{n}{m}xx - \frac{ms}{c}y + \frac{ns}{c}x - rx + \frac{mrs}{c} = 0$, que despues de dividida por $\frac{cx}{m} - s$ se transforma en $y - \frac{nx}{m} - r = 0$, cuyo lugar es (29) una linea recta.

275 Resulta, pues, de todo lo dicho en este asunto que no son mas que dos los casos principales que abraza; el primero es quando la propuesta no lleva la cantidad xy ; el segundo es quando se halla xy en la propuesta.

En el primer caso hemos probado 1.º que el lugar será (240) una parábola, quando no hubiere en la propuesta mas que el uno de los dos quadrados yy ó xx .

2.º Si llevare ambos quadrados con el mismo signo, el

lu-





lugar será (254) una elipse ó un círculo. 3.º Si lleva- Fig.
re los dos quadrados con signos diferentes , el lugar será
(262) una hypérbola ó dos hypérbolas opuestas com-
paradas con sus diámetros.

En el segundo caso , es á saber , quando la equacion
llevare la cantidad xy : 1.º el lugar será (269) una hy-
pérbola entre sus asýmtotas , si no llevare la propuesta nin-
guno de los dos quadrados xx é yy , ó no mas que el uno.
2.º Si llevare con signos diferentes los dos quadrados yy
y xx , el lugar será (262) una hypérbola comparada
con sus diámetros. 3.º Si llevare los dos quadrados con
unos mismos signos , se desembarazará el quadrado yy de
la fraccion que le acompañare , y el lugar será (240)
una parábola quando el quadrado de la mitad de la frac-
cion que multiplicare xy , fuere igual á la fraccion que
multiplicare xx ; una (254) elipse ó un círculo , si fue-
re menor; y finalmente (262) una hypérbola ó dos hy-
pérbolas opuestas comparadas con sus diámetros , si fuere
mayor.

De la construccion Geométrica de las Equaciones del tercero y quarto grado.

276 Para construir las equaciones que no llevan
mas que una incógnita , ó lo que es lo mismo , para ha-
llar sus raíces , introducimos en la equacion propuesta una
incógnita mas , por manera que de ella se puedan sacar mu-
chas equaciones que lleven todas las incógnitas , y tales

Fig. que haya por lo menos dos qualesquiera de dichas equaciones, que lleven entre las dos todas las cantidades conocidas que hay en la propuesta; porque sin esta circunstancia no sería posible resultase la propuesta de eliminar la nueva incógnita que hubiéremos introducido. Despues escogemos entre todas las espresadas equaciones dos las mas sencillas de todas; construimos separadamente sus lugares, y sus puntos de interseccion dán las raices de la propuesta. Pide maña el introducir la nueva incógnita; porque es menester que los lugares que salieren de la propuesta, sean los mas sencillos que sea posible; por egemplo, si la equacion fuere del quarto grado, será indispensable que los lugares de las equaciones que de ella se originaren, no pasen del segundo grado; que entre dichos lugares haya siempre un círculo que es el mas sencillo de todos, y tambien una parábola, una hypérbola equilátera &c. Todo esto lo aclararán las proposiciones que vamos á sentar.

Construccion de las Equaciones del tercero y quarto grado por medio del círculo y de una parábola dada.

277 Propongámenos construir la equacion $x^4 + 2bx^3 + acxx - aadx - a^3f = 0$, siendo x la incógnita, y a, b, c, d, f cantidades dadas; y sea y otra incógnita, tal que su rectángulo por la dada a , sea igual al rectángulo de $x + b$ por x . Sacaremos de este supuesto las equaciones siguientes.

1.^a $ay = xx + bx$, y quadrándola resultará $x^4 + 2bx^3 + bbxx = aayy$: si en lugar de $x^4 + 2bx^3$ substituimos su valor $aayy - bbxx$ en la propuesta, sacaremos la siguiente equacion

2.^a $yy - \frac{bb}{aa}xx + \frac{c}{a}xx - dx - af = 0$, y si en esta substituimos en lugar de xx su valor $ay - bx$ que dá la primera equacion; 1.^o en $-\frac{bb}{aa}xx$; 2.^o en $\frac{c}{a}xx$; 3.^o en $-\frac{bb}{aa}xx + \frac{c}{a}xx$, resultarán las tres equaciones siguientes

$$3.^a yy - \frac{bb}{a}y + \frac{b^3}{aa}x + \frac{c}{a}xx - dx - af = 0;$$

$$4.^a yy - \frac{bb}{aa}xx + cy - \frac{bc}{a}x - dx - af = 0;$$

$$5.^a yy + cy - \frac{bb}{a}y - \frac{bc}{a}x + \frac{b^3}{aa}x - dx - af = 0.$$

Si de la quinta y última equacion restamos la primera $xx + bx - ay = 0$, y despues se la añadimos; resultarán las dos siguientes:

$$6.^a yy + cy - \frac{bb}{a}y + ay - xx - bx - \frac{bc}{a}x + \frac{b^3}{aa}x - dx - af = 0;$$

$$7.^a yy + cy - \frac{bb}{a}y - ay + xx + bx - \frac{bc}{a}x + \frac{b^3}{aa}x - dx - af = 0.$$

Todo esto sentado, si suponemos que las incógnitas x é y sean dos rectas AP , PM que formen un ángulo qualquiera APM ; no hay duda en que el lugar de la primera equacion será (240) una parábola; el de la segunda será una parábola, una elipse, ó una hypérbola, segun fuere bb igual, menor, ó mayor que ac ; el de la tercera será una elipse que se transformará en círculo (258 y 259) si fuere $c = a$, y el ángulo APM recto; el de la quarta será una hypérbola que será equilátera (265 y 266), si fuere $b = a$; el de la quinta será tambien una parábola; el de la sexta será una hypérbola equilátera; y finalmente el lugar de

Fig. la séptima será un círculo, si el ángulo APM fuese recto.

278 Si en la propuesta hubiere $- 2bx^3$ y no $+ 2bx^3$, sería preciso mudar en todas las equaciones los signos de todos los términos en que está b con dimension impar; y si faltase el segundo término, se deberían borrar todos los términos que llevaren b . Lo propio diremos de los demás términos de la propuesta acerca de las letras c, d, f que llevan. Pero es de observar que á pesar de todas las variaciones que pueden sobrevenir, el lugar de la primera equacion será una parábola, el de la sexta una hypérbola equilátera, y el de la tercera siempre será un círculo, si fuere recto el ángulo APM .

279 Hemos tomado la primera equacion $xx + bx = ay$, y no $xx - bx = ay$, ó $xx = ay$; porque después de quadrada la equacion $xx + bx = ay$, los dos primeros términos del primer miembro son los mismos que los dos primeros términos de la equacion propuesta $x^4 + 2bx^3$ &c. De donde nace otra equacion cuyo lugar no es mas que del segundo grado, y que combinada de diferentes modos con la primera, sirve para hallar, segun hemos manifestado, otras muchas cuyos lugares no pasan del segundo grado, y se construyen facilmente, porque no llevan la cantidad xy ; habiendo siempre entre ellas una, es á saber la última, que representa un círculo, en el supuesto de que forme x con y un ángulo recto.

121. 280 Cuestion I. Hallar las raices de la equacion propuesta $x^4 + 2bx^3 + acxx - aadx - a^3f = 0$, por

medio de un círculo , y de una parábola.

Fig.

Supondremos que x é y sean respectivamente dos líneas rectas AP , PM , que formen una con otra un ángulo recto APM ; construiremos (240) primero la parábola , que es el lugar de la primera equacion (277), y despues el círculo, que es el lugar de la séptima; sus intersecciones darán los diferentes valores de la incógnita x , que serán las raíces de la equacion propuesta.

Para cuyo fin tomaremos en la línea AP prolongada al otro lado de A , la parte $AD = \frac{1}{2}b$; por el punto D tiraremos una paralela á PM , en la qual tomaremos la parte $DC = \frac{bb}{4a}$ del lado opuesto á PM ; y con el ege CD cuyo origen esté en C , y el parámetro sea igual á la dada a , trazaremos una parábola MCM . Hecho esto , tiraremos por el punto fijo A una paralela AQ á PM , en la qual tomaremos la parte $AB = \frac{1}{2}a + \frac{bb}{2a} - \frac{1}{2}c = \mp g$ para abreviar; tiraremos paralelamente á AP la recta $BE = \frac{1}{2}d \pm \frac{bg}{a}$, es á saber, $-\frac{bg}{a}$ quando $AB = +g$, ó quando el valor de AB fuere positivo, y $+\frac{bg}{a}$ quando $AB = -g$; en la inteligencia de que tiraremos las dos líneas AB , BE , del lado de PM quando fuesen positivos sus valores, y del lado opuesto quando fuesen negativos. Llamando finalmente EA , m ; trazaremos desde el centro E , y con el radio $EM = \sqrt{(mm + af)}$ un círculo; y tirando desde los puntos M donde dicho círculo corta la parábola, perpendiculares PM á la línea AP , las partes AP de esta línea serán las raíces de la propuesta; es á saber, las positivas quando los puntos P

Fig. cayeren del lado donde hubiéremos supuesto que está PM al
221. tiempo de hacer la construccion, y las negativas quando
cayeren del lado opuesto.

Porque si prolongamos MQ paralela á AP , que en-
cuentre el ege CG en L ; será ML ó $AP + AD = x +$
 $\frac{1}{2}b$; CL ó $MP + DC = y + \frac{bb}{4a}$; y por la propiedad de la
parábola tendremos $(ML)^2 = CL \times a$, esto es, $xx + bx +$
 $\frac{1}{4}bb = \frac{1}{4}bb + ay$, ó $xx + bx = ay$, que es la primera
equacion (277). Ahora bien, si prolongamos EB has-
ta que se encuentre con PM en R , y tiramos el radio EM ;
del triángulo rectángulo ERM sacaremos $(EM)^2 = (ER)^2$
 $+ (RM)^2 = (EB)^2 + 2EB \times BR + (BR)^2 + (PM)^2$
 $- 2AB \times PM + (AB)^2 = (EB)^2 + (BA)^2 + af$ por
construccion: quiero decir, que borrando en ambos miem-
bros los quadrados $(EB)^2$, $(BA)^2$, y substituyendo en lu-
gar de $2AB$ su valor $a + \frac{bb}{a} = c$, y en lugar de $2BE$ su
valor $\frac{2bg}{a} = d$ ó $b + \frac{b^3}{aa} = \frac{bc}{a} = d$, y en lugar de BR ó
 AP y PM sus valores x é y , sacaremos la séptima equacion
 $yy + cy - ay - \frac{bb}{a}y + xx + bx + \frac{b^3}{aa}x - \frac{bc}{a}x - dx = af$,
y si substituimos en esta en lugar de y su valor $\frac{xx + bx}{a}$, que dá
la primera equacion, y en lugar de yy el quadrado de di-
cho valor, resultará la equacion propuesta $x^4 + 2bx^3 +$
 $acxx - dadx - a^3f = 0$. Luego será AP una raiz posi-
tiva de la propuesta.

Si tomáramos $-x = AP$, y $-y = PM$, quando
estas líneas están en los lados opuestos á los que hemos su-
puesto al tiempo de hacer la construccion; siempre sacarían-
mos

mos en virtud de la propiedad de la parábola la primera Fig.
equacion, y la séptima por medio de la propiedad del círculo. 121.

281 Es evidente que podremos hacer que la construcción precedente sea general para todas las equaciones del tercero y cuarto grado, y que nos valdremos para ejecutarla de una parábola, cuyo eje tenga un parámetro igual á una línea dada a ; 1.º si multiplicamos por su raíz x la equacion propuesta quando fuese de tercer grado; y tomamos (200 y sig.) una línea $2b$ igual á la suma de todas las que multiplicaren x^3 , un rectángulo ac igual á la suma de los que multiplicaren xx , un cubo aad igual á la suma de los que multiplicaren x , y finalmente la cantidad a^3f igual á todos los términos conocidos de la propuesta; 2.º si mudamos en los valores de las líneas AD , DC , AB , BE , EM , que determinan la construcción de la parábola y del círculo, los signos de los términos en que está b levantado á una potencia de grado impar, si hubiere $-2bx^3$ en la propuesta, porque hemos supuesto (280) que en la general habia $+2bx^3$; y borramos todos los términos donde está b , si faltare el término $2bx^3$, porque entonces $b=0$; practicando lo mismo respecto de los términos en que están c , d , f ; 3.º si tomamos dichas líneas del lado de PM quando fueren positivas, y del lado opuesto si fuesen negativas. Será, pues, $AD = \pm \frac{1}{2}b$, es á saber, $-\frac{1}{2}b$ quando hubiere $+2bx^3$, y $+\frac{1}{2}b$ quando hubiere $-2bx^3$; $AB = \frac{1}{2}a + \frac{bb}{2a} \pm \frac{1}{2}c = \mp g$, es á saber, $-\frac{1}{2}c$ quando hay $+acxx$, y $+\frac{1}{2}c$ quando hubiere $-acxx$; $BE = \pm \frac{bg}{a} \mp \frac{1}{2}d$, es á saber $-\frac{bg}{a}$
quan-

Fig. quando $AB = g$, y hay $+ 2bx^3$, ó quando $AB = -g$, y hay $- 2bx^3$; y al contrario, $+\frac{bg}{a}$ quando $AB = +g$, y hay $- 2bx^3$, ó quando $AB = -g$, y hay $+ 2bx^3$: quiero decir $-\frac{bg}{a}$ quando los valores de AB , AD fueren el uno positivo y el otro negativo, y $+\frac{bg}{a}$ quando dichos dos valores fueren ambos positivos ó negativos; y tambien $+\frac{1}{2}d$ quando hubiere $-aadx$, y $-\frac{1}{2}d$ si hubiere $+aadx$; y finalmente $EM = \sqrt{(mm \mp af)}$, es á saber $+af$, si hubiere $-a^3f$, y $-af$, si hubiere $+a^3f$. De donde sacaremos la siguiente construccion geométrica que es general para todos los casos.

1121. Dada una parábola MCM , cuyo ege es la linea CG y el parámetro $= a$, y dándola á la equacion propuesta esta forma $x^4 \mp 2bx^3 \mp acxx \mp aadx \mp a^3f = 0$; tiraremos una linea AB paralela al ege CG , del qual esté á la distancia $\frac{1}{2}b$, del lado derecho de dicho ege quando hubiere $+ 2bx^3$ en la propuesta, y del lado izquierdo quando hubiere $- 2bx^3$. Por el punto A donde la linea AB encuentra la parábola, tiraremos una perpendicular AD al ege CG ; y tomaremos en dicho ege las partes $DF = \frac{1}{2}a$, $FG = 2CD$, siempre del lado opuesto á su origen C , y la parte $GK = \frac{1}{2}c$, ácia su origen C si hubiere $+ acxx$, y del lado opuesto si hubiere $- acxx$. Por los puntos determinados A , F tiraremos la recta indefinita AF , y por el punto K una perpendicular al ege, que encuentre AF en H ; en cuya perpendicular tomaremos la parte $HE = \frac{1}{2}d$, del lado derecho quando hubiere $- aadx$, y del lado izquierdo si hu-

Fig.
121.

hubiere $+ aadx$. Hecho esto, trazaremos un círculo desde el centro E , y con el radio $EM = AE$, si no estuviere en la equacion el término a^3f , esto es, quando no fuere mas que del tercer grado; pero si fuere del quarto grado, llamaremos AE , m , y tomaremos el radio $EM = \sqrt{(mm \mp af)}$, es á saber, $+af$ si hubiere $-a^3f$, y $-af$ si hubiere $+a^3f$. Finalmente desde los puntos M , donde este círculo encontrare la parábola dada, tiraremos líneas perpendiculares MQ á la AB ; serán estas perpendiculares las raíces de la equacion propuesta; siendo las raíces positivas las MQ que estuvieren del lado derecho de AB , y las negativas las que estuvieren del lado izquierdo.

Porque si prolongamos HK hasta que encuentre la AB en el punto B , será por construccion BK ó $AD = \mp \frac{1}{2}b$, es á saber $-\frac{1}{2}b$ quando hay $+2bx^3$, y $+\frac{1}{2}b$ quando hay $-2bx^3$; y por la propiedad de la parábola, $CD = \frac{bb}{4a}$. Luego DG ó $DF + FG = \frac{1}{2}a + \frac{bb}{2a}$, y DK ó $AB = \frac{1}{2}a + \frac{bb}{2a} \pm \frac{1}{2}c = \mp g$, es á saber, $-\frac{1}{2}c$ quando hay $+acxx$, y $+\frac{1}{2}c$ si hubiere $-acxx$; y el punto B estará del lado de PM quando $AB = +g$, esto es, quando fuere positivo su valor, y del lado opuesto si fuere negativo. Pero de los triángulos semejantes ADF , ABH inferiremos $DF : DA :: AB : BH$ ó $\frac{1}{2}a : \pm \frac{1}{2}b :: \mp g : BH = \pm \frac{bg}{a}$, es á saber, $+\frac{bg}{a}$ si fueren ambos positivos ó negativos los valores de AD y AB , y $-\frac{bg}{a}$ si el uno fuere positivo y el otro negativo. Por consiguiente $BE = \pm \frac{bg}{a} \pm \frac{1}{2}d$, es á saber, $-\frac{1}{2}d$ si hubiere $-aadx$, y $+\frac{1}{2}d$ si hu-

Fig. hubiere $+ aadx$; y es de notar que el punto E estará del lado de PM , quando fuere positivo el valor de BE , y del lado opuesto si fuere negativo. Luego se podrá determinar en todos los casos posibles por medio de esta construccion, el centro E del círculo, conforme conviniere.

122. Si no llevare la equacion propuesta el segundo término $2bx^3$, las líneas AB , AF coincidirían con el ege CG , de modo que los puntos A , D coincidirían con el origen C , pues $b=0$. Por consiguiente el punto G coincidiría con el punto F , y los puntos H , B con el punto K , con lo que se hace mas facil la construccion general. Porque en este caso bastaria tomar en el ege la parte $CF = \frac{1}{2}a$ siempre ácia dentro de la parábola, y la parte $FK = \frac{1}{2}c$, ácia el origen C quando hubiere $+ acxx$, y del lado opuesto si hubiere $- acxx$: tirar $KE = \frac{1}{2}d$ perpendicular al ege, del lado izquierdo si hubiere $+ aadx$, y del lado derecho si hubiere $- aadx$; y concluir lo demás como en la construccion general, teniendo presente que aqui $EC = m$.

121. Si faltare el término $acxx$, el punto K coincidirá con el punto G : si faltare el término $aadx$, el centro E del círculo estará en H .

282 Podemos dar una construccion todavia mas sencilla para las equaciones del tercer grado, con multiplicarlas por la incógnita mas ó menos la cantidad conocida del segundo término, es á saber, mas dicha cantidad, si el segundo término llevare el signo $-$; y menos dicha cantidad,

dad, si llevare el signo $+$; de donde resultará una equacion Fig. del quarto grado despojada de segundo término.

Supongamos, por egemplo, que queramos sacar las raíces de la equacion de tercer grado $x^3 - bxx + apx + aaq = 0$: la multiplicaremos por $x + b$, y resultará la equacion del quarto grado

$$x^4 + apxx + aaqx + aabq = 0 \\ - b bxx + abpx$$

que carece de segundo término. Nos valdremos, pues, de la construccion que hemos dado para esta casta de equaciones que no tienen segundo término, y resultará $CK = \frac{1}{2}a \pm \frac{1}{2}c = \frac{1}{2}a + \frac{bb}{2a} - \frac{1}{2}p$, $KE = \frac{1}{2}d = \frac{1}{2}q + \frac{bp}{2a}$, y el radio del círculo $EM = \sqrt{(mm - bq)}$; de donde sacaremos la siguiente construccion.

Tiraremos al ege CD una paralela que diste de él la cantidad b ácia la izquierda, y que encuentre la parábola en el punto A : por el origen C del ege tiraremos la recta CA , y en el punto O que está en medio de CA , levantaremos una perpendicular indefinita OG que encuentre el ege en el punto G . Tomaremos en el ege ácia su origen C la parte $GK = \frac{1}{2}p$, y despues de tirada por el punto K una perpendicular al ege, que encuentre la OG en el punto H , tomaremos en dicha perpendicular prolongada ácia H , la parte $HE = \frac{1}{2}q$, y desde el centro E , y con el radio EA trazaremos un círculo. Este círculo cortará la parábola en unos puntos M , tales que bajando desde ellos perpendiculares MQ al ege, las que estuvieren á la derecha, serán las raíces

Fig. positivas; y las que estuvieren á la izquierda, serán las raíces negativas de la equacion propuesta $x^3 - bxx + apx + aaq = 0$.

Porque si tiramos las perpendiculares AD , OL al ege; tendremos en virtud de la construccion, $AD = b$, y por la propiedad de la parábola $CD = \frac{bb}{a}$. Luego ya que CA está dividida por el medio en O , los triángulos semejantes CAD , COL darán $OL = \frac{1}{2}b$, $CL = \frac{bb}{2a}$; y de los triángulos rectángulos semejantes CLO , OLG inferiremos $CL : LO :: LO : LG$, esto es $\frac{bb}{2a} : \frac{1}{2}b :: \frac{1}{2}b : LG = \frac{1}{2}a$, y por consiguiente CK ó $CL + LG - GK = \frac{1}{2}a + \frac{bb}{2a} - \frac{1}{2}p$. A mas de esto, los triángulos semejantes GLO , CKH darán $KH = \frac{bp}{2a}$, y $KH + HE$ ó $KE = \frac{1}{2}q + \frac{bp}{2a}$, que coge ácia el lado izquierdo del ege, conforme pide la construccion quando hay $+ aadx$. Es, pues, el punto E el centro del círculo cuyas intersecciones con la parabola dada determinarán todas las raíces de la equacion del quarto grado $x^4 + apxx$ &c. Y como las raíces de esta equacion son las de la propuesta $x^3 - bxx + apx + aaq = 0$, con una negativa $AD = b$; se sigue que dicho círculo pasará por el punto A .

Tambien probaremos por medio del cálculo, que es EA el radio del círculo que se pide. Porque si tiramos EB paralela al ege, inferiremos de los triángulos rectángulos EBA , EKC , $(EA)^2 = (EB)^2 + (BA)^2$, y $(EC)^2 = (CK)^2 + (KE)^2$; hemos, pues, de probar que $(EB)^2 + (BA)^2 = (EK)^2 + (KC)^2 - bq$, una vez que ha de ser $EM = \sqrt{(mm - bq)}$. Pero si substituimos en lugar de las líneas sus valores analyticos, sacaremos las mismas cantidades, y esto

es cabalmente lo que ha de suceder, si el radio $EM = EA$. Fig.

Haremos que sea general esta construccion 1.º Si tiramos del lado izquierdo del ege la paralela que dista de él la cantidad b , si hubiere $- bxx$ en la propuesta, y del lado derecho, si hubiere $+ bxx$. 2.º Tomando en el ege $GK = \frac{1}{2}p$ del lado de su origen C quando hay $+ apx$, y del lado opuesto si hubiere $- apx$. 3.º Si tomamos $HE = \frac{1}{2}q$ del lado izquierdo si hubiere $+ aaq$, y del lado derecho si huviere $- aaq$.

283 Es de advertir 1.º que si el círculo no cortare mas que en dos puntos la parábola dada, será señal de que 123. la propuesta no tiene mas que dos raices reales si fuere del quarto grado, y no mas que una si fuere del tercer grado, siendo imaginarias las otras dos. Como el círculo no corta la parábola sino en dos puntos A, M , la equacion $x^4 + apxx - bbxx$ &c. no tiene mas raices reales que AD, MQ ambas negativas, porque están del lado izquierdo del ege. 2.º Si el círculo ni cortára ni tocára la parábola en punto alguno, las quatro raices serian imaginarias: este caso no puede suceder quando la equacion es del tercer grado, conforme lo manifiestan las construccioncs precedentes. 3.º Si la tocara en un punto, la propuesta tendrá dos raices iguales cada una de ellas á la perpendicular tirada desde dicho punto: la razon es que podemos considerar un círculo que toca una parábola, como si la cortase en dos puntos infinitamente próximos el uno al otro, que se consideran como confundidos uno con otro en el punto de contacto. En este caso se

Fig. podría reducir la equacion propuesta á otra del segundo grado por lo dicho (II. 275), y sería inutil la parábola para hallar sus raíces.

284 2.º De lo dicho (II. 242) podemos inferir, que si un círculo cortare una parábola en quatro puntos 122. M , desde los cuales se bajen perpendiculares MQ al ege CF ; la suma de las perpendiculares que estuvieren del lado derecho del ege, será igual á la suma de las que estuvieren del lado izquierdo.

Porque si tomamos en el ege de la parábola, desde su origen C ácia la parte interior de la curva, la parte CF igual á la mitad de su parámetro que llamaremos a , y desde el centro E del círculo la perpendicular EK al ege, y hacemos $FK = \frac{1}{2}c$, $KE = \frac{1}{2}d$, $(EC)^2 - (EM)^2 = af$; resultará de la construccion dada (281) que las perpendiculares MQ serán las raíces de esta equacion $x^4 - acxx + aadx + a^3f = 0$, que carece de segundo términos; siendo positivas las que están al lado derecho del ege, y negativas las que están al lado izquierdo.

Si el círculo pasára por el origen C del ege, es patente que una de las perpendiculares MQ sería nula ó cero, y habria por consiguiente al un lado del ege una perpendicular igual á las dos juntas que estuvieren al otro lado.

Si el círculo tocára la parábola en un punto, y la cortára en otros dos; se debería tomar el duplo de la perpendicular tirada desde el punto de contacto; porque (283) podríamos considerar dicho círculo, como si cortára la pará-
rá-

rábola en dos puntos infinitamente próximos, que se confundieran uno con otro en el punto de contacto. Fig.

285 3.º Como no puede haber en Geometría producto alguno de mas de tres dimensiones, pues el sólido que es la cantidad mas compuesta, no tiene mas que tres; podremos dividir, si quisiésemos, todos los términos de una equacion propuesta que pasase del tercer grado, por una línea dada qualquiera, elevada á una potencia un grado menor que el número de las dimensiones de cada uno de sus términos; esto no destruirá la equacion, pero hará que cada uno de sus términos no represente sino líneas rectas. Si la equacion de quarto grado fuese, por egemplo, $x^4 + 2bx^3 + acxx - aadx - a^3f = 0$; la dividiremos por a^3 , y resultará $\frac{x^4}{a^3} + \frac{2bx^3}{a^3} + \frac{cax}{a^2} - \frac{dx}{a} - f = 0$, cuyos términos son todos de una dimension, y representa por lo mismo cada uno de ellos una línea recta. Suele servir para practicar estas divisiones, la línea que mas veces se halla repetida en los términos de la equacion, qual es en este caso la línea a , y suele tambien omitirse, haciendo que haga officios de unidad, porque la unidad no altera la cantidad que multiplica ó divide. Asi, con hacer $a = 1$, escribiríamos $x^4 + 2bx^3 + cxx - dx - f = 0$ en lugar de $x^4 + 2bx^3 + acxx - aadx - a^3f = 0$, ó de $\frac{x^4}{a^3} + \frac{2bx^3}{a^3} + \frac{cax}{a^2} - \frac{dx}{a} - f = 0$.

286 4.º Si despues de trazado el círculo que es el lugar de la última equacion (277), se construyese una seccion cónica que sea el lugar de otra qualquiera de las equaciones que sacamos allí mismo; las in-

Fig. tersecciones de estos lugares determinarán las raíces de la equacion propuesta ; porque si por medio de sus equaciones se elimináre la incógnita y , resultará la misma equacion propuesta. De donde resulta

Que se podrá construir dicha equacion 1.º por medio de un círculo y de una hypérbola equilátera , para cuyo fin servirán la séptima y sexta equacion (277). 2.º Por medio de un círculo y de una elipse cuyo ege paralelo á AP esté con su parámetro en la razon de $a : c$, para cuyo fin servirán la séptima y tercera equacion. 3.º Por medio de un círculo y de una hypérbola cuyo ege paralelo á AP tenga con su parámetro la razon de $aa : bb$, para cuyo fin servirán la séptima y quarta equacion. Y como es arbitraria la linea a que sirve para reducir á ac todas las cantidades que multiplican xx ; á aad las que multiplican x ; y finalmente á a^3f las cantidades enteramente conocidas ; se sigue que tomando en lugar de a una infinidad de lineas de diferentes tamaños, se podrá construir la propuesta por medio de una infinidad de círculos y elipses , ó hypérbolas equiláteras y no equiláteras , todas distintas unas de otras.

Hemos visto (281) que si tomamos en lugar de la unidad arbitraria a el parámetro del ege de una parábola dada , se puede construir la equacion propuesta por medio de un círculo y de la parábola dada , para cuyo fin nos valdremos de la primera y séptima equacion. Ahora probaremos como determinando la espresada linea a de cierto modo , se podrá construir la equacion propuesta por medio de un círculo

círculo y de una elipse, ó una hypérbola semejante á una Fig.
 elipse ó hypérbola dada. Porque una vez que, segun supo-
 nemos, es dada la razon de sus eges, será tambien dada la
 razon del ege paralelo á AP con su parámetro. Por consi-
 guiente, si llamamos dicha razon dada $\frac{n}{m}$; tendremos, quan-
 do se tratare de la elipse, $\frac{c}{a} = \frac{n}{m}$, y por lo mismo $aa = \frac{acm}{n}$;
 de donde resulta que si se toma en lugar de la unidad arbi-
 traria a , la raiz de un quadrado aa igual (II. 2 o 3) á una
 cantidad conocida ac que multiplica xx en la equacion pro-
 puesta, y está multiplicada por $\frac{m}{n}$, se construirá la equacion
 por medio de un círculo y de una elipse, cuyo ege paralelo
 á AP tendrá con su parámetro la razon de m á n , pues $\frac{n}{m}$
 $= \frac{c}{a}$, para cuyo fin servirán la séptima y tercera equacion.
 Pero quando se tratare de la hypérbola, tendremos $\frac{n}{m} =$
 $\frac{bb}{aa}$, y por consiguiente $a = b\sqrt{\frac{m}{n}}$; por donde se echa de
 ver que si en lugar de la unidad arbitraria a tomáramos este
 valor, y construyéramos la equacion por medio de la sépti-
 ma y quarta equacion, el ege paralelo á AP de la hypérbo-
 la, que es el lugar de la quarta, será á su parámetro como m
 es á n , por ser $\frac{n}{m} = \frac{bb}{aa}$.

*Satisfacese un reparo muy sustancial acerca del método que
 acabamos de proponer para la construccion geométrica
 de las Equaciones.*

287 De lo que hemos dicho (276) podria infe-
 rirse que es arbitraria la eleccion de la una de las dos
 equaciones indeterminadas que sirven para construir una

Fig. equacion propuesta. Pero no lo es del todo, por el riesgo que se corre de que sean imaginarias las intersecciones que determinan las raices de la equacion que se ha de construir. Para esta construccion solo sirven líneas que tengan abscisas reales correspondientes á las ordenadas que son las raices de la equacion, ú ordenadas reales correspondientes á las abscisas que son las raices de la equacion propuesta. Porque de otro modo sucederá que las intersecciones que deberian determinar dichas raices serán imaginarias, y no se logrará el intento.

288 Es pues muy importante enseñar como se ha de precaver este inconveniente. Para cuyo fin es de advertir que si se busca generalmente en qué puntos se encuentran dos líneas algebraicas cuyas equaciones son dadas; se ha de considerar que quando dos líneas se encuentran tienen en el punto comun una abscisa y una ordenada comun. Por consiguiente, si fueran x é y las coordenadas de la una de las dos líneas, y z y u las coordenadas de la otra, en cada punto de concurso se verificarían las quatro equaciones siguientes: 1.º $x = z$, 2.º $y = u$. 3.º la equacion de la primera línea en x, y y constantes. 4.º la equacion de la segunda línea en z, u y constantes. Se podrá pues por medio de las dos primeras equaciones substituir en la quarta x en lugar de z , é y en lugar de u . Resultarán dos equaciones en x, y y constantes, que serán las de las dos líneas propuestas; y valiendose de ellas para eliminar y , resultará una equacion en x y constantes, cuyas raices x

espresarán todas las abscisas que corresponden á los puntos de concurso de ambas líneas. Y si por medio de dichas dos equaciones elimináramos x , sacaríamos una equacion en y y constantes, cuyas raíces y serían todas las ordenadas correspondientes á los puntos de concurso.

Para determinar estos puntos, sería preciso buscar la abscisa y la ordenada de cada punto de concurso, indagando por medio de una y otra equacion, qué ordenadas corresponden á las abscisas que lo son de los puntos de concurso; ó, si acomodáramos mas, se buscaría qué abscisas corresponden á las ordenadas que la equacion en y y constantes dá como ordenadas pertenecientes á los puntos de concurso. Con esto se sabría de fijo quales puntos son comunes á las dos curvas, esto es, quales son verdaderamente los puntos de concurso.

289 Esto sería muy preciso, porque aunque sea cierto que para cada punto de concurso hay una raíz x en la equacion de x y constantes, y una raíz y en la equacion de y y constantes; no podemos inferir recíprocamente que para cada raíz x , ó cada raíz y haya un punto de concurso. La razon es, que cada raíz x solo está diciendo que con una misma abscisa las dos líneas tienen una misma ordenada, pero no manifiesta si las dos ordenadas son reales. El cálculo no dice que las dos líneas concurren, sino que la abscisa y la ordenada son iguales, cuya igualdad puede verificarse entre cantidades imaginarias igualmente que entre cantidades reales. En cu-

Fig. yo caso podemos decir que á dichas abscisas comunes corresponden intersecciones imaginarias, que el cálculo averigua del mismo modo que las reales. Lo propio puede suceder respecto de las raíces y . Pero el cálculo que para esta comprobacion se habria de egecutar, sería penoso y en muchos casos impracticable.

290 Quando x ó y no pasa del primer grãdo en la una de las dos equaciones; si se hallare, por egemplo, y en este caso, es constante que á cada abscisa no corresponde mas que una ordenada, que por lo mismo jamás podrá ser imaginaria, por no haber cantidad ninguna radical en su espresion. Por lo mismo, cada raiz real de la equacion de x y constantes señala un punto de concurso real y no imaginario. Si fuese x la que no pasare del primer grado en la una de las dos equaciones propuestas; será cierto que á cada raiz real de la equacion de y y constantes corresponderá un punto de concurso real.

Sirvan de egemplo estas dos equaciones $yy + 2ax = 0$, y $yy + 4xx - 10ax - 16aa = 0$. Si eliminamos y sacaremos $4xx - 12ax - 16aa = 0$, que tiene dos raíces ambas reales, $x = 4a$, y $x = -a$. Substituyamos ahora la primera raiz $4a$ en lugar de x en las dos equaciones propuestas; se transformarán en $yy + 8aa = 0$, que no tiene mas que dos raíces imaginarias $y = +4a\sqrt{-2}$ é $y = -4a\sqrt{-2}$. A la abscisa $4a$ corresponden en cada curva dos ordenadas iguales. De esto no se puede inferir que hay dos intersecciones, porque

son

son imaginarias las dos ordenadas, y las intersecciones lo son tambien. Substituyamos ahora en las equaciones propuestas la segunda raíz $-a$ en lugar de x ; ambas se transformarán en $yy - 2aa = 0$, que tiene dos raíces reales $y = +a\sqrt{2}$, $y = -a\sqrt{2}$. Luego la abscisa $-a$ tiene en cada curva dos ordenadas reales é iguales, la una positiva y la otra negativa, que dán por consiguiente dos puntos de interseccion reales, el uno mas arriba y el otro mas abajo de la linea de las abscisas.

291 En otros muchos casos sucede lo mismo que en este; es á saber, que una sola abscisa, ó una sola ordenada dá muchos puntos de interseccion. Es muy posible que una misma abscisa tenga en ambas lineas muchas ordenadas, entre las cuales haya mas de una comun á las dos curvas. En este caso habrá mas intersecciones que raíces reales en la equacion de x y constantes, pues una sola y misma raíz dá mas de una interseccion.

Supongamos que sean $yy + xx - aa = 0$, é $yy + \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2 xx - (a-b)^2 = 0$ las dos equaciones propuestas; si eliminamos y , sacaremos esta equacion $4axx - (2a-b)(a+b)^2 = 0$, que no tiene mas que dos raíces $+ \frac{a+b}{2a} \sqrt{(2aa-ab)}$, y $- \frac{a+b}{2a} \sqrt{(2aa-ab)}$. Se equivocaría el que formára juicio de que no se encuentran mas que en dos puntos las dos curvas que las dos equaciones propuestas representan. Porque á cada raíz x corresponden dos intersecciones, como es facil verificarlo substituyendo en cada equacion en lugar de x sus valores. Si substitui-

tui-

Fig. tuimos el primero $+ \frac{a+b}{2a} \sqrt{(2aa - ab)}$, sacáremos $yy - \frac{2aa+ab}{4aa} (a-b)^2 = 0$, que tiene dos raíces reales, es á saber, $+ \frac{a-b}{2a} \sqrt{(2aa + ab)}$, y $- \frac{a-b}{2a} \sqrt{(2aa + ab)}$. Luego á la abscisa positiva $x = + \frac{a+b}{2a} \sqrt{(2aa - ab)}$ corresponden dos intersecciones, la una mas arriba y la otra mas abajo del ege de las abscisas. Tambien corresponden otras dos á la abscisa negativa $x = - \frac{a+b}{2a} \sqrt{(2aa - ab)}$; con lo que son quatro en todo las intersecciones.

292 Todo esto presupuesto, supongamos que queramos construir, por egeemplo, la equacion $x^4 + 15a^3x + 14a^4 = 0$, y queramos conseguirlo introduciendo y , por medio de estas dos equaciones $x^3 - ayy = 0$, y $xyy + 15a^2x + 14a^3 = 0$ que, con eliminar y , dán la misma equacion $x^4 + 15a^3x + 14a^4 = 0$. Si tomáramos AB y AD por los dos eges, hallaríamos que la equacion $x^3 - ayy = 0$ dá la curva EAF que del lado de las abscisas positivas tiene dos ramos iguales y semejantes, al uno y al otro lado del ege de las abscisas, pero que del lado de las abscisas negativas no tiene ramo alguno, por ser imaginarias todas las ordenadas $y = \sqrt{\frac{x^3}{a}}$, quando son negativas las abscisas x . Hallaríamos al contrario que la equacion $xyy + 15a^2x + 14a^3 = 0$ representa una curva GCH , que está toda entera del lado de las abscisas negativas, porque x positiva dá la imaginaria $y = \sqrt{(-\frac{15a^2x+14a^3}{x})}$. Por consiguiente, no se podrán encontrar estas dos curvas EAF, GCH . Pero no por esto hemos de inferir que la equacion $x^4 + 15a^3x + 14a^4 = 0$ no tie-

ne

ne sino raíces imaginarias; porque sabemos que á intersec- Fig.
ciones imaginarias pueden corresponder raíces reales (289).
Y de hecho, si buscamos las ordenadas que en ambas cur-
vas corresponden á la abscisa $-a$; hallaremos que son
iguales una con otra, é iguales á $\pm a\sqrt{-1}$. Luego la abs-
cisa $x = -a$, ó por mejor decir la equacion $x + a = 0$,
es una raíz de $x^4 + 15a^3x + 14a^4 = 0$. Si buscá-
mos tambien las ordenadas de la abscisa $-2a$, hallaría-
mos en cada curva $\pm 2a\sqrt{-2}$. Por consiguiente, la abs-
cisa $-2a$ tiene en ambas curvas una misma ordenada, bien
que imaginaria, y dicha abscisa $x = -2a$, ó por mejor
decir $x + 2a = 0$, es tambien una raíz real de la equa-
cion $x^4 + 15a^3x + 14a^4 = 0$.

Por consiguiente el número de las intersecciones rea-
les de dos líneas puede ser menor que el número de las
raíces reales de la equacion que por medio de las dos lí-
neas se quiere construir.

293 Pero tambien puede suceder que el número de
las intersecciones de dos líneas sea mayor que el número
de las raíces de la equacion; porque puede suceder que
muchas intersecciones no den mas que una raíz, y esto
sucede quando muchos puntos de concurso no tienen mas
que una misma ordenada, ó una misma abscisa.

Supongamos, por exemplo, que hayamos de construir
la equacion $x^4 - 15a^3x + 14a^4 = 0$ con las dos equa-
ciones indeterminadas $x^3 - ayy = 0$, y $xyy - 15a^2x +$
 $14a^3 = 0$, que reproducen la equacion propuesta con eli-
mi-

Fig. minar y . La primera $x^3 - ayy$ de estas dos equaciones dá, 125. como antes, la curva EAF que está toda del lado de las abscisas positivas. Pero la segunda equacion $xyy - 15a^2x + 14a^3 = 0$ representa una curva compuesta de tres porciones separadas GBH , IK , ik . Las dos últimas están del lado de las abscisas negativas, y la primera del lado de las abscisas positivas. Si consideramos con algun cuidado la equacion $xyy - 15a^2x + 14a^3 = 0$, ó $yy = \frac{15a^2x - 14a^3}{x}$, hallaremos que el ege de las abscisas divide la porcion GBH en dos ramos iguales y semejantes, que salen desde el punto B extremo de la abscisa $AB = \frac{14}{15}a$: que á una abscisa positiva menor que AB no corresponden mas que ordenadas imaginarias; pero que empezando en B , quanto mas crecieren las abscisas, tanto mas crecerán tambien las ordenadas, sin que lleguen jamás á ser mayores que $a\sqrt{15}$, á la qual no llegan á ser iguales las ordenadas, sino quando la abscisa es infinita. La curva GBH encuentra la curva EAF en quatro puntos M , N , n , m . No por esto hemos de concluir que la equacion $x^4 - 15a^3x + 14a^4 = 0$ tiene quatro raices reales. Porque las intersecciones M , m , bien que tengan dos ordenadas $MP = 2a\sqrt{2}$, y $mP = -2a\sqrt{2}$, no tienen mas que una sola abscisa $AP = x = 2a$; y las intersecciones N , n , bien que tengan dos ordenadas $NQ = +a$, y $nQ = -a$, no tienen mas que una sola abscisa $AQ = x = a$. Por lo que, las quatro intersecciones M , N , n , m no dán mas que dos raices; es á saber, $x - 2a = 0$, y $x - a = 0$. Y la equacion $x^4 - 15a^3x + 14a^4 = 0$ no tiene mas raices rea-

reales. Porque si la dividimos por $x - 2a = 0$, y el co- Fig.
 ciente por $x - a = 0$, ó si de una vez dividimos dicha
 equacion por el producto $(x - 2a)(x - a) = 0 = xx -$
 $3ax + 2aa$, será el cociente la equacion $xx + 3ax + 7aa$
 $= 0$, que no tiene mas que dos raices imaginarias que son
 $3a + \frac{1}{2}a\sqrt{-19}$, y $3a - \frac{1}{2}a\sqrt{-19}$.

294 Se precave el inconveniente de que sean mas ó
 menos las intersecciones que las raices reales de la equacion
 que se ha de construir, tomando para esto dos equaciones,
 tales que en la una no haya mas que la primera potencia de
 la variable y que se ha de eliminar. Porque en virtud de
 esto, esta variable que espresa las ordenadas de las lineas cu-
 ya interseccion ha de construir la equacion, no tiene mas
 de un valor en la equacion donde no lleva mas que la prime-
 ra potencia, cuyo valor no puede ser imaginario. Luego á
 cada x real corresponde una sola y , pero real. Habrá por
 consiguiente tantas intersecciones cabalmente (290)
 quantas raices reales.

Para aclarar todo esto con un egemplo, volvamos á con-
 siderar las equaciones (292 y 293) $x^4 + 15a^3x +$
 $14a^4 = 0$, y $x^4 - 15a^3x + 14a^4 = 0$, y en lugar de
 valernos para construirlas de la equacion $x^3 - ayy = 0$,
 valgámonos de $xx - ay = 0$, en que no pasa y del primer
 grado. Substituyamos en el primer término de las propues-
 tas ay en lugar de xx ; y se transformarán en $aayy + 15a^3x$
 $+ 14a^4 = 0$, y $aayy - 15a^3x + 14a^4 = 0$, ó di-
 vidiendo por aa , en $yy + 15ax + 14a^2 = 0$, y

yy

Fig. $yy - 15ax + 14a^2 = 0$. Construiremos pues la primera equacion $x^4 + 15a^3x + 14a^4 = 0$ por medio de las intersecciones de las curvas que están cifradas en las dos equaciones $xx - ay = 0$, y $yy - 15ax + 14aa = 0$; y la segunda equacion $x^4 - 15a^3 + 14a^4 = 0$ por medio de las intersecciones de las curvas cifradas en las dos equaciones $xx - ay = 0$, y $yy - 15ax + 14aa = 0$.

La primera equacion $xx - ay = 0$ representa una
 126. curva CAM compuesta de dos ramos iguales y semejan-
 127. tes AC , AM , que saliendo del origen A se extienden al infinito ácia la derecha y ácia la izquierda mas arriba del ege de las abscisas.

126. Si con esta curva combinamos la curva EBM cifrada en la equacion $yy + 15ax + 14aa = 0$, que tambien consta de dos ramos iguales y semejantes BM , BE , que salen del extremo B de la abscisa $AB = -\frac{14}{15}a$, y se extienden al infinito ácia la izquierda, mas arriba y mas abajo del ege de las abscisas; las intersecciones M , N de las dos curvas CAM , EBM darán las dos raices de la equacion $x^4 + 15a^3x + 14a^4 = 0$. Bajando las ordenadas MP , NQ , tendremos las abscisas $AP = -2a$, y $AQ = -a$, que dán á conocer las raices $x = -2a$, y $x = -a$, ó $x + 2a = 0$ y $x + a = 0$ de dicha equacion. Y como no tiene mas que estas dos raices reales, las curvas CAM , EBM no se encontrarán sino en dichos dos puntos M y N .

127. Pero si con la curva CAM cifrada en la equacion $xx - ay$

$ay = 0$, combinamos la curva EBM cifrada en la equa- Fig.
 cion $xy - 15ax + 14aa = 0$, que no se distingue de la
 curva EBM de la figura antecedente, sino en que aquella
 está á la izquierda, y esta á la derecha, pues las dos equa-
 ciones no se diferencian sino por el signo de x : sacaremos
 las raices reales de la equacion $x^4 - 15a^3x + 14a^4 = 0$.
 Si bajamos desde los puntos de interseccion M, N las orde-
 nadas MP, NQ , tendremos las abscisas $AP = 2a$, y AQ
 $= a$, que manifiestan las raices reales $x = 2a$ y $x = a$, ó
 $x - 2a = 0$, y $x - a = 0$ de dicha equacion. Y en este
 caso como en el antecedente hay tantas intersecciones co-
 mo raices reales, ni mas ni menos.

Resolucion de algunas cuestiones indeterminadas.

295 Cuestion I. *Dados dos puntos A y B, hallar 128.*
otro punto M, tal que tirando las rectas MA, MB, estén
siempre una con otra en la razon de a: b.

I. Como la cuestion no hace mencion de ángulo nín-
 guo dado tiraremos por el punto M , que suponemos ser
 uno de los que se piden, la MP perpendicular á AB , por
 ser mas acomodado el ángulo recto; llamaremos AP, x ;
 PM, y ; AB, c ; y de los triángulos rectángulos APM ,
 BPM sacaremos $(AM)^2 = xx + yy$, $(BM)^2 = cc -$
 $2cx + xx + yy$. Pero por la cuestion $(AM)^2 : (BM)^2 :: aa :$
 bb , ó $xx + yy : cc - 2cx + xx + yy :: aa : bb$. De
 aquí sacaremos despues de multiplicados los extremos y los
 medios, y dividiendo por $bb - aa$, esta equacion $yy +$

Fig. $xx + \frac{2aacc}{bb-aa} - \frac{aacc}{bb-aa} = 0$, en que están cifradas las condiciones de la cuestion, y cuyo lugar se construye por lo dicho (2 5 2) del modo siguiente.

1 2 8. En la AP tomaremos la parte $AC = \frac{aac}{bb-aa}$ del lado opuesto á PM ; y desde el centro C , y con el radio CD ó $CE = \frac{abc}{bb-aa}$ trazaremos la circunferencia de un círculo; y su porcion DMO comprendida dentro del ángulo PAO , que forman la linea AP y la recta AO tirada paralelamente á PM y del mismo lado, será el lugar de la equacion que hemos sacado.

Porque si por uno qualquiera M de sus puntos tiramos MP perpendicular á AB , la propiedad del círculo dará $(CD)^2 - (CP)^2$ ó $EP \times PD = (PM)^2$, esto es, la misma equacion que hemos hallado, con tal que en lugar de las lineas se substituyan sus valores analíticos.

Si los puntos M estuvieran dentro del ángulo EAR opuesto al vértice al ángulo BAO , sacaríamos con hacer $AP = -x$, y $PM = -y$, la misma equacion que antes, así por la condicion de la cuestion, como por la propiedad de la porcion RME de la misma circunferencia que hemos trazado; de donde resulta que dicha porcion será el lugar de todos los puntos M , quando estuvieren dentro del ángulo RAE . Y si supusiéramos finalmente que los puntos M estuvieran dentro del ángulo BAR , y despues dentro del ángulo EAO , hallaríamos (con hacer $PM = -y$ quando estuvieren del otro lado de la linea AB ; y $AP = -x$, quando cayere el punto P del

otro

otro lado del punto fijo A) que las porciones DR , EO Fig. de la misma circunferencia serían los lugares de dichos puntos, y por consiguiente toda la circunferencia cuyo diámetro es DE , será el lugar cabal de todos los puntos M .

II. Discurriendo del mismo modo que en el primer caso, sacaremos esta equacion $yy + xx - \frac{2aa\,cx}{aa-bb} + \frac{aac\,c}{aa-bb} = 0$, cuyo lugar construiremos como sigue.

En la AP tomaremos la parte $AC = \frac{aac}{aa-bb}$ del lado de PM ; y desde el centro C , con el radio CD ó $CE = \frac{abc}{aa-bb}$ trazaremos un círculo. Su circunferencia será el lugar de todos los puntos M . Se prueba del mismo modo. 129.

Si se repara en estos dos casos que la circunferencia cuyo diámetro es DE , y que es el lugar de todos los puntos M , ha de cortar la línea AB en dos puntos D , E , tales que $AD:DB::a:b$, y $AE:EB::a:b$; pues quando el punto M coincide con D , la recta AM es AD , y $BM = BD$; y tambien quando el punto M cae en E , la recta AM es AE , y BM es BE ; se abreviarán mucho las construcciones precedentes. Porque se viene á los ojos que si dividimos la AB , prolongada ácia el lado que fuere menester, en dos puntos D , E , tales que $AD:DB::a:b$, y $AE:EB::a:b$; la línea DE será en ambos casos el diámetro del círculo que resuelve la cuestion.

III. Una vez que $a = b$, la equacion hallada se transformará en este caso en estotra $x = \frac{1}{2}c$; por consiguiente, si tomamos (29) AP igual á la mitad de AB , y tiramos la recta PM perpendicular á AB , la línea PM , 130.


Fig. indefinitamente prolongada por ambos lados, será el lugar de todos los puntos M .

131. 296 Cuestion II. Dadas de posicion dos rectas DE , DN , indefinitamente prolongadas al uno y al otro lado del punto N , y un punto C fuera de dichas lineas; imaginemos que el vertice de un ángulo dado CEM se mueva á lo largo de DE , de modo que su lado EC que encuentra DN en N , pase siempre por el mismo punto C , y que el otro lado EM sea siempre tercero proporcional á NC , CE . ¿Qual será el lugar de todos los puntos M ?


Tírense CA paralela á DN , y CB que forme en el punto B con la DE un ángulo igual al ángulo dado CEM , del lado que fuere menester, á fin de que coincidiendo CE con CB , la recta EM coincida con DE . Esto supuesto, pueden ocurrir tres casos: 1.º quando el vértice E del ángulo dado CEM se mueve en la recta DE del otro lado del punto B respecto de A : 2.º quando se mueve entre los puntos B , A : 3.º ó del otro lado del punto A respecto de B .

I. Quando el vértice E se mueve sobre la línea DE del otro lado del punto B respecto de A . Tirarémos del lado del punto C la línea AQ que forme con DE en el punto A el ángulo BAQ igual al ángulo ABC ; tirarémos por uno de los puntos M que se piden y mirarémos como dado, la MP paralela á AQ , y que encuentre DE en P ; de donde resultarán dos triángulos semejantes CBE , EPM ; porque cada uno de los dos ángulos CBE , EPM


121




122




123




124




125




126




127




128




129



130





es igual al ángulo dado CEM , y son tambien iguales uno con otro los ángulos BCE , PEM ; porque en el triángulo CBE el ángulo esterno CEP ó $CEM + PEM$ vale tanto como los dos internos opuestos juntos BCE y CBE ó CEM .

Fig.

Sentado esto, llamaremos AD , a ; AB , b ; BC , c ; AP , x ; PM , y ; AE , z ; y así de las paralelas DN , AC , como de la condicion de la cuestion inferiremos $AD:AE::CN:CE::CE:EM::CB:EP::BE:PM$; esto es, $a:z::c:x-z::z-b:y$; de donde sacaremos, multiplicando los extremos y medios, estas dos equaciones $ax - az = cz$, $ay = zz - bz$, que con hacer para abreviar, $f = a + c$, y eliminar z , se reducen á estotra $xx - \frac{bf}{a}x - \frac{ff}{a}y = 0$ que no lleva mas que dos incógnitas x é y , y cuyo lugar, que es el que se pide, se construye (240) del modo siguiente.

En la linea AP tomaremos la recta $AF = \frac{bf}{2a}$ del lado de PM ; y tirando FL paralela á PM , tomaremos en dicha linea del lado opuesto á PM la parte $FG = \frac{bb}{4a}$. Con el diámetro GL cuyo origen sea el punto G , el parámetro $GH = \frac{ff}{a}$, y las ordenadas sean rectas LM paralelas á AP , trazaremos una parábola que coja ácia PM . La porcion indefinita OM de esta curva que está dentro del ángulo PAQ , será el lugar de todos los puntos M .

Porque si por uno qualquiera M de sus puntos tiramos la MQ paralela á AP , que encuentre en L el diámetro CL , será ML ó $PF = x - \frac{bf}{2a}$, $GL = y + \frac{bb}{4a}$, y por

Tom.III.

O 3.

la

Fig. la propiedad de la parábola $(ML)^2 = LG \times GH$, esto es,
 131. $xx - \frac{bf}{a}x + \frac{bbff}{4aa} = \frac{ff}{a}y + \frac{bbff}{4aa}$, que despues de las transposiciones correspondientes se reduce á $xx - \frac{bf}{a}x - \frac{ff}{a}y = 0$, que es la equacion propuesta.

II. Quando el vértice E anda la parte BA . En este caso es evidente que los puntos M estarán del otro lado de DE , porque el ángulo dado CEM siempre será mayor que el ángulo CEP que vá menguando continuamente. Por este motivo será $PM = -y$; y como discurriendo del mismo modo que antes, sacaríamos la misma equacion, se infiere que la porcion AGO de la parábola que hemos trazado, será el lugar de todos los puntos M , porque sacaríamos tambien la equacion propuesta.

III. Quando el vértice se mueve del otro lado del punto A respecto del punto B . Es tambien evidente que todos los puntos M han de estar debajo de la linea DE ; y hallaremos del mismo modo que en el primer caso $AD:AE::CN:CE::CE:EM::CB:EP$, y por consiguiente $AD:CB::AE:EP$. De donde se echa de ver que EP será mayor, menor ó igual á EA , segun fuere CB mayor, menor ó igual á AD ; y que por lo mismo si prolongamos AQ mas ábajo de DE ácia K , todos los puntos M estarán dentro del ángulo BAK en el primero de estos tres casos, dentro de su suplemento DAK en el segundo, y finalmente sobre la recta AK en el tercero. Suponemos aquí que CB sea mayor que AD ; y como de hacer $PM = -y$, por caer del otro lado de AP , no resulta la mis-

misma equacion que en el primer caso, no nos pararemos en su construccion. Por lo que, llamando como siempre AP , x ; PM , y , sacarémos esta equacion $xx + \frac{bg}{a}x - \frac{gg}{a}y = 0$, en la qual $g = c - a$, cuyo lugar es una porcion indefinita AM de una parábola distinta de la precedente, que coge ácia el lado opuesto, y se construye (240) como sigue.

En la línea AP , y del otro lado de PM tomarémos la parte $AS = \frac{bg}{2a}$; tirarémos $ST = \frac{bb}{4a}$ paralela á AQ , del lado opuesto á PM ; con el diámetro TS , cuyo origen sea T , el parámetro una línea $= \frac{gg}{a}$, y las ordenadas sean rectas paralelas á AP , trazarémos una parábola que coja ácia PM . Su porcion indefinita AM que está dentro del ángulo PAK , será el lugar de todos los puntos M en este último caso, en que suponemos que CB es mayor que AD . 131.

Es pues evidente que el lugar de todos los puntos M se compone de dos porciones indefinitas de diferentes parábolas, cogiendo la una $AGOM$ ácia C , y la otra AM ácia el lado opuesto, y ambas salen de un mismo origen A ; porque como el lado CE del ángulo dado CEM coincide con CA paralela á DN , es evidente que CN llega á ser infinita, y que por lo mismo EM es nula ó cero, porque siempre se verifica que $NC : CE :: CE : EM$, quiero decir que el punto M se confunde con el punto E que coincide con D . Por donde se echa de ver que AF es una ordenada al diámetro FG , y AS una ordenada al diámetro ST ; de donde sacaremos la construccion siguiente que es general.

Fig. En la linea indefinita AP al uno y otro lado del punto
 131. B , tomaremos las partes BO , BR cada una igual á la quarta proporcional á las tres lineas DA , AB , BC ; por los puntos F , S que están en medio de AO y AR respectivamente, tiraremos las rectas FG , ST paralelas á AQ , cada una igual á la tercera proporcional á $4AD$ y AB ; es á saber, FG del lado opuesto al punto C , y ST del mismo lado. Hecho esto, trazaremos dos parábolas distintas, siendo GF el diámetro de la una, y FA su ordenada; y TS el diámetro de la otra, y su ordenada SA : sus porciones indefinitas $MAGOM$ serán el lugar cabal de todos los puntos M .

Porque BO ó $BR = \frac{bc}{a}$, y por lo mismo AF ó $\frac{1}{2}AO = \frac{1}{2}b + \frac{bc}{2a} = \frac{bf}{2a}$; y AS ó $\frac{1}{2}AR = \frac{bc}{2a} - \frac{1}{2}b = \frac{bg}{2a}$. Luego &c.

Observemos de paso, que si el ángulo dado, cuyo vértice se mueve á lo largo de DE , fuese igual al suplemento del ángulo CEM , sin haber en lo demás variacion alguna: quiero decir, que los puntos M estuviesen en la linea EM prolongada al otro del punto E : el lugar de todos los puntos M serian las porciones restantes de las dos parábolas que acabamos de trazar.

297 Cuestion III. Dada de posicion una recta indefi-
 132. nita AP , con dos puntos fijos A , C , el uno en dicha recta y el otro fuera; trácese una parábola AM , cuyo parámetro sea una linea qualquiera, y el ege la linea AP cuyo origen esté en A ; y desde el punto dado C tírese una perpendicular CM á dicha parábola. Se pide el lugar de todos los puntos M , que
 son

son infinitos, pues con mudar continuamente el parámetro se podrán trazar una infinidad de parábolas distintas, que todas tendrán el mismo eje AP , cuyo origen estará en A . Fig. 132.

Por el punto dado C tiraremos la CB perpendicular á AP , y por uno de los puntos M , las rectas MP , MK paralelas á BC , AP , y la tangente MT . Llamaremos AB , a ; BC , b ; AP , x ; PM , y , y será $CK = b - y$, $MK = a + x$. Como por la cuestion el ángulo CMT es recto, los triángulos rectángulos TPM , CKM serán semejantes, porque si de los ángulos rectos CMT , KMP restamos el mismo ángulo KMT , los residuos CMK , TMP serán iguales. Luego $TP : PM :: CK : KM$ ó (63 y 64) $2x : y :: b - y : a + x$; de donde sacaremos $yy - by + 2xx + 2ax = 0$, cuyo lugar es (252) una elipse que construiremos (254) del modo siguiente.

Tiraremos $AD = \frac{1}{2}b$ perpendicular á AP del lado de PM , y la recta indefinita DL paralela á AP , y tomaremos en esta linea la parte $DE = \frac{1}{2}a$ del lado opuesto á PM , y al uno y otro lado del punto E las partes EF , EG iguales ambas á $\sqrt{(\frac{1}{4}aa + \frac{1}{8}bb)}$. Despues de esto trazaremos con el eje FG , cuyo parámetro sea una linea GH dupla de FG , una elipse. Su porcion AMO que está dentro del ángulo PAD , será el lugar de la equacion hallada, y de todos los puntos M , quando estuvieren dentro del expresado ángulo.

Porque con prolongar PM , si fuere menester, hasta que se encuentre con el eje FG en L , será la ordenada ML

Fig. $\equiv \frac{1}{2}b - y$, y $EL \equiv \frac{1}{2}a + x$, y por la propiedad de la
 132. elipse $FL \times LG \text{ ó } (EF)^2 - (EL)^2 : (LM)^2 :: FG : GH ::$
 $1 : 2$, esto es $\frac{1}{8}bb - ax - xx : \frac{1}{4}bb - by + yy :: 1 : 2$,
 que dá $\frac{1}{4}bb - 2ax - 2xx \equiv \frac{1}{4}bb - by + yy$.

Si supusiéramos que los puntos M están dentro de los
 ángulos BAD , BAR , hallaríamos la misma equacion que
 antes, así por la cuestion, como por la propiedad de la elip-
 se, previniendo que habríamos de hacer $AP \equiv -x$, y
 $PM \equiv -y$, quando el punto P cayese del otro lado del
 origen A y PM del otro lado de la linea AP . Por consi-
 guiente, las porciones de la elipse trazada que estuvieren
 dentro de dichos ángulos, serán el lugar de dichos puntos.

Es de reparar que ninguno de los puntos M puede estar
 dentro del ángulo PAR opuesto al vértice al ángulo BAD
 dentro del qual está el punto dado C , desde el qual han de
 salir todas las perpendiculares á las parábolas. Porque si des-
 de un punto qualquiera de los que están dentro del ángulo
 PAR , tiramos rectas como MP , MT perpendiculares á
 AP y CM , es evidente que los puntos PT caerán del mis-
 mo lado del punto A , y por consiguiente que la linea
 MT no podrá ser tangente en M conforme requiere la
 cuestion.

Si supusiéramos $AP \equiv x \equiv 0$, la equacion antece-
 dente $yy - by + 2xx + ax \equiv 0$, se transformaría en
 estotra $yy - by \equiv 0$, cuyas raices son $y \equiv 0$, é $y \equiv b$;
 de donde resulta que si tiráramos AO paralela é igual á BC ,
 el lugar de los puntos M pasaria por los dos puntos A , O .

Del

Del mismo modo harémos patente , que si el punto P estuviera del otro lado del origen A , é hiciéramos $AP = -x = AB = a$, el espresado lugar pasaria por los puntos B, C : por manera que la elipse se ha de trazar al rededor del rectángulo $ABCO$. Fig.

298 Cuestion IV. Imaginemos una infinidad de *hypérbolas*, tales que las *asýmtotas* de todas ellas sean las mismas rectas AP, AO , dadas de posicion, que forman una con otra un ángulo recto PAO ; y concibamos que desde un punto dado C salgan una infinidad de perpendiculares como CM á dichas *hypérbolas*. ¿Cuál será el lugar de todos los puntos M , donde cada una de dichas rectas CM encuentra la *hypérbola* á la qual es perpendicular?

Tirarémos las mismas líneas que en la cuestion antecedente, las nombrarémos con las mismas letras, y sacarémos del mismo modo esta proporcion $TP : PM :: CK : KM$, ó (177) $x : y :: b - y : a - x$, de donde sale esta equacion $yy - by - xx + ax = 0$, cuyo lugar (260 y 265) trazarémos como sigue.

En la *asýmtota* AO paralela á PM , tomarémos la parte $AD = \frac{1}{2}b$, y tirarémos DL paralela á AP ; tomarémos en dicha línea la parte $DE = \frac{1}{2}a$ del lado de PM , y al uno y otro lado del punto E las partes EF, EG ambas iguales á $\sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - \frac{1}{4}bb\right)}$ ó $\sqrt{\left(\frac{1}{4}bb - \frac{1}{4}aa\right)}$, segun fuere a mayor ó menor que b . Hecho esto, trazarémos con la línea FG , como primer ege en el primer caso, y como segundo en el otro caso, dos *hypérbolas* opuestas equiláteras. Sus por-

Fig. porciones comprendidas dentro del ángulo PAO serán el lugar de dicha equacion, y por consiguiente el de todos los puntos M .

Porque con prolongar PM , si fuere menester, hasta que encuentre el eje FG en L , tendremos la ordenada $ML = \frac{1}{2}b - y$, y la parte $EL = x - \frac{1}{2}a$; y por la propiedad (202) de las hipórbolas equiláteras $(EL)^2 \pm (EF)^2 = (LM)^2$, ó $xx - ax + \frac{1}{4}bb = \frac{1}{4}bb - by + yy$.

Si $a = b$, no se podrá ejecutar la construcción precedente, porque será nulo el valor del semieje EF ó EG . Y como entonces la equacion hallada se transforma en esta $yy - ay - xx + ax = 0$, ó $yy - ay + \frac{1}{4}aa = xx - ax + \frac{1}{4}aa$, que despues de sacada la raíz quadrada, dá $y - \frac{1}{2}a = x - \frac{1}{2}a$ ó $y = x$, y $\frac{1}{2}a - y = x - \frac{1}{2}a$ ó $y = a - x$; se infiere que si concluimos el rectángulo $ABCO$, y tiramos las dos diagonales AC , BO , será el lugar de todos los puntos M .

Porque la diagonal AC es el lugar de la primera equacion $y = x$, y la otra diagonal BO es el lugar de la segunda equacion $y = a - x$.

135. 299 Cuestion V. Dada de posicion en un plano una recta indefinita BAP , y dos puntos fijos A , D , el uno en dicha linea y el otro fuera; se pide el lugar de todos los puntos M , tales que tirando desde cada uno de dichos puntos á los dos puntos A , D , las rectas MA , MD , la linea AM siempre sea igual á la parte ME de la otra recta DM , que está entre el punto M y el punto E donde encuentra la linea MP .

Ti-

Tiremos desde el punto dado D , y desde el punto M Fig. las perpendiculares BD , MP á la AP ; llamemos AB , $2a$; 135 . BD , $2b$; AP , x ; PM , y ; será $AP = PE$, pues, segun suponemos, $AM = ME$. Pero de los triángulos semejantes EBD , EPM inferirémos $EB = AE - AB : BD :: EP : PM$, ó $2x - 2a : 2b :: x : y$; de donde se saca $xy - ay = bx$, cuyo lugar pertenece (267) á una hipérbola equilátera entre sus asíntotas, y se construye como sigue.

Despues de tirada la AD , la dividiremos en dos partes iguales en el punto C , por cuyo punto tiraremos las rectas CF , CG , la una paralela y la otra perpendicular á AP ; trazaremos entre las asíntotas CF , CG indefinitamente prolongadas al uno y otro lado del punto C , por los puntos D , A (210 y 211) las dos hipérbolas opuestas DM , AM que serán (201) equiláteras. Estas serán el lugar cabal de todos los puntos M .

Porque las asíntotas CF , CG dividen las rectas AB , BD en dos partes iguales en los puntos L , K , pues el punto C divide por el medio la linea AD ; y por consiguiente, quando los puntos P están en la AB prolongada indefinitamente ácia B , conforme hemos supuesto al tiempo de hacer el cálculo, la linea PL ó $CH = x - a$, $HM = y - b$, y por la propiedad de la hipérbola (170) $CH \times HM = CK \times KD$, ó $xy - ay - bx + ab = ab$, que dá $xy - ay = bx$.

Si supusiéramos que los puntos P están en la BA indefinitamente prolongada ácia A , ó en la parte determinada AB ; sacaríamos igualmente la misma equacion $xy - ay =$

bx ,

Fig. bx , con tal que hiciéramos $AP = -x$, y $PM = -y$.

Resolucion de algunas cuestiones determinadas.

300 Cuestion I. *Entre dos rectas a, b hallar dos medias proporcionales.*

Si llamamos x la primera de las dos líneas que buscamos, la segunda será $\frac{xx}{a}$, pues $a : x :: x : \frac{xx}{a}$; tendremos, pues, $a : x :: \frac{xx}{a} : b$, que dá la equacion $x^3 = a^2b$, que ni la Geometría Elemental puede resolver, ni el Álgebra tampoco, sino es por aproximacion. Nos valdremos para resolverla de la equacion de segundo grado $xx = ay$; si en el primer miembro de $x^3 = aab$ ó $x \times xx = aab$, substituímos ay en lugar de xx , resultará la equacion $xy = ab$; tendremos, pues, las dos equaciones $xx = ay$, y $xy = ab$, que pertenecen á dos curvas distintas; correspondiendo la primera á una parábola, y la otra á una hypérbola, que servirán para la construccion de $x^3 = aab$.

1136. Para construir dichas dos equaciones tiraremos las AC , AQ ; de manera que formen una con otra un ángulo recto, que es mas acomodado. Tomaremos en la primera $AC = a$, y con esta linea como parámetro, siendo AQ el ege, trazaremos la parábola ATM . Tomaremos en la otra linea la $AB = ab$, y concluido el paralelogramo $ACDB$ trazaremos entre las asýmtotas AQ , AC la hypérbola MD que pasará por el punto D . Estas dos curvas no tienen mas punto de concurso que M . Tiraremos las MP , MQ perpendiculares á las rectas AC , AB ; será AP ó MQ la primera x de las

las dos medias proporcionales entre AC , AB , y AQ ó MP Fig. será la segunda $= \frac{xx}{a}$.

301 Cuestion II. Dado un ángulo BAC , y un punto 137.
D dentro del mismo ángulo; trazar un círculo que pase por el punto dado D , toque el lado AB en algun punto P , y corte en el otro lado AC una parte OC igual á una linea dada 2a.

Desde el punto dado D tiraremos la DA , que pase por el vértice A del ángulo dado; la DP que pase por el punto de contacto P , y encuentre en H el lado AC prolongado; la DE paralela á AC ; y la perpendicular DB al lado AB ; y despues de dividida por el medio en Q la parte interceptada $OC = 2a$, llamaremos AP , x ; AQ , z ; DH , t ; AE , m ; AB , g ; BD , b ; DE , f ; AD , n . La propiedad del círculo dará $(AP)^2 = CA \times AO$, ó $(AQ)^2 = (QO)^2$; esto es, $xx = zz - aa$, y por consiguiente $zz = xx + aa$. A mas de esto, los triángulos semejantes PED , PAH dán $AE:AP :: DH:HP$, esto es, $m:x :: t:HP = \frac{tx}{m}$; y $PE:ED :: AP:AH$, esto es, $m-x:f :: x:AH = \frac{fx}{m-x}$. Luego $HQ = z + \frac{fx}{m-x}$, y $CH \times HO$ ó $(HQ)^2 = (QO)^2 = zz + \frac{2fxz}{m-x} + \frac{ffxx}{(m-x)^2} - aa = xx + \frac{2fxz}{m-x} + \frac{ffxx}{(m-x)^2}$ (con substituir en lugar de zz su valor $xx + aa$) $= DH \times HP = \frac{tx}{m}$ por la propiedad del círculo; y dividiendo por x , sacaremos esta equacion $x + \frac{2fz}{m-x} + \frac{ffx}{(m-x)^2} = \frac{t}{m}$. Pero PD ó $DH - HP = \frac{mt-tx}{m}$, y por ser rectángulo el triángulo DBP , $(PD)^2 = \frac{mntt-2mttx+txxx}{mm} = xx - 2gx + gg + bb = xx - 2gx + nn$, substituyendo en lugar de $bb + gg$ su valor nn ; luego inferiremos $\frac{tt}{m} = \frac{mxx-2gmx+nnn}{(m-x)^2} =$

Fig. $x + \frac{2fz}{m-x} + \frac{ffx}{(m-x)^2}$; multiplicando por $m-x$, y trasladando el término $\frac{ffx}{(m-x)^2}$, resultará $mx - xx + 2fz = \frac{mxx - 2gm - ffx + mnn}{m-x} = \frac{mxx - mmx - nxx + mnn}{m-x}$, porque del triángulo rectángulo DEB sale $ff = bb + gg - 2gm + mm = nn - 2gm + mm$; esto es, ya que sale cabal la division, $mx - xx + 2fz = -mx + nn$, ó $2fz = xx - 2mx + nn$. Quadrando finalmente cada miembro, y substituyendo en lugar de zz su valor $xx + aa$, sacaremos la equation de quarto grado

$$\begin{aligned} x^4 - 4mx^3 + 4mmxx - 4mnnx + n^4 &= 0 \\ &- 4ff \\ &- 2nn \end{aligned}$$

Cuyas raíces hallaremos por medio de un círculo y de una parábola dada, ó de otra seccion cónica qualquiera, y darán tales valores de $AP = x$, que si tiramos PM perpendicular á AP , tirando PD , y haciendo el ángulo PDM igual al ángulo DPM , el punto M donde concurren los lados DM , PM del triángulo isósceles DPM , será el centro del círculo que se pide, cuyo radio será igual á MP ó MD . Ó si nó, tómese en el lado AB la parte $AP = x$, y en el otro lado AC la parte $AQ = \sqrt{(xx + aa)}$, y tirando á dichos lados las perpendiculares PM , QM ; el punto M donde concurrieren, será el centro del círculo que se pide.

138. 302 Cuestion III. Dado un círculo cuyo centro está en A , siendo AM su radio, y dos puntos E , F en un mismo plano; hallar en la circunferencia dentro del ángulo EAF , el punto M ,









M, tal que si se tiran las rectas *AM*, *EM*, *FM*, los dos ángulos *AME*, *AMF* sean iguales. Fig. 138.

Es patente que si las líneas *AE*, *AF* fuesen iguales una con otra, la línea que dividiere por medio el ángulo *EAF*, cortaría la circunferencia en el punto que se pide. Por lo que, supondremos que dichas dos líneas son desiguales, y para mayor claridad, que la línea *AE* es menor que *AF*. Sentado esto,

Por el punto *M*, que miraremos como dado, tiraremos la recta *MD* perpendicular al radio *AM*, y por el punto *D* donde encuentra *AF*, la recta *GH* paralela á *AM*, que encuentre en *H* la *MF*, y en *G* la *EM* prolongada que corta en *C* la recta *AF*; de los triángulos semejantes *FAM*, *FDH* sacaremos esta proporcion *AM*, *DH* :: *AF* : *FD*; y de los triángulos semejantes *CAM*, *CDG* estotra *AM* : *DG* :: *AC* : *CD*. Pero la línea *DG* = *DH*, una vez que por la cuestion los ángulos *AME*, *AMF* han de ser iguales, y lo serán por lo mismo los ángulos *DMH*, *DMG*. Luego *AF* : *FD* :: *AC* : *CD*, y *AF* + *FD* : *AF* :: *AC* + *CD* ó *AD* : *AC*. Sentado esto, tiremos las *EB*, *MP* perpendiculares á *AF*, y la *MQ* perpendicular á *EB*; llamemos *AM*, *a*; *AB*, *b*; *EB*, *c*; *AF*, *d*; *AP*, *x*; *PM*, *y*. De los triángulos rectángulos semejantes *APM*, *AMD* sacaremos *AP* : *AM* :: *AM* : *AD*, esto es, *x* : *a* : *a* : *AD* = $\frac{aa}{x}$, y por consiguiente *FD* = $d - \frac{aa}{x}$; y de los triángulos semejantes *EQM*, *MPC* inferiremos *EQ* ó *EB* — *MP* : *QM* ó *AP* — *AB* :: *MP* : *PC*, esto es, *c* — *y* :

$x - b :: y : PC = \frac{xy - by}{c - y}$. Luego AC ó $AP + PC = \frac{cx - by}{c - y}$, y substituyendo en la proporcion antecedente $AF + FD : AF :: AD : AC$ en lugar de las lineas sus valores analýticos, sacarémos, despues de multiplicados los extremos y los medios, esta equacion $2cdxx - aacx - 2bdxy + aaby + aady = aadc$, que, si dividimos por $2cd$, y hacemos para abreviar $b + d = f$, se reducirá á $xx - \frac{b}{c}xy - \frac{aa}{2d}x + \frac{aaf}{2cd}y - \frac{1}{2}aa = 0$, cuyo lugar, que es una hypérbola entre sus asýmtotas, se construirá por lo dicho (269) y cortará la circunferencia del círculo en el punto M .

Si quisiésemos sacar una equacion que no llevára mas incógnita que x , nos valdríamos de la equacion del círculo $xx + yy = aa$, y substituyendo en ella en lugar de yy el quadrado de y que dá la equacion precedente, resultaría una equacion del quarto grado que no llevaría mas incógnita que x , y que tendría una de sus raices igual al valor que se pide de AP .





ELEMENTOS

DEL CÁLCULO INFINITESIMAL.

INTRODUCCION.

303 **E**N todas las reglas que hemos declarado hasta aquí para calcular la cantidad, hemos prescindido de los incrementos ó decrementos que la pueden sobrevenir para llegar á un estado determinado. Es de suma importancia atender también á estos incrementos ó decrementos, ó á las razones que entre ellos puede haber, por lo mucho que esto facilita averiguar las razones de las cantidades mismas. Quando en la consideracion de las cantidades queremos atender á sus decrementos ó incrementos, podemos hacerlo con dos miras distintas y aun opuestas; porque de la consideracion de las cantidades podemos pasar á la de sus incrementos ó decrementos, ó podemos considerar los incrementos para averiguar en qué razon están unas con otras las cantidades. Estos dos respectos con que se pueden calcular las cantidades, forman las dos partes del cálculo conocido con el nombre de *Cálculo infinitesimal*, cuyo asunto abraza quanto encierran estas dos cuestiones: 1.º *Dadas las cantidades, hallar qué razon hay entre sus incrementos.* 2.º *Dados los incrementos de las cantidades, averiguar la razon de las cantidades mismas.*

Pero como entre una cantidad qualquiera y la misma cantidad aumentada ó disminuida hay una diferencia igual al incremento ó decremento que padeció; este es el mo-

Fig. tivo de llamarse cálculo diferencial el ramo de la analysis que enseña quanto conduce para la resolucion de la primera de estas dos cuestiones; cuyo cálculo tambien se llama *Cálculo fluxionario* ó de las *Fluxiones*, *Cálculo de los infinitamente pequeños*. Hablarémos por lo mismo frecuentísimamente en adelante de cantidades infinitamente pequeñas tan difíciles de concebir para muchos como el infinito de que hablamos en otro lugar. Es, pues, importantísimo que demos de estas cantidades la idea mas cabal y exacta que podamos, y lo egecutarémos en habiendo sentado algunas proposiciones que son muy fundamentales en toda esta materia.

304 *Si la diferencia de dos cantidades mengua continuamente, de modo que al fin llegue á ser menor que qualquiera cantidad assignable ó dada; las dos cantidades serán iguales.*

Porque si no fuesen iguales, se podria señalar su diferencia, ó sería su diferencia una cantidad assignable, cuya consecuencia desdice del supuesto.

305 *Si la razon de dos cantidades fuese tal, que siendo siempre uno mismo el antecedente, la diferencia que entre él, y su consecuente hubiere, vaya continuamente menguando basta que llegue á ser menor que qualquiera cantidad dada; las dos cantidades serán iguales.*

Porque en virtud de lo dicho (304) el antecedente será igual á su consecuente: luego serán tambien iguales las dos cantidades, cuya razon espresaren.

Si

306 Si en una línea curva ABG consideramos un ar- Fig. 139.
co MN infinitamente pequeño, esto es, menor que qualquiera
cantidad dada, y tiramos por los extremos de dicho arco las
ordenadas MP , NQ al eje ó diámetro AC , y las paralelas
 MR , NS á dicho diámetro; los paralelogramos $PQRM$, $PQNS$
se podrán tomar cada uno por el espacio $PQNM$ compren-
dido entre las ordenadas PM , QN , la línea recta PQ , y el
pequeño arco MN de la curva.

Todos los puntos de una línea curva ó se ván apartan-
do continuamente de su diámetro, ó se le ván acercando
mas, y mas; ó finalmente la línea curva se compone de par-
tes de las quales las unas se apartan mas y mas de su diá-
metro, y las otras se le acercan mas y mas. Porque es evi-
dente que no puede haber en una línea curva porcion al-
guna cuyos puntos estén todos á la misma distancia de su
diámetro; pues dicha porcion no sería una línea curva sino
una recta paralela al diámetro.

Supongamos, pues, 1.º que el arco MN sea de una
curva AMB cuyos puntos se ván apartando todos de su
diámetro AC . Si tomamos desde A hasta mas allá del pun-
to N el arco MO de una cantidad finita; y si despues de
tirada la ordenada OF paralela á MP , tiramos las rectas
 OD , ME paralelas al diámetro AC ; es evidente que el es-
pacio curvilineo $PFOM$ será mayor que el paralelogramo
inscripto $PFEM$, y menor que el paralelogramo circuns-
cripto $PFOD$. Pero si imaginamos que el punto O se mueva
en la curva ácia el punto M , es evidente que el paralelogra-

Fig. mo $MEOD$, que es la diferencia que vá del paralelogramo
 139. inscripto al circunscripto al arco OM , menguará continuamente hasta que al fin será nulo ó cero en el instante que el punto O llegare á M . Por consiguiente, quando el punto O llegare á N ; ó, lo que es lo mismo, estuviere infinitamente cerca de M , el paralelogramo $MEOD$, que entonces será $MRNS$, será menor que qualquiera cantidad dada. Luego (304) los paralelogramos $PQRM$, $PQNS$ llegarán á ser entonces iguales, y por lo mismo cada uno de ellos llegará á ser igual al espacio curvilíneo $PQMN$.

Supongamos 2.º que el arco $M'N'$ esté en una curva $BM'G$, cuyos puntos se arriman mas y mas á su diámetro CG . Se viene á los ojos que la demostracion será la misma que en el primer supuesto, con sola la diferencia de que el paralelogramo $PQNS$ que en el primer caso era circunscripto, será inscripto en este segundo supuesto.

Supongamos 3.º Que la linea curva ABG se componga de muchas porciones, de las quales las unas como AB se vayan apartando del diámetro AC , y las otras como BG se le vayan al contrario arrimando continuamente. Los puntos que como B separan dichas porciones, no pueden estar en los arcos MN , $M'N'$, porque en este caso el punto B estaría mas inmediato al punto M ó M' , que el punto N , ó N' , cuya consecuencia es contraria al supuesto que hemos hecho de estar los puntos N, N' infinitamente inmediatos á los puntos M ó M' . Luego queda comprehendido este último caso en alguno de los dos primeros.

De

307 De la última proposición inferiremos 1.º que si Fig. tiramos, donde quisiésemos, una ordenada CB paralela á 139. PM , é imaginamos que la porción de curva AB está dividida en un número infinito de arcos infinitamente pequeños como MN ; el espacio ACB comprendido entre las rectas AC , CB , y la porción de curva AB , será igual á la suma de todos los paralelogramos como $PQRM$ ó $PQNS$. Se infiere también que el espacio $MPCB$ comprendido entre las rectas MP , PC , CB , y la porción MB de la curva, será igual á la suma de todos los espresados paralelogramos que cupieren en dicho espacio; lo mismo decimos de toda la curva.

308 2.º Si estuviere una figura cualquiera $CMDOC$ 140. entre dos paralelas CE , DF , é imaginamos entre dichas paralelas dos rectas MO , NL infinitamente cerca la una de la otra, y paralelas á las líneas CE , DF ; el espacio $OMNL$ que dichas paralelas interceptarán en la figura $CMDOC$ será igual al rectángulo de la una de ellas, como de MO , multiplicada por su distancia MR ú OS .

Porque si tiramos AB perpendicular á las paralelas CE , DF , cuya perpendicular encuentra las paralelas MO , NL en los puntos P , Q ; es evidente por lo dicho (306) que el espacio $MPQN$ es igual al rectángulo $PMRQ$, y el espacio $POLQ$ igual al rectángulo $POSQ$; luego $MPQN = PM \times PQ$, y $POLQ = PO \times PQ$; restando la segunda equación de la primera, tendremos $MPQN - POLQ = OMNL = (PM - PO) \times PQ = OM \times PQ$.

Fig. 309 3.º De lo que acabamos de decir se colige que
 140. si estuvieren las dos figuras $CMDOC$, $EGFHE$ entre dos
 paralelas CE , DF , y fuesen tales, que tirando entre di-
 chas paralelas, donde se quisiese, una linea MH paralela
 á las rectas CE , DF , las partes MO , GH de dicha linea
 comprendidas en las figuras $CMDOC$, $EGFHE$ tuvieren
 una con otra una razon dada; las dos figuras tendrán tam-
 bien una con otra la misma razon dada.

Porque si imaginamos otra paralela NK infinitamente
 próxima á MH , y tiramos una perpendicular AB á las pa-
 ralelas CE , DF , cuya perpendicular encuentra las parale-
 las MH , NK en los puntos P , Q ; es evidente (308)
 que el espacio $OMNL = OM \times PQ$, y tambien que el es-
 pacio $GHKI = GH \times PQ$. Serán, pues, dichos espacios
 $:: MO : GH$; y como lo mismo probarémos, tírese la MH
 por donde se quisiere, se sigue que la suma de todos los es-
 pacios $MNLO$, esto es, el espacio total $CMDOC$ será á la
 suma de todos los espacios $GHKI$, esto es, al espacio to-
 tal $EGFHE$, en la misma razon dada.

Por el mismo término probaríamos que la porción MDO
 de la figura $CMDOC$, es á la porcion correspondiente GFH
 de la otra figura $EGFHE$ en la razon dada; lo propio di-
 rémos de las porciones restantes CMO , EGH .

Es patente que si la razon dada fuese la razon de
 igualdad, quiero decir, que si las partes MO , GH de
 la recta MH fuesen iguales, los espacios $CMDOC$,
 $EGFHE$, y sus porciones correspondientes MDO , GFH ,

¿y CMO , EGH serían también iguales.

Fig.

310 Si suponemos en una línea curva qualquiera un arco MN infinitamente pequeño, é imaginamos las tangentes MT , NT que concurren en el punto T , la subtensa MN , y la recta NS perpendicular á MT prolongada; podremos tomar por el arco MN su subtensa MN , ó la suma de las dos tangentes MT , NT , ó finalmente la recta MS . 141.

Toda línea curva es por precision ó siempre cóncava ácia una misma parte, ó formada de muchas porciones, de las cuales siendo las unas cóncavas ácia un lado, las otras lo son ácia el lado opuesto. Los puntos que separan estas porciones (306) no pueden estar en los arcos infinitamente pequeños MN , porque entonces estarían mas cerca del punto M que el punto N contra lo supuesto. Podemos, pues, siempre suponer que el arco MN es porcion de una curva que es constantemente cóncava ácia un mismo lado.

Sentado esto, si tomamos en la curva un arco MO de una cantidad finita, y tiramos la subtensa OM , la tangente OG , y la OD paralela á NS ; es evidente 1.º Por ser el triángulo MDO rectángulo en D , que la tangente MD es menor que la subtensa MO , y menor, con mas razon que el arco MNO ; por manera, que el arco MNO , y la subtensa MO son cada una mayor que MD , y cada una menor que la suma de las dos tangentes MG , OG . 2.º Es evidente, por tener el arco MNO vuelta su concavidad ácia un mismo lado, que si por un punto qualquiera N del arco MO tiramos una tangente TR , los puntos T , R donde encontrará las

Fig. las tangentes MG , OG estarán entre los puntos M , G , y O , G . Por consiguiente el ángulo OGD , que es esterno respecto del triángulo TGR , será mayor que el ángulo RTG , ó NTS .

En virtud de todo esto, si tiramos las rectas ME , MF paralelas respectivamente á las tangentes OG , NT , y que encuentran la recta DO en los puntos E , F , é imaginamos que el punto O se mueva en la curva ácia el punto M ; es evidente que el ángulo OGD , ó su igual EMD irá continuamente menguando hasta desvanecerse en el instante que el punto O llegare á M , porque entonces la tangente OG se confunde con la tangente MD ; de donde se sigue que la linea ME mengua continuamente, hasta que en aquel instante es igual á MD . Luego quando el punto O llegare á N , esto es, infinitamente cerca del punto M , la linea ME , que entonces será MF , no discrepará de la tangente MD , sino de una cantidad menor que qualquiera dada; luego (305) las lineas TN , TS , que están en la misma razon que las lineas MD , MF por ser semejantes los triángulos MFD , TNS , serán iguales. Luego las dos tangentes MT , TN juntas serán iguales á la recta MS , igualmente que al arco MN , y á la subtensa MN .

311 Ya que en el supuesto de estar el punto N infinitamente próximo al punto M , el ángulo FMD ó su igual NTS es infinitamente pequeño; se sigue que en el triángulo MTN , el ángulo interno NMT , que es menor que el exterior NTS , será tambien infinitamente pequeño, esto es

me-

menor que qualquiera ángulo dado , y que por consiguiente no se podrá tirar por el punto M ninguna línea recta dentro del ángulo TMN . Luego las dos líneas MT , NM se confunden una con otra , y podemos por consiguiente mirar una tangente como una línea recta que pasa por dos puntos de una línea curva infinitamente inmediatos el uno al otro.

Fig.

312 Si imaginamos que una línea curva qualquiera esté dividida en un número infinito de arcos infinitamente pequeños como MN ; es evidente que si en lugar de dichos arcos tomamos sus subtensas , resultará un polígono de una infinidad de lados , cada uno infinitamente pequeño , cuyo polígono se podrá tomar por la línea curva , pues (310) no discrepará de ella. Fuera de esto , los pequeños lados del espresado polígono , prolongados ácia ambos lados , serán las tangentes de dicha curva , pues cada uno pasará por dos de sus puntos infinitamente inmediatos el uno al otro.

141.

313 El rumbo que hemos seguido para probar las proposiciones sentadas poco há (304 y sig.) dá bastante á entender qué especie de cantidades son las que llamamos infinitamente pequeñas; no son cantidades realmente existentes , ni tampoco supone su existencia el cálculo infinitesimal; son cantidades menores que qualesquiera dadas; son el límite al qual se acercan , sin alcanzarle jamás , las cantidades que van menguando , del mismo modo que el infinito es , segun digimos (I.186) , el límite al qual se van

Fig. van aproximando las cantidades que concebimos como continuamente crecientes.

142. Con la mira de manifestar aun mejor la naturaleza de estos infinitamente pequeños, supondremos que se nos ofrezca tirar en el punto A una tangente á la curva CAB . Tomaremos desde luego á arbitrio dos puntos A y B en dicha curva, y tiraremos por ellos la secante AB , indefinitamente prolongada ácia Z y X , y por los dos puntos A y B de la curva las dos ordenadas AD , BE perpendiculares al eje CE . Es evidente que la posicion de la secante pende de la distancia DE que hay entre las dos ordenadas, que es la diferencia de las dos abscisas CE , CD , y de la diferencia BO de las mismas ordenadas; de suerte que si conociésemos dichas diferencias, ó la razon entre la distancia de las ordenadas y su diferencia, conoceríamos la posicion de la secante. Imaginemos que el uno de los dos puntos A , B de la curva, el punto B por egemplo, se vaya arrimando continuamente al punto A , y que por el punto A , que suponemos fijo, se haya tirado una tangente AP á la curva; se echa de ver que la secante AB tirada por los dos puntos A , B , de los cuales suponemos que el uno se vá arrimando al otro, se acercará continuamente á la tangente, hasta llegar á ser la tangente misma, quando llegaren á confundirse en solo un punto los dos puntos A y B . Es, pues, la tangente el límite de las secantes, el término al qual se arriman mas

y mas ; sin que jamás le puedan alcanzar mientras fueren Fig. secantes, pero al qual se pueden acercar quanto se quisiere. Pero, segun acabamos de ver, la posicion de la secante se determina por la razon entre la diferencia BO de las ordenadas y su distancia DE ; luego si buscamos el límite de esta razon, esto es, el valor al qual se aproxima mas y mas esta razon á medida que la una de las ordenadas se arrima á la otra , este límite determinará la posicion de la tangente, pues la tangente es el límite de las secantes.

314 Para mayor esplicacion repetirémos lo que acabamos de decir respecto de una curva en general , aplicándolo al círculo. Supongamos, pues, que al círculo AEB le queramos tirar una tangente en el punto E , cuya tangente supondrémos que sea la TEL . Tirarémos la EM perpendicular , y la EH paralela al diámetro AB ; tirarémos tambien por los extremos del arco EI la secante EI ; finalmente tomarémos la EH igual á una linea dada, y tirarémos paralelamente á las ordenadas la GFN que pase por el punto I , y la HL que encuentre en L la tangente, y en K la secante. 143.

Es evidente que puede menguar el arco EI de modo que llegue á ser menor que qualquiera arco dado ; luego el ángulo GEI ó LEK será entónces menor que qualquiera ángulo dado. Porque si tiramos el diámetro ECP y la IP , el ángulo $GEI = P$ (I. 372 y I. 374) ; pero en el supuesto de ser el arco EI menor que qualquiera arco dado,

do, el ángulo P será menor que qualquiera ángulo dado; luego el ángulo GEI ó LEK será tambien menor que qualquiera ángulo dado en el mismo supuesto. Por consiguiente, la línea LK llegará á ser menor que qualquiera línea dada; luego la razon $LH:HE$ será á la verdad mayor que la razon $KH:HE$, pero la diferencia de estas dos razones será menor que qualquiera dada; luego al fin llegan á ser iguales las dos razones. Pero la razon $LH:HE$ es la misma que la razon $GF:FE$, y la razon $KH:HE$ es la misma que la razon $IF:FE$ luego las dos razones $GF:FE$ y $IF:FE$ llegan á ser por último iguales. Y como la razon $GF:FE$ es la misma que la razon de la ordenada á la subtangente, ó la razon $EM:MT$; la razon $IF:FE$ llega á ser por último igual á la razon $EM:MT$. Pero FI es la diferencia de las ordenadas EM , IN , y MN es la diferencia de las abscisas AM , AN ; luego finalmente la diferencia de las ordenadas es á la diferencia de las abscisas como la ordenada EM á la subtangente MT . Por consiguiente una vez averiguado á qué razon es por último igual la razon entre la diferencia de la ordenada y la diferencia de la abscisa, quedará determinada la subtangente, y será facil tirar la tangente.

315 El cálculo que averigua el límite de la razon entre la diferencia finita de dos cantidades dadas, y la diferencia finita de otras dos cantidades que tienen con las dos primeras una analogía conocida, es el que llamamos propriamente *Cálculo diferencial*.

Es

316 Es evidente que quanto menor fuere cada una Fig. de dichas diferencias, tanto mas se acercará su razon al 142 límite que se busca, pues tanto mas se acercará á confundirse el punto *B* con el punto *A*. Es tambien evidente que mientras estas diferencias no son enteramente nulas, su razon no es rigurosamente igual al límite; y que quando son nulas, ya no hay entre ellas razon alguna, porque no hay razon entre dos cosas que no existen. Pero el límite de la razon que habia entre dichas dos cantidades quando eran todavia algo, no es por esto menos real; y el valor de este límite es el que encamina, segun hemos visto, á determinar la posicion de la tangente.

Con un egemplo aclararémos mejor lo que acabamos de decir acerca del límite de las razones. Supongamos dos cantidades, tales que la una sea igual al duplo mas al cuadrado de la otra, por manera que llamando la primera *a* y la segunda *b* sea $a = 2b + bb$. Es evidente 1.º que la razon entre *a* y *b* será siempre mayor que el número 2, mientras *a* y *b* tuvieren algun valor 2.º que la razon entre *a* y *b* se aproximará tanto mas á valer 2, quanto menor fuere *b*, y que dicha razon podrá acercarse quanto se quisiere al número 2, tomando la primera cantidad tan pequeña como fuere menester, pues quanto menor fuere *b*, tanto menor será *bb* (II. 182). Por consiguiente será el número 2 el límite de la razon de dichas dos cantidades; quando llegare á ser nula *b*, tambien llegará á ser *a* evidentemente nula, en cuyo caso no habrá ni podrá ha-

haber razon alguna entre a y b ; pero es también cierto y evidente que mientras fueren algo, será el número 2 el límite de su razon.

317 Como la razon de las diferencias se acerca tanto mas á su límite, quanto menores son dichas diferencias; por este motivo se supone el límite de la razon representado por la razon entre las diferencias infinitamente pequeñas. Pero esta razon entre diferencias infinitamente pequeñas, no es mas que un modo abreviado de espresar una nocion mas exacta y rigurosa, esto es, el límite de la razon de las diferencias finitas. Porque las diferencias infinitamente pequeñas ó no existen realmente, ó por lo menos no es menester suponer que existen realmente, para determinar exacta y rigurosamente dicho límite.

318 Hemos de prevenir que nunca se consideran en este cálculo como iguales las cantidades ó razones entre las quales hay alguna diferencia, sea la que fuere; solo por razon de ser su diferencia menor que qualquiera cantidad asignable, se demuestra sin riesgo de incurrir en ningun paralogismo, que la diferencia llega por último á desaparecerse y ser nula; por cuyo motivo las cantidades ó razones llegan finalmente á ser iguales; su igualdad solo se verifica en el límite al qual se van acercando mas y mas las cantidades ó razones, bien que quizá nunca le alcancen, segun llevamos dicho. En las demostraciones que hacemos por este cálculo, no despreciamos cantidad alguna ni grande ni chica, solo decimos que las cantidades y

razones son iguales quando llega á ser ninguna su diferencia. Fig.

319 Verdad es que en el límite suelen ser nulas las cantidades. Pero no por esto deja de ser utilísimo considerar lo que pasa en el límite, porque otras cantidades que en el límite no se desvanecen, y tenían la misma razón que las primeras, adquieren en el límite la proporción que le caracteriza. Por egemplo las dos razones $IF:FE$ y $GF:FE$: FE discrepan á la verdad la una de la otra, pero discrepan de una cantidad menor que qualquiera cantidad assignable; luego en el límite serán iguales. Este límite está en el punto E , quando se confunden con él los puntos G, I, F , en cuyo supuesto todas las líneas GF, IF, EF son enteramente nulas. Pero las líneas LH, KH, EH proporcionales á las primeras, no se desvanecen en el límite, y se mantienen en el estado de finitas, y allí mismo las dos razones $LH:HE$ y KH, HE son verdaderamente iguales. Por lo que, quando atendemos á la proporción que tienen en el límite las cantidades que totalmente se desvanecen, determinamos la razón que en dicho límite tienen las cantidades homólogas á las primeras, que en el límite no se desvanecen, y se mantienen en la clase de finitas.

320 Todo esto acabaria de aclarar, si quedase alguna duda, qué cosa entendemos por diferencial, fluxiones, elementos, cantidades infinitésimas, ó infinitamente pequeñas. Todas estas denominaciones que tenemos por sinónimas no significan sino diferencias menores, que qualesquier

Fig. ra cantidades dadas , de las quales se pueden inferir con seguridad las igualdades, ó últimas razones que se verifican en el límite. Pero no me canso de repetirlo , estas cantidades , ó razones no discrepan las unas de las otras sino de una diferencia menor que qualquiera cantidad dada , luego á lo último , y en el límite llegan á ser iguales. Para abreviar usamos de una espresion compendiosa , y atribuimos la igualdad que solo se verifica en el límite , á cantidades ó razones entre las quales hay una diferencia menor que qualquiera cantidad dada ; no porque creamos que puedan ser iguales las cantidades ó razones mientras hubiere entre ellas alguna diferencia , sino porque estamos seguros de que la última diferencia , la que corresponde al límite , llega á ser nula , y entonces las cantidades , y razones son iguales. Este artificio no perjudica á la evidencia y claridad de las demostraciones que por referirse únicamente al caso del límite , se fundan por precision en las últimas igualdades , y proporciones de las cantidades. Estas se consiguen con omitir , y mirar como nulas las diferencias menores que qualquiera cantidad dada. No se desprecian , pues , en el cálculo diferencial diferencias que , aunque pequeñas , son no obstante algo , ni se consideran como iguales cantidades entre las quales hay alguna diferencia. Porque quando decimos que son iguales las cantidades ó las razones cuya diferencia es infinitamente pequeña , esto es menor que qualquiera cantidad dada , no queremos decir que sean iguales mientras fuere algo su dife-

fe-

ferencia , sino solo en el límite, donde dicha diferencia es Fig.
nula , y se puede despreciar. Por lo que , omitir las dife-
rencias menores que qualesquiera cantidades dadas , no es
otra cosa que determinar las igualdades , y proporciones
que realmente se verifican en el límite.

321 Lo que digimos en otro lugar (II. 184) acer-
ca de los infinitos de varias órdenes , se aplica de suyo á las
diferentes órdenes de infinitamente pequeños. Quando de-
cimos que una cantidad es infinitamente pequeña de segun-
da orden , esto es, infinitamente pequeña respecto de otra
cantidad que tambien es infinitamente pequeña , solo que-
remos dár á entender que la razon entre la primera de di-
chas dos cantidades y la segunda es siempre tanto menor,
quanto menor suponemos la segunda cantidad , y que pode-
mos suponer dicha razon tan pequeña , como quisiésemos,
imaginando la segunda cantidad tan pequeña , como para
esto se requiere.

Si fuere x infinitamente pequeña , lo será tambien la
razon $\frac{x}{1}$; y por la naturaleza de la multiplicacion será xx
infinitamente pequeña de segunda orden , pues cada uno de
sus dos factores es infinitamente pequeño ; y como $xx : x ::$
 $x : 1$, resulta que quanto menor fuere x , tanto menor se-
rá la razon $\frac{xx}{x}$.

Si atendemos á que $HK : KL :: FI : IG$; resul- 143.
tará que quando KL , FI fueren menores que quales-
quiera cantidades dadas , será GI una quarta proporcio-
nal á HK , cantidad dada, y á los dos infinitamente pe-

Fig. queños LK , FI , que llamamos infinitamente pequeños de primera orden ; podremos , pues , llamar GI un infinitamente pequeño de segunda orden. Ahora bien : así como hemos de suponer que en el límite son iguales las dos LH , HK que no discrepan sino de la cantidad infinitamente pequeña KL , habremos tambien de suponer iguales una con otra las dos cantidades infinitamente pequeñas GF , IF , que no discrepan sino de la cantidad GI , que respecto de ellas es infinitamente pequeña de segunda orden.

DEL CÁLCULO DIFERENCIAL.

3 2 2 Para conocer el valor de los incrementos de una cantidad variable que vá creciendo por grados infinitamente pequeños se ha de determinar el valor que tiene dicha cantidad en un instante qualquiera , y el valor de la misma cantidad en el instante que sigue inmediatamente al primero : restando despues el uno de estos valores del otro , su diferencia espresará el incremento ó decremento que padece la espresada cantidad , cuya espresion se llama *la Diferencia ó la Diferencial* de la cantidad propuesta.

3 2 3 La diferencial de una sola variable como x ó y , se señala de este modo dx ó dy , escribiendo inmediatamente antes de dicha variable la letra d que es la primera de la palabra *diferencial*; de cuya letra ya no usaremos en adelante sino para espresar la diferencial de la cantidad antes de la qual estuviere escrita. Pero quando la cantidad cuya diferencial se ha de representar es compuesta,

ta,

tá, quales son estas x^2 , $5x^3 + 3x^2$ ó $\sqrt{x^2 - a^2}$ &c. se Fig. escribe la cantidad dentro de un paréntesis, y antes del paréntesis la letra d de este modo $d(x^2)$, $d(5x^3 + 3x^2)$, $d(\sqrt{x^2 - a^2})$ &c.

324 De lo que hemos dicho tocante á la diferencial de una cantidad, se sigue que para hallar la diferencial de una cantidad propuesta que no contiene sino variables de primer grado, que no están ni multiplicadas ni divididas unas por otras, toda la operacion se reduce á afectar cada variable de la característica d , dejándola á cada una su signo. En virtud de esto, la diferencial de $x + y - z$, será $dx + dy - dz$. Con efecto, para sacar dicha diferencial hemos de considerar que x se transforma en $x + dx$, y en $y + dy$, y z en $z + dz$; en cuyos supuestos la cantidad propuesta $x + y - z$ será $x + dx + y + dy - z - dz$: tomando, pues, la diferencia que hay entre estas dos expresiones, resultará la diferencial (322) de la cantidad propuesta, que será por consiguiente $x + dx + y + dy - z - dz - x - y + z$, ó $dx + dy - dz$.

El mismo rumbo seguiríamos para hallar las diferenciales de las variables que llevan coeficientes ó multiplicadores constantes. Por egemplo, la diferencial de $5x + 3y$ es $5dx + 3dy$; la de $ax + by$, es $adx + bdy$; porque quando x llega á ser $x + dx$, é y llega á ser $y + dy$, la cantidad $ax + by$ es $a(x + dx) + b(y + dy)$, esto es $ax + adx + by + bdy$; será, pues, la diferencia entre las dos expresiones, ó la diferencial de $ax + by$, $adx + bdy$. En

Fig. general, se ha de afectar cada variable de la característica d .

3 2 5 Quando la cantidad propuesta lleva un término todo constante, su diferencial es la misma que si no estuviera dicho término constante. Esto es lo mismo que si digéramos que la diferencial del término constante es cero, y no puede dejar de ser así, porque una cantidad constante no puede crecer, ni menguar; luego es una misma en todos tiempos; luego no se la puede señalar diferencial: por consiguiente la diferencial de $ax + b$ será adx .

3 2 6 Quando las cantidades variables siendo lineares, estuvieren multiplicadas unas por otras, se diferenciará sucesivamente cada variable, como si todo lo demás fuese un multiplicador constante; la suma de los resultados sucesivos será la diferencial del producto propuesto.

En virtud de esto, para diferenciar xy , diferenciaré primero como si x fuese constante, y sacaré xdy ; después diferenciaré xy como si y fuese constante, y saldrá ydx , y la diferencial de xy será $xdy + ydx$.

Fúndase esta regla en el principio fundamental (3 2 2). Para diferenciar xy hemos de considerar x como transformada en $x + dx$, esto es como aumentada de la cantidad infinitamente pequeña dx ; é y como transformada en $y + dy$, esto es como aumentada de la cantidad infinitamente pequeña dy . En estos supuestos xy es $(x + dx) \times (y + dy)$ ó $xy + xdy + ydx + dydx$: luego la diferencia entre las dos expresiones ó la diferencial de xy será $xy + xdy + ydx$

$ydx + dx dy - xy$, ó $xdy + ydx + dydx$; pero como la Fig.
 cantidad $dx dy$ es infinitamente pequeña de segunda or-
 den (321) será infinitamente pequeña respecto de xdy
 é ydx que son infinitamente pequeñas de primera orden: lue-
 go $dx dy$ se deberá despreciar (II. 183), y por consi-
 guiente la diferencial de xy ó $d(xy)$ será $xdy + ydx$.

Por el mismo camino hallaremos que la diferencial de
 xyz es $xydz + xzdy + yzdx$, diferenciando primero como
 si xy fuese constante, despues como si fuese constante xz ,
 y finalmente, como si yz fuese constante. Porque si consi-
 deramos, como es preciso, x, y, z como transformadas en
 $x + dx, y + dy, z + dz$; el producto xyz será $(x + dx) \times$
 $(y + dy) \times (z + dz)$, ó $xyz + xydz + xzdy + yzdx +$
 $ydx dz + zdy dx + xdz dy + dxdydz$. Restando de esta úl-
 tima espresion xyz , haciendo la reduccion correspondiente,
 y desechando los términos infinitamente pequeños de segun-
 da, y tercera orden (II. 183), la espresion de la diferen-
 cial que buscábamos será con efecto $xydz + xzdy + yzdx$.

327 Quando ocurra diferenciar una potencia qual-
 quiera de una cantidad variable, se multiplicará la cantidad
 por su esponente, se le quitará una unidad al esponente que
 llevare la variable, y se multiplicará la cantidad que resul-
 tare por la diferencial de la variable. De la práctica de esta
 regla sacaremos que la diferencial de x^2 es $2x^{2-1}dx$ ó
 $2x dx$; que la de x^3 es $3x^{3-1}dx = 3x^2 dx$; la de x^4 será
 $4x^{4-1}dx = 4x^3 dx$; la de x^{-1} será $-1x^{-2}dx$; la de
 x^{-3} será $-3x^{-4}dx$; la de $x^{\frac{1}{2}}$ será $\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1}dx = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}dx$:

Fig. la de $x^{\frac{4}{3}}$ será $\frac{4}{3}x^{\frac{4}{3}-1}dx = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}dx$; y en general, la diferencial de x^m será $mx^{m-1}dx$, sea lo que fuere el esponente m , un número positivo ó negativo, entero, ó quebrado.

Tambien se saca del principio fundamental la razon de esta regla. Porque si consideramos x como transformada en $x + dx$, siendo dx infinitamente pequeña, será $x^m = (x + dx)^m$ (II. 99) $= x^m + mx^{m-1}dx + m \cdot \frac{m-1}{2} x^{m-2}dx^2 + \&c.$ cuya espresion se reduce á $x^m + mx^{m-1}dx$ por ser el término $m \cdot \frac{m-1}{2} x^{m-2}dx^2$ infinitamente pequeño de segunda orden, y porque los que se le siguen serian aun menores; sacando, pues, la diferencia entre x^m y $x^m + mx^{m-1}dx$ resultará $x^m + mx^{m-1}dx - x^m = mx^{m-1}dx$, que será la diferencial de x^m .

Los multiplicadores constantes que pueden afectar la cantidad variable cuya diferencial se busca, no alteran en nada la práctica de la regla, se quedan dichos multiplicadores en la diferencial del mismo modo que en la cantidad. En virtud de esto, la diferencial de ax^m será $max^{m-1}dx$.

3 2 8 Todas las reglas que hasta ahora hemos dado para diferenciar las cantidades, son fundamentales, y bastan para quantos casos puedan ocurrir; pero con la mira de que sea mas facil su práctica, las aplicaremos á algunos egemplos.

3 2 9 Supongamos que se nos ofrezca diferenciar un quebrado, qual sería $\frac{x}{y}$; le escribiríamos de este modo xy^{-1} (II. 91), y practicando lo dicho (3 2 6) sería $d(xy^{-1}) = xd(y^{-1}) + y^{-1}dx$; y por consiguiente

te (327) $d(xy^{-1}) = -xy^{-2}dy + y^{-1}dx$; cuya espression Fig. es la misma (II.92) que estotra $\frac{-x dy}{y^2} + \frac{dx}{y}$, ó $\frac{y dx - x dy}{y^2}$, de la qual inferiremos que la diferencial de un quebrado $\frac{x}{y}$ es igual á la diferencia dx del numerador $\times$ multiplicada por el denominador y , menos la diferencial dy del denominador, multiplicada por el numerador x , partido todo por el quadrado del denominador. Esta es la regla que se suele dar para la diferenciacion de los quebrados; pero no es necesario afañarse por tenerla presente; bastará quando se hubiere de diferenciar algun quebrado, traspasar el denominador al numerador, y despues diferenciar.

330 Para diferenciar ax^3y^2 , consideraremos desde luego x^3 é y^2 como dos variables lineares, y (326) será $d(ax^3y^2) = ax^3d(y^2) + ay^2d(x^3)$; despues sacaremos (327) $d(ax^3y^2) = 2ax^3ydy + 3ay^2x^2dx$. En general, $d(ax^m y^n) = ax^m d(y^n) + ay^n d(x^m) = nax^m y^{n-1}dy + may^n x^{m-1}dx$.

331 Quando la cantidad que se ha de diferenciar es un polynomio en el qual no hay potencia ninguna de cantidades complexas, se sacará su diferencial con sacar separadamente la de cada uno de sus términos. Será, pues, $d(ax^3 + bx^2 + cxy) = 3ax^2dx + 2bxdx + cydx + cxdy$; $d(ax^2 + bx + \frac{cy}{x^2}) = d(ax^2 + bx + cyx^{-2}) = 2axdx + bdx + cx^{-2}dy - 2cx^{-3}ydx$; $d(x^3y + ay^2 + b^3) = 3x^2ydx + x^3dy + 2aydy$, porque la constante b^3 no tiene diferencial.

332 Si todo el polynomio estuviere debajo de un mis-

Fig. mismo esponente , como $(a + bx + cx^2)^5$, se considerará todo el polynomio como una sola variable , cuya diferencial se sacará por la regla dada (327) en orden á la diferenciacion de las potencias : por consiguiente $d(a + bx + cx^2)^5 = 5(a + bx + cx^2)^4 \times d(a + bx + cx^2) = 5(a + bx + cx^2)^4 \times (bdx + 2cxdx)$. Por lo mismo, $d(a + bx^2)^{\frac{5}{3}} = \frac{5}{3}(a + bx^2)^{\frac{2}{3}} \times d(a + bx^2) = \frac{5}{3}(a + bx^2)^{\frac{2}{3}} \times 2bx dx = \frac{10}{3}bx dx (a + bx^2)^{\frac{2}{3}}$.

333 Si la cantidad , sobre ser compuesta , constase tambien de varios factores , se consideraria cada factor como una sola variable , y se sacaria su diferencial por la regla dada (326) acerca del producto de muchas variables lineares. Por consiguiente , si hubiésemos de diferenciar la cantidad $x^3(a + bx)^{\frac{5}{3}}$, la consideraríamos como compuesta de los dos factores x^3 y $(a + bx)^{\frac{5}{3}}$; sería , pues, $d[x^3(a + bx)^{\frac{5}{3}}] = (a + bx)^{\frac{5}{3}} d(x^3) + x^3 d(a + bx)^{\frac{5}{3}}$, que por las reglas precedentes se reduce á $3x^2 dx (a + bx)^{\frac{5}{3}} + \frac{10}{3}bx^4 dx (a + bx)^{\frac{2}{3}}$. Por lo mismo $d\left[\frac{(x+a)^3}{(x+b)^2}\right] = d[(x+a)^3 + (x+b)^{-2}] = (x+a)^3 d(x+b)^{-2} + (x+b)^{-2} d(x+a)^3$; esto es , $-2(x+a)^3 (x+b)^{-3} dx + 3(x+b)^{-2} (x+a)^2 dx$, que se transforma en $\frac{-2(x+a)^3 dx}{(x+b)^3} + \frac{3(x+a)^2 dx}{(x+b)^2}$, que se reduce á $\frac{(x+3b-2a)(x+a)^2 dx}{(x+b)^3}$.

334 Quando se hubiere de diferenciar una cantidad radical , se substituirán en lugar de los radicales (II.78) esponentes quebrados , y despues se diferenciará la cantidad por las reglas dadas hasta aquí. $d(\sqrt{x}) = d(x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}dx$; $d(\sqrt[5]{x^3}) = d(x^{\frac{3}{5}}) = \frac{3}{5}x^{-\frac{2}{5}}dx$; $d(\sqrt{aa-xx}) = d(aa-xx)^{\frac{1}{2}}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2}(aa - xx)^{-\frac{1}{2}} d(aa - xx) = - xdx (aa - xx)^{-\frac{1}{2}} \text{ Fig.} \\
 &= \frac{-x dx}{\sqrt{(aa - xx)}}; d\left[x^m \sqrt[q]{(a + bx^n)^p}\right] = d\left[x^m (a + bx^n)^{\frac{p}{q}}\right] \\
 &= x^m d(a + bx^n)^{\frac{p}{q}} + (a + bx^n)^{\frac{p}{q}} d(x^m) = \frac{pnb}{q} x^{m+n-1} dx \\
 &(a + bx^n)^{\frac{p}{q}} - 1 + mx^{m-1} dx (a + bx^n)^{\frac{p}{q}}.
 \end{aligned}$$

335 Aunque bastan las reglas que hemos declarado hasta ahora para diferenciar cualesquiera cantidades, nos parece del caso manifestar tambien quan socorridas son en muchos casos las *substituciones* para la diferenciacion de las cantidades.

Supongamos que se nos ofrezca diferenciar la cantidad $\sqrt{2ax - xx}$: la transformaremos en $(2ax - xx)^{\frac{1}{2}}$, cuya diferencia es $\frac{1}{2}(2ax - xx)^{\frac{1}{2}-1} d(2ax - xx) = \frac{d(2ax - xx)}{2(2ax - xx)^{\frac{1}{2}}}$, y como $d(2ax - xx) = 2adx - 2xdx$, la diferencial que buscamos será $\frac{adx - xdx}{\sqrt{(2ax - xx)}}$. Para diferenciar la misma cantidad por medio de las substituciones, haremos $\sqrt{2ax - xx} = y$, y $2ax - xx = yy$; diferenciando y dividiendo por 2, tendremos $adx - xdx = ydy$; luego $\frac{adx - xdx}{y} = \frac{adx - xdx}{\sqrt{(2ax - xx)}} = dy$, lo mismo que sacamos antes.

La diferencial de $\frac{1}{\sqrt{(2ax - xx)}}$ la sacaríamos haciendo $(2ax - xx)^{-\frac{1}{2}}$, cuya diferencial será $-\frac{1}{2}(2ax - xx)^{-\frac{1}{2}-1} d(2ax - xx) = \frac{-(adx - xdx)}{(2ax - xx)^{\frac{3}{2}}}$. Si la quisiéramos sacar por medio de las substituciones, haríamos $\frac{1}{\sqrt{(2ax - xx)}} = y$; luego $\frac{1}{y} = \sqrt{(2ax - xx)}$; diferenciando ambos miembros

Fig. brosaldrá $\frac{-dy}{y^2} = \frac{adx - xdx}{\sqrt{(2ax - xx)}}$, ó $dy = - y^2 \left(\frac{adx - xdx}{\sqrt{(2ax - xx)}} \right)$
 $= \frac{-(adx - xdx)}{(2ax - xx) \times [\sqrt{(2ax - xx)}]}$ como antes, porque $(2ax - xx) \times$
 $(2ax + xx)^{\frac{1}{2}} = (2ax - xx)^{\frac{3}{2}}$.

336 En todas las reglas que hemos dado hasta ahora para la diferenciacion de las cantidades hemos supuesto que las variables x, y &c. crecen todas á un tiempo; esto es, que en el mismo tiempo que x llega á ser $x + dx$, y llega á ser $y + dy$, y así de las demás. Pero como ocurren casos en que al paso que unas variables crecen, las otras menguan, es preciso espresar esta diferencia en la diferencial, dandola el signo — á la diferencial de la variable que vá en disminucion. Tambien se puede dejar, si se quiere, la diferencial, qual la dán las reglas antecedentes; pero si se hiciese uso de ella para la resolucion de alguna cuestion, convendrá tomar negativamente la cantidad que representare la variable que vá menguando. Con efecto, si y disminuye de una cantidad q , y al tiempo de diferenciar suponemos que y llega á ser $y + dy$, será preciso que $y - q = y + dy$, ó que $-q = dy$, ó que $q = -dy$; por consiguiente será preciso que despues de egecutada la diferenciacion llamemos $-dy$ lo que hubiésemos llamado dy al tiempo de egecutarla.

De las Diferenciales logarítmicas.

144. 337 Si en la linea indefinita AN se toman ácia la derecha las partes AC, CE, EG, GI, IL &c. y ácia la izquierda las partes $AC', C'E', E'G'$ &c. todas iguales las
 unas

unas á las otras , y en los puntos $G', E', C', A, C, E, G, I, L$ se tiran á la AN las perpendiculares $G'H', E'F', C'D', AB, CD, EF, GH, IK, LM$, que formen una progresion geométrica , y representan los números , siendo AB la unidad ; las líneas AC, AE, AG, AI, AL formarán una progresion arismética , espresarán las distancias respectivas á que cada término CD, EF, GH &c. de la progresion geométrica estará de la unidad , ó primer término AB , ó (II. 345) serán los logaritmos de cada término de la espresada progresion geométrica. Y así como AG es tripla de AC , ocupará el número GH el tercer lugar despues de la unidad AB , con tal que CD ocupe el primero , LM ocupará el quinto lugar por ser $AL = 5 AC$.

La curva que pasa por los extremos H', F', D', B, D, F, H &c. de las líneas que forman la progresion geométrica y representan los números , se llama la *Logarítmica* , cuyas abscisas AC, AE &c. son por lo dicho los logaritmos de las ordenadas correspondientes CD, EF &c.

338 Si suponemos que crece la abscisa AP de la cantidad infinitamente pequeña Pp , y que en el punto p se tira la ordenada pm , y la línea Mr paralela á la abscisa AP ; será mr el incremento de PM , esto es, la diferencia entre la ordenada PM y la ordenada pm infinitamente próxima á la primera. Por consiguiente si llamamos AP, x , y PM, y , será $Pp = dx$ y $mr = dy$. 145.

Supongamos ahora que se nos ofrezca tirar en el punto M una tangente á la logarítmica , ó hallar el valor de

la

Fig. la subtangente PT . Los triángulos semejantes mrM , MPT darán $mr : rM :: MP : PT$, ó $dy, dx :: y : PT = \frac{ydx}{dy}$.

339 De la naturaleza de la logarítmica, y de lo dicho (II. 352) se sigue que siendo $x = Ly$, será $x + dx = AL(y + dy) = ALy + A\left(\frac{dy}{y} - \frac{(dy)^2}{2y^2} + \frac{(dy)^3}{3y^3} \&c\right)$. Pero una vez que $x = ALy$, es preciso que $dx = A\left(\frac{dy}{y} - \frac{(dy)^2}{2y^2} + \frac{(dy)^3}{3y^3} - \&c\right)$. Y como las cantidades $(dy)^2$, $(dy)^3$ &c. son despreciables, será $dx = \frac{A dy}{y}$; substituyendo este valor en la espresion $\frac{ydx}{dy} = PT$, sacaremos $PT = A$, esto es, que la subtangente de la logarítmica es igual al módulo.

340 Será, pues, $\frac{ydx}{dy} = A$ la equacion de la logarítmica. Pero sacaremos otra, si llamamos c el número cuyo logaritmo natural es 1. Porque la propiedad de la curva nos dá $x = ALy = xLc$; luego (II. 347) $y^A = c^x$, que será otra equacion de la logarítmica.

341 Como en general $x = ALy$, la equacion $dx = \frac{A dy}{y}$ nos está diciendo que la diferencial del logaritmo x de la cantidad y , es igual á la diferencial de la cantidad misma multiplicada por el módulo y dividida por la misma cantidad.

342 Si llamamos B la subtangente de otra logarítmica, y buscamos en ella el valor de la abscisa u que corresponde á la misma ordenada y ; quiero decir que si en una logarítmica cuya subtangente $= B$ buscamos qual será el logaritmo u del mismo número y , sacaremos por el mismo método $u = BLy$, y por consiguiente $x : u :: ALy : BLy :: A : B$, cuya proporcion manifiesta que en dos logarí-

rítmicas diferentes, las abscisas correspondientes á una misma ordenada, ó los logaritmos correspondientes á un mismo número, están en la misma razon que los módulos ó las subtangentes de las logarítmicas.

343 Quanto digamos acerca de las cantidades logarítmicas debe entenderse en el supuesto de ser el módulo = 1, y entónces la espresion $dx = \frac{Ady}{y}$ es $dx = \frac{dy}{y}$, y nos está diciendo que la diferencia del logaritmo natural de una cantidad es igual á la diferencial de dicha cantidad dividida por la cantidad misma.

344 Todo esto supuesto, será facil percibir el fundamento de los egeмпlos siguientes. $dLx = \frac{dx}{x}$; $dL(a+x) = \frac{d(a+x)}{a+x} = \frac{dx}{a+x}$; $dL\left(\frac{a}{a+x}\right) = d[L a - L(a+x)] = -\frac{d(a+x)}{a+x} = -\frac{dx}{a+x}$, teniendo presente que la constante La no tiene diferencial.

Los mismos principios demuestran que $dL \frac{1}{x} = d(L1 - Lx) = -\frac{dx}{x}$; $dL(x^2) = d(2Lx) = \frac{2dx}{x}$; $dL(xy) = d(Lx + Ly) = \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y}$; $d(L\frac{x}{y}) = d(Lx - Ly) = \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y}$; $dL\left(\frac{a+x}{a-x}\right) = d[L(a+x) - L(a-x)] = \frac{dx}{a+x} + \frac{dx}{a-x}$; $d[L(aa+xx)] = \frac{2x dx}{aa+xx}$; $dL\sqrt{(aa+xx)} = \frac{d\sqrt{(aa+xx)}}{\sqrt{(aa+xx)}} = \frac{x dx}{\sqrt{(aa+xx)} \cdot \sqrt{(aa+xx)}} = \frac{x dx}{aa+xx}$; tambien tendremos $dL\sqrt{(aa+xx)} = dL(aa+xx)^{\frac{1}{2}} = d\left[\frac{1}{2}L(aa+xx)\right] = \frac{x dx}{aa+xx}$; $dL[x^m(a+bx^n)^p] = d[Lx^m + L(a+bx^n)^p] = d[mLx + pL(a+bx^n)] = \frac{mdx}{x} + \frac{npbx^{n-1}dx}{a+bx^n}$.

Fig. De la diferenciacion de las cantidades esponenciales.

345 Llamamos *cantidades esponenciales* las que están elevadas á alguna potencia cuyo esponente es variable; tales son, por egemplo, a^x ; y^x ; $a^x y^x$; $a^x + y^x$ &c.

346 Hay cantidades esponenciales de primero, segundo &c grado. Las de primer grado son todas aquellas cuyo esponente no es mas que una indeterminada; tales son a^y , b^x , z^t , en el supuesto de ser y , x , t no mas que variables. Las esponenciales de segundo grado son aquellas cuyo esponente es una esponencial del primer grado; tal sería a^{x^y} , y así de las demás. En general, una esponencial de un grado qualquiera lleva por esponente una esponencial del grado precedente.

347 Lo que acabamos de decir acerca de las cantidades esponenciales debe entenderse igualmente de las equaciones esponenciales, que son todas aquellas cuyos términos son todos, ó algunos de ellos cantidades esponenciales. Las curvas cuya naturaleza está cifrada en alguna equacion esponencial, se llaman tambien curvas esponenciales. Quando en la equacion de una curva esponencial hay esponenciales de diferentes grados, la equacion y la curva que representa, toman el nombre de la esponencial de grado mayor.

348 Es facil transformar una equacion esponencial en otra equacion que contiene los logaritmos de las cantidades de la primera. Si tuviéramos, por egemplo, $a^x = b^y$,

b^y , sacaremos $L(a^x) = L(b^y)$, porque si son iguales dos Fig. cantidades, lo serán tambien sus logaritmos. Como (II. 347) $La^x = xLa$, y $L(b^y) = yLb$, quedará $a^x = b^y$ transformada en estotra $xLa = yLb$, que es mas sencilla.

De $a^x = b^y$ sacaremos $x^i La = y^u Lb$, y de esta última $zLx + L. La = uLy + L. Lb$.

349 Es muy facil la diferenciacion de las cantidades esponenciales. Supongamos, por egemplo, que se nos ofrezca diferenciar x^y ; haremos $x^y = z$; luego $Lx^y = Lz$; por consiguiente $dL(x^y) = \frac{dz}{z}$, y $dz = z dL(x^y)$; de donde sacaremos $d(x^y) = x^y d(Lx^y)$, con substituir en lugar de z y dz sus valores. Luego la *diferencial de una cantidad esponencial se saca multiplicando la esponencial misma por la diferencial de su logaritmo.*

En virtud de esta regla $d(x^y) = x^y d(Lx^y) = x^y d(yLx) = x^y (Lx dy + \frac{y dx}{x})$. Por lo mismo $d(a^x + y^i) = d(a^x) + d(y^i) = a^x d(La^x) + y^i d(Ly^i) = a^x d(xLa) + y^i d(zLy) = a^x dxLa + y^i (dzLy + \frac{z dy}{y})$. La diferencial de $(aa + xx)^x$ será $(aa + xx)^x. dL(aa + xx)^x = (aa + xx)^x d[xL(aa + xx)] = (aa + xx)^x [dxL(aa + xx) + \frac{2x dx}{aa + xx}]$.

Si hubiéramos de diferenciar la esponencial c^x , siendo c la cantidad cuyo logaritmo $= 1$; sería, en virtud de lo dicho, la diferencial de la espresada cantidad $c^x d(Lc^x)$, que se reduce á $c^x d(xLc) = c^x dxLc$; y como suponemos que $Lc = 1$, resulta que $d(c^x) = c^x dx$, esto es, que la diferencial de esta esponencial particular es igual á

Fig. la esponencial misma multiplicada por la diferencial de su esponente.

De las diferenciales de los senos, cosenos &c.

146. 350 Supongamos que sea AB un cuadrante de círculo cuyo radio $AC = r$; si llamamos u el arco BM ; su seno QM , x ; será su coseno $QC = \sqrt{rr - xx}$; $M'N = dx$, y $MM' = du$. Los triángulos semejantes $M'NM$, CQM darán esta proporcion $CQ : CM :: M'N : MM'$ ó $\sqrt{rr - xx} : r :: dx : du = \frac{rdx}{\sqrt{rr - xx}}$.

351 Luego si el radio del círculo fuere $= 1$, sacaremos que $\frac{dx}{\sqrt{1 - xx}}$ sería la diferencial de un arco u cuyo seno es x .

352 De donde inferiremos que siendo u un arco cuyo radio $= 1$, será $du = \frac{d(\text{sen } u)}{\cos u}$, y por consiguiente $d(\text{sen } u) = du \cdot \cos u$; esto es, que la diferencial del seno de un arco cuyo radio es la unidad, es igual á la diferencial del mismo arco multiplicada por su coseno.

146. 353 En el mismo supuesto de ser $CA = r$; BM , u ; el coseno PM del arco BM , x ; su seno MQ será $= \sqrt{rr + xx}$; $MM' = du$, y $MN = -dx$, porque quando el arco BM crece y llega á ser $u + du$, su coseno mengua (II.364) y llega á ser $x - dx$. Sentado esto, los triángulos semejantes CPM , MNM' darán $PC : CM :: M'N : MM'$, ó $\sqrt{rr + xx} : r :: -dx : du = \frac{-rdx}{\sqrt{rr + xx}}$.

354 Luego tambien será verdad que en el supuesto de ser

ser el radio $\equiv 1$, u un arco, x su coseno, será $du = \frac{-dx}{\sqrt{1-xx}}$. Fig.

355 Luego $du \times \sqrt{1-xx} = -dx$, ó $dx = -du\sqrt{1-xx}$, cuya espresion significa que la diferencial del coseno de un ángulo cuyo radio $\equiv 1$, es igual á la diferencial del ángulo mismo tomada negativamente, y multiplicada por su seno.

356 Si proseguimos suponiendo que sea el radio AC 147. $\equiv r$; y llamamos el arco AM , u ; su tangente AT , x ; será $MM' \equiv du$, y $TT' \equiv dx$; y si tiramos la TR perpendicular á CT' , resultarán dos triángulos semejantes CMM' , CTR . Los triángulos CAT , TRT' serán tambien semejantes; porque los triángulos ACT , ACT' son semejantes, pues sobre ser comun á ambos el ángulo recto A , los ángulos ACT , ACT' son iguales, porque no discrepan el uno del otro, sino del ángulo infinitamente pequeño TCT' . Pero los triángulos ACT' , TRT' son tambien semejantes, pues sobre ser rectángulos, el uno en A , y el otro R , tienen comun el ángulo T' ; luego serán semejantes los triángulos CAT' , TRT' .

Sentado esto, de los triángulos CMM' CTR sacaremos $CT:CM::TR:MM'$, y los triángulos TRT' , CAT darán $CT:CA::TT':TR$. Si multiplicamos ordenadamente estas dos proporciones, sacaremos $(CT)^2:CM \times CA::TR \times TT':TR \times MM'::TT':MM'$; substituyendo en lugar de las líneas sus valores literales, y considerando que $(CT)^2 \equiv rr + xx$, sacaremos finalmente $rr + xx:rr:dx:du \equiv \frac{rrdx}{rr+xx}$.

Fig. 357 Luego si el radio del círculo fuese $= r$, haríamos por el mismo camino que la diferencia de su arco AM , cuya tangente es x , ó que du sería $= \frac{dx}{1+xx}$.

358 Luego tambien es verdad, que siendo el radio $= 1$, $du = \frac{d(\text{tang } u)}{1+(\text{tang } u)^2} = \frac{d(\text{tang } u)}{(\sec u)^2}$, y por lo mismo $du(1+(\text{tang } u)^2) = du(\sec u)^2 = d(\text{tang } u)$.

Como $\text{tang } u = \frac{\text{sen } u}{\cos u}$ (II. 367), sacaríamos igualmente que $d(\text{tang } u) = d\left(\frac{\text{sen } u}{\cos u}\right) = d[(\text{sen } u)(\cos u)^{-1}]$ que por lo dicho (326 y 352) $= du \cos u (\cos u)^{-1} + du(\text{sen } u)^2 (\cos u)^{-2} = \frac{du \cos u}{\cos u} + \frac{du(\text{sen } u)^2}{(\cos u)^2} = \frac{du(\cos u)^2 + du(\text{sen } u)^2}{(\cos u)^2} = \frac{du}{(\cos u)^2}$, porque $(\cos u)^2 + (\text{sen } u)^2 = 1$.

359 Luego la diferencial de la tangente de un arco cuyo radio $= 1$ es igual á la diferencial del arco mismo dividida por el quadrado de su coseno.

360 De donde tambien inferiremos que la diferencial de un ángulo es igual á la diferencial de su tangente, multiplicada por el quadrado de su coseno; porque de $d(\text{tang } u) = \frac{du}{(\cos u)^2}$, sacaremos $du = (\cos u)^2 d(\text{tang } u)$.

361 De aquí inferirémos la diferencial de la cotangente de un arco u , cuyo radio $= 1$. Porque segun hemos visto (II. 368) $\text{tang } u = \frac{1}{\cot u} = \frac{\text{sen } u}{\cos u}$. Por consiguiente, si substituimos la diferencial de $\frac{1}{\cot u}$, que por lo dicho (329) es $-\frac{d(\cot u)}{(\cot u)^2}$ en lugar de $d(\text{tang } u)$ en la equacion $du = d(\text{tang } u) \times (\cos u)^2$, resultará $du = -\frac{d \cot u}{(\cot u)^2} \times (\cos u)^2 = -d \cot u \times (\cos u)^2 \times \frac{1}{(\cot u)^2} = -d \cot u \times (\cos u)^2 \times \frac{(\text{sen } u)^2}{(\cos u)^2} = -d \cot u \times (\text{sen } u)^2$; finalmente $du = -d \cot u (\text{sen } u)^2$ que dá $\frac{-du}{(\text{sen } u)^2} = d \cot u$, y está diciendo que

la

la diferencial de un arco u cuyo radio $= r$ es igual á la Fig.
diferencial de dicho arco tomada negativamente, y divi-
dida por el quadrado de su seno.

362. Sea como antes $= r$ el radio CA del círculo, 147.
cuyo quadrante es AB ; y llamemos u el arco AM ; x , su
secante CT . Será $RT' = dx$; $MM' = du$; y la tangente
 $AT = \sqrt{(xx - rr)}$. Tiremos ahora desde el punto C y con
el radio CT el arco TR , resultarán dos triángulos seme-
jantes CMM' , CTR que darán esta proporcion $CM : CT ::$
 $MM' : TR$; esto es, $r : x :: du : TR = \frac{x du}{r}$: Los triángulos
semejantes TRT' , TAC dan estotra proporcion $CA : TA ::$
 $TR : RT'$; esto es, $r : \sqrt{(xx - rr)} :: \frac{x du}{r} : dx$. De donde
sacaremos, despues de multiplicados los extremos y los me-
dios, y de hechas todas las operaciones correspondientes,
 $du = \frac{r dx}{x \sqrt{(xx - rr)}}$.

363. Luego si $r = 1$, será $\frac{x dx}{x \sqrt{(xx - 1)}}$ la diferencial
de un arco ó ángulo cuya secante fuere x .

De algunas Curvas Mecánicas.

364. La naturaleza de todas las curvas de que he-
mos hecho mencion hasta aquí, á excepcion de la logarít-
mica, la hemos visto cifrada en equaciones, cuyos térmi-
nos eran todos cantidades del cálculo algebráico, sin ha-
ber cantidad alguna diferencial; hemos visto tambien que
las coordenadas de dichas curvas son lineas rectas, mante-
niéndose las ordenadas constantemente paralelas las unas á las
otras, y por este motivo las hemos llamado *Curvas alge-*

Fig. *bráicas* ó *geométricas*, conformándonos con la práctica de todos los Matemáticos. Pide, pues, la claridad, igualmente que la exactitud, que demos otro nombre á todas las curvas en quienes no concurren las mencionadas circunstancias, y esta es la razon de llamarse *Curvas trascendentes* ó *mecánicas*. Son, pues, mecánicas todas las curvas 1.º en cuya equacion hay cantidades infinitamente pequeñas, que representan sus coordenadas, de las quales puede ser la una ó pueden ser ambas arcos de curvas, ó son tales que no se encuentran, y no forman una con otra ángulo ninguno. 2.º cuyas ordenadas pueden no ser paralelas las unas á las otras, y pueden salir todas desde un mismo punto. 3.º cuya naturaleza no puede cifrarse en una equacion, cuyos términos sean todos cantidades del cálculo algebráico, siendo preciso que contenga cantidades diferenciales. 4.º su equacion diferencial ha de espresar no obstante la relacion que hay entre todos los puntos de la curva, y todos los puntos de otra linea recta ó curva; por manera que quadre dicha equacion con cada uno de los puntos de la curva.

De la Quadratriz de Dinostrates.

148. 365 La primera curva mecánica que consideraremos es la Quadratriz de Dinostrates, cuya generacion es como sigue. Si dado el cuadrante de círculo *ADC*, y la tangente *AH*, se le hace dar al radio *AB* la vuelta al rededor del centro *B*, y anda en tiempos iguales arcos iguales de la circunferencia *ADC*; y al mismo tiempo concebimos que

que la recta AH baja á lo largo del radio AB , manteniéndose constantemente paralela á sí misma, y andando tambien en tiempos iguales porciones iguales del radio; por manera que en el tiempo que AH anda la quarta parte del radio AB , el radio AB ande la quarta parte de ADC , y llegan la recta AH , y el radio AB á confundirse ambas á un tiempo con la BC : la interseccion continua E , E' de la linea AH con el radio AB á medida que este dá la vuelta, engendrará la curva AEF que se llama *Quadratrix*, y la inventó *Dinostrates*. Fig.

Para sacar la equacion de la quadratriz llamaremos a 148. el cuadrante de círculo ADC ; el radio AB , b ; las abscisas AG , AG' , x ; los arcos correspondientes AD , AD' &c. del círculo, y . Sentado esto, fundados en la generacion de la curva, podemos decir: Como la circunferencia ADC , andada en un minuto, por egemplo, es al radio AB , andado tambien en un minuto; así el arco AD , andado en un quarto de minuto es á la linea AG , andada tambien en un quarto de minuto; ó $a : b :: y : x$; luego $ax = by$, é $y = \frac{ax}{b}$.

Es la quadratriz, segun se echa de ver, una curva mecánica, porque los arcos AD , AD' sirven de aplicadas; las abscisas, y las ordenadas no se encuentran sino en el punto A ; y para sacar cabal la relacion que hay entre las x y las y , sería indispensable conocer exactamente la razon que hay entre arcos de círculo, y lineas rectas.

Fig.

De la Espiral de Arquímedes.

366 Supongamos que el círculo $ABCD$ y su radio aA estén divididos en un mismo número de partes
 149. iguales, en doce por ejemplo; y supongamos también que mientras el radio aA anda partes iguales de la circunferencia en tiempos iguales, caminando desde A ácia B , C , D &c. el punto central a ande también en tiempos iguales partes iguales del radio, caminando desde a ácia A ; por manera que quando el punto A del radio vuelve á A de donde salió, el punto a del mismo radio llegue también á A ; el punto a trazará en fuerza de estos dos movimientos la curva $abcdA$, que se llama la *Primera espiral de Arquímedes* su inventor. Para trazar la segunda $AghiF$, sería menester suponer que el punto a después de llegado á A , prosiga andando la línea $AF = aA$ del radio prolongado, mientras el nuevo radio aF anda la circunferencia del segundo círculo $FGHI$ concéntrico con el primero, caminando siempre partes iguales en tiempos iguales. Y como se puede prolongar al infinito el radio aF , se pueden trazar una infinidad de espirales que podremos considerar como la continuación de una sola curva.

Para hallar la equacion de la primera espiral perteneciente á uno qualquiera de sus puntos c , llamémosla a la circunferencia del primer círculo dado $ABCD$; y al radio dado aA , b ; tomaremos por una abscisa, x , el arco indeterminado ABC ; y llamémosla y una ordenada $ac =$

a6. Porque quando el radio aA hubiese llegado á aC , el punto 6 se confundirá con el punto c . Todo esto sentado, 149. es evidente que ha de haber la misma razon entre toda la circunferencia a del círculo andada en un minuto, por egemplo, y el arco ABC , x , andado en medio minuto, que entre el radio b andado tambien en un minuto, y su porcion $a6 = ac$, $= y$ andada en medio minuto; esto es, que $a : x :: b : y$; luego $ay = bx$, é $y = \frac{bx}{a}$. La misma equacion sacariamos respecto de otra espiral $Aghi$, con llamar la circunferencia de su círculo $FGHI$, a ; la recta AF , b ; un arco qualquiera FG del círculo, x ; y la porcion correspondiente An del radio $= Bg$, y .

Es la espiral una curva mecánica, porque sus abscisas x son arcos de círculo; sus ordenadas ab , ac , ad &c. salen todas de un mismo punto, y no son por consiguiente paralelas las unas á las otras; las coordenadas ABC , ac no se cortan ni forman unas con otras ángulo ninguno. Para conocer exacta y geométricamente la relacion que tienen las abscisas con las ordenadas, sería indispensable conocer la relacion que hay entre arcos de círculo y lineas rectas. Si consideramos como una sola espiral las espirales que se pueden trazar al infinito con prolongar aF , la misma linea aAF que será su ege, la encontrará en una infinidad de puntos.

De la Espiral parabólica ó Parábola helicoide.

367 Si en el círculo $ACaF$ cuyo centro es B , to- 150.

ma-

Fig. mamos un punto fijo A , tiramos los radios CB, cB , y tomamos en ellos las CD, cd medias proporcionales entre
 150. los arcos correspondientes AC, Ac y una recta dada b ; la curva que pasare por todos los puntos D, d se llama *Espiral parabólica* ó *Parábola helicoide*, que es evidentemente una curva mecánica.












Para hallar su equacion, llamaremos b el radio BC del círculo; los arcos AC, Ac, x , que serán las abscisas; las ordenadas DC, Dc, y ; y como por la construccion $(DC)^2 = AC \times b$ ó $yy = bx$, esta será la equacion de la curva que es la misma que la de la parábola vulgar, suponiendo que su ege se ha transformado en círculo.

Como despues de haber tomado las AC, Ac que hay en la circunferencia, se pueden volver á tomar mirando el punto A como su origen, de modo que las abscisas sean toda la circunferencia que llamaremos c mas AC , ó $c + x$, $2c + x$ &c. la curva dará una infinidad de vueltas.

De la Espiral hyperbólica.

151. 368 Si desde el punto C de la linea indefinita CP como centro, se trazan arcos AG, QM, PO &c. iguales los unos á los otros, y por sus extremos G, M, O &c. se traza una curva $CKGMO$, dicha curva se llamará *Espiral hyperbólica*.

Para sacar su equacion llamaremos CA, a ; AN, x ; CM, y ; $AG = QM = b$; y tendremos $x : b :: a : y$, y $xy = ab$, cuya equacion se parece á la de la hypérbola
 re-





refiriéndola á sus asyíntotas. De $xy = ab$ sacaremos $y = \frac{a}{x}$; Fig. 151.
 y si llamamos c la circunferencia cuyo radio $= a$, y substituimos succesivamente en lugar de x , $c + x$, $2c + x$
 $\&c \dots mc + x$, tendrémós succesivamente $y = \frac{ab}{c+x}$,
 $y = \frac{ab}{2c+x} \dots y = \frac{ab}{mc+x}$. De donde se sigue, que quanto mayor fuere la abscisa, tanto menor será la ordenada, y que esta es cero quando m es infinita. Por consiguiente la espiral hypérbolica dá una infinidad de vueltas al rededor de su centro antes de llegar á él.

De la Cycloide.

369 Imaginemos que el círculo GHK toque la línea DE , de modo que al principio el punto H de la circunferencia, y el punto D de la línea DE se confundan uno con otro: que el círculo dé la vuelta sobre la recta DE , con la circunstancia de que todos los puntos de la circunferencia se apliquen succesivamente sobre los puntos de la recta: el punto H trazará en virtud de este movimiento la curva $DHBE$ que se llama *Cycloide* ó *Trochoyde*. 152.

Para manifestar su naturaleza, imaginemos que ha llegado el círculo á la situacion GHK , quando llega á H el punto que traza la curva, y que se tire entonces el diámetro GK perpendicular á DE . Quando el punto generador H se confundiere con el punto B , que es el mas distante de la recta DE , y esté el círculo en la situacion AFB , se tirará por el punto H la HI paralela á DE , que cortará GK en L , y en F la circunferencia AFB : tírense las
 cuer-

Fig. cuerdas HG, FA . Una vez que los arcos HG, FA de círculos iguales están comprendidos entre unas mismas paralelas HI, DA , serán iguales; luego tambien lo serán las cuerdas HG, FA , y los ángulos HGK, FAB ; luego las cuerdas HG y FA serán iguales y paralelas, y será el quadri-látero $HGAF$ un paralelogramo.

Sentado esto, como la circunferencia AFB se ha aplicado sucesivamente á la linea DA , será igual á esta linea, y por la misma razon el arco HG ó su igual AF será igual á la recta DG : por consiguiente el arco BF será igual á la recta GA ; y como $GA = HF$, será $FB = HF$. Mirando, pues, HI como la ordenada de la cycloide, tirada desde el punto H perpendicularmente á su ege BA , podemos decir que la parte HF de la ordenada siempre es igual al arco correspondiente BF del círculo generador. Y como la otra porcion FI de la ordenada es el seno del mismo arco, que llamaremos u , tendremos para expresar la naturaleza de la cycloide esta equacion $y = u + \text{sen } u$.

Si el círculo generador no tuviese otro movimiento que el de rotacion, la cycloide se llamará *Cycloide vulgar*. Pero si al mismo tiempo tuviere algun movimiento de translacion ácia E , la cycloide que el punto H trazare, se llamará *Cycloide acortada*; y si el movimiento de translacion fuere ácia D , engendrará el punto H la *Cycloide prolongada*. Es evidente que en la cycloide vulgar la base DE es igual á la circunferencia del círculo generador, que es menor

nor en la cycloide acortada , y mayor en la cycloide prolongada. Fig.

En virtud de esto , podemos cifrar la naturaleza de la cycloide en una equacion mas general todavia que la que dimos poco há. Porque si hacemos $HF = \frac{b}{a}BF$, convendrá esta espresion á la cycloide vulgar , ó la acortada , ó la prolongada , segun fuere b igual , menor ó mayor que a : por manera que la equacion general de la curva será $y = \frac{b}{a}u + \sin u$.

Aplicacion del Cálculo diferencial á la doctrina de las lineas curvas.

370 Ahora indagaremos acerca de las curvas los puntos que especificamos (32), y otros muchos, cuya averiguacion hubiera sido mas dificultosa , y respecto de algunos imposible , por el álgebra comun. Este es el motivo que nos obligó á dejar para este lugar su investigacion , en que nos podremos empeñar por un término sumamente general ; aplicándose el nuevo medio de que nos podemos valer á las curvas mecánicas igualmente que á las geométricas.

De las tangentes , subtangentes , normales &c. de las lineas curvas.

371 Indagarémos primero cómo se le ha de tirar una tangente á una curva qualquiera , cuya equacion es dada. Porque esto nos manifestará qué ángulo forma la curva en

el

Fig. el punto de contacto con su ordenada ó con el ege de las abscisas , y por consiguiente ácia qué lado volverá su convexidad ó su concavidad.

372 Para tirar una tangente á una linea curva qualquiera AM , se considerará dicha curva como un polígono de una infinidad de lados infinitamente pequeños ; la prolongacion MT de uno de sus lados Mm será su tangente que determinaremos respecto de cada punto M , con calcular el valor de la *subtangente* PT , ó de la porcion de la linea en la qual se cuentan las abscisas , comprehendida entre la ordenada PM , y el punto T de la tangente.

Por lo que mira al valor de la subtangente , le calcularemos imaginando tiradas por los dos extremos M y m del lado infinitamente pequeño Mm las dos ordenadas MP , mp , y por el punto M la linea Mr paralela á AP ege de las abscisas. El triángulo infinitamente pequeño Mrm será semejante al triángulo finito TPM , de donde sacaremos esta proporcion $rm : rM :: PM : PT$. Por consiguiente , si llamamos AP , x ; PM , y ; Pp , ó su igual Mr será evidentemente dx ; y rm será dy ; tendremos , pues , $dy : dx :: y : PT = \frac{ydx}{dy}$. Esta es la fórmula general para determinar la subtangente de qualquiera curva , ora formen las ordenadas con las abscisas un ángulo recto , ora formen otro ángulo qualquiera , con tal que las y sean constantemente paralelas las unas á las otras.

Supongamos ahora , para manifestar la aplicacion de este método , que la naturaleza de la curva AM esté cifrada

da en una equacion qualquiera que no lleva mas variables *Fig.* que x é y , y cantidades constantes. No habrá en dicha equacion, despues de diferenciada, ni podrá haber sino términos multiplicados por dx , y otros multiplicados por dy ; será, pues, facil sacar de dicha equacion diferencial el valor de $\frac{dx}{dy}$, en cuyo valor no habrá sino x é y , y constantes; substituyendo este valor en la fórmula $\frac{ydx}{dy}$ ó $y \times \frac{dx}{dy}$, resultará el valor de la subtangente en x, y y constantes: finalmente, substituyendo en lugar de y su valor espresado en x , sacado de la equacion de la misma curva, el valor que saliere espresará el valor de la subtangente solo en x y constantes; y para determinar el valor de la subtangente respecto de un punto qualquiera M , solo restará substituir en este último resultado en lugar de x , el valor de la abscisa AP , que correspondiese á dicho punto M .

373 Por el mismo rumbo determinaremos las tangentes, las normales, subnormales, &c. Llamamos *Normal* 153 de una curva la perpendicular que se la tira desde un punto de su ege; QM es la normal de la curva AM . La *Subnormal* es la porcion del ege comprehendida entre el punto donde la ordenada encuentra el ege, y el punto desde el qual se ha tirado la normal; QP es la subnormal de la curva AM .

Supongamos, para huir por ahora de casos complicados, que las y sean perpendiculares á las x : para hallar la tangente volveremos á comparar el triángulo Mmr con el triángulo PTM , y sacaremos $rm : Mm :: PM : TM$; pero por

Fig. por ser rectángulo el triángulo Mrm , $Mm = \sqrt{[(rM)^2 + (rm)^2]} = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$; luego $dy : \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} :: y : TM$; luego $TM = \frac{y\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}}{dy} = \frac{y\sqrt{[(dx)^2 + (dy)^2]}}{\sqrt{(dy)^2}} = y\sqrt{\frac{(dx)^2 + (dy)^2}{(dy)^2}} = y\sqrt{\frac{(dx)^2}{(dy)^2} + 1}$. Por consiguiente despues de diferenciada la equacion de la curva sacaremos el valor de $\frac{dx}{dy}$, substituiremos su quadrado en la espresion de la tangente, substituiremos despues en lugar de y su valor en x , y constantes, sacado de la equacion de la curva, y resultará la espresion de la tangente en x , y constantes.

Para hallar la subnormal, imaginaremos la linea MQ perpendicular á la tangente TM , y de los triángulos Mrm , MPQ que son semejantes, inferirémos $Mr : rm :: PM : PQ$, esto es, $dx : dy :: y : PQ = \frac{ydy}{dx}$. Luego despues de sacado de la equacion diferenciada de la curva el valor de $\frac{dy}{dx}$, se substituirá en $\frac{ydy}{dx}$, y concluyendo resultará el valor de la subnormal en x y constantes.

Apliquemos, con la mira de hacer mas perceptible el método, la fórmula de las subtangentes y de las subnormales á la equacion de la parábola que es $yy = px$ (46). Diferenciando, saldrá $2ydy = pdx$; luego $\frac{dx}{dy} = \frac{2y}{p}$, y $\frac{dy}{dx} = \frac{p}{2y}$; luego la subtangente $\frac{ydx}{dy} = \frac{2y^2}{p} = \frac{2px}{p} = 2x$; y la subnormal $\frac{ydy}{dx} = \frac{py}{2y} = \frac{p}{2}$, cuyos valores son identicamente los mismos que sacamos (63 y 65).

374 Quando la equacion de la curva es tal que al passo que $AP = x$ crece, y mengua; entónces la linea rM será

354. — dy (336), y la proporcion $rM : rm :: PM : PT$, que

sir-

sirve para hallar la subtangente, viene á ser $-dy:dx::$ Fig. $y:PT = -\frac{ydx}{dy}$, cuya espresion en nada altera la práctica del método declarado: no hay mas novedad sino que la tangente en lugar de caer á la parte del origen A de las abscisas, respecto de la ordenada PM , caerá á la parte opuesta. En virtud de esto, la fórmula $\frac{ydx}{dy}$ podrá servir en todos los casos para determinar las subtangentes. Quando las ordenadas fueren menguando, el valor de $\frac{ydx}{dy}$ saldrá negativo y manifestará que la linea cuya espresion es, se deberá tomar á la parte opuesta respecto del origen de las x .

Por egemplo, la equacion del círculo, fijando en el centro el origen de las coordenadas y llamando a el diámetro AB , es (6) $yy = \frac{1}{4}aa - xx$, en cuyo supuesto se viene á los ojos que á medida que CP ó x creciere, y ó PM menguará; por lo mismo la subtangente PT cae al otro lado de PM respecto del origen C de las abscisas, y lo dá tambien á conocer el cálculo; porque si diferenciamos, sale $2ydy = -2xdx$, y por consiguiente $\frac{dx}{dy} = -\frac{y}{x}$; luego $\frac{ydx}{dy} = \frac{-y^2}{x} = -\frac{(\frac{1}{4}aa - xx)}{x}$ cuya espresion por ser negativa, nos está diciendo que su valor se ha de tomar del otro lado respecto del que se consideró quando se sacó la fórmula $\frac{ydx}{dy}$ de la subtangente.

375 Declarado yá el método de determinar las tangentes, subnormales &c. de las curvas, podremos resolver con facilidad las dos cuestiones siguientes. 1.º Desde un

Fig. punto dado fuera de una curva, tirar una tangente á dicha curva. 2.º Desde un punto dado, donde se quisiere, en el plano de una curva, tirar una perpendicular á dicha curva.

Supongamos que sea DM la tangente que se pide; el
 1156. valor general de $PT = \frac{ydx}{dy}$ se sacará fácilmente de la equacion de la curva. Si tiramos DB paralela á las ordenadas PM ; la linea DB y su distancia BA del origen A de las abscisas, serán conocidas, pues suponemos dado de posicion el punto D . Llamando, pues, DB , b ; AB , g ; AP , x ; y , PM , y ; será $PB = g + x$, y $TB = PT - BP = \frac{ydx}{dy} - x - g$. Pero los triángulos semejantes TBD , TPM dan $TB:BD::TP:PM$; esto es, $\frac{ydx}{dy} - x - g:b::\frac{ydx}{dy}:y::\frac{dx}{dy}:1$; luego $\frac{ydx}{dy} - x - g = \frac{b dx}{dy}$. Substituyendo, pues, en esta equacion el valor de $\frac{dx}{dy}$ sacado de la equacion diferenciada de la curva, saldrá una equacion en x , y y constantes, y substituyendo en ella en lugar de y su valor en x y constantes sacado de la equacion de la curva, resultará una equacion que dará el valor de x correspondiente al punto M donde ha de rematar la tangente; y si fuese posible tirar desde el punto D mas de una tangente, la equacion dará los valores de x correspondientes á los diferentes puntos en que habrian de rematar dichas tangentes.

1157. Para tirar una perpendicular á una curva, supondremos que sea DQ dicha perpendicular, PQ será $\frac{ydy}{dx}$ (373); y usando de las mismas denominaciones que antes, los triángulos semejantes DBQ , MPQ darán $DB:BQ::PM:PQ$;

esto es, $b : g + x + \frac{ydy}{dx} :: y : \frac{ydy}{dx}$ ó $:: 1 : \frac{dy}{dx}$; luego $\frac{hdy}{dx} =$ Fig.
 $g + x + \frac{ydy}{dx}$, de cuya equacion haríamos el mismo uso
 que en el caso antecedente.

376 Aquí nos toca hacer una observacion que á su
 tiempo nos será de muchísima utilidad, y es, que $\frac{dx}{dy}$ espres-
 sa la tangente del ángulo que forma la curva en qualquie-
 ra de sus puntos con la ordenada, y $\frac{dy}{dx}$ espresa la tangen- 153.
 te del ángulo que forma la curva con el ege de las abs-
 cisas. Con efecto, en el triángulo rectángulo Mmr sale (con
 suponer el radio de las tablas $= 1$) $rm : rM :: 1 : \text{tang}$
 rmM , luego $\text{tang } rmM = \frac{rM}{rm} = \frac{dx}{dy}$. Luego si se me pre-
 guntára en qué punto una curva ó su tangente forma con
 la ordenada un ángulo dado, ó cuya tangente es conoci-
 da, llamaría dicha tangente m , y tendría $\frac{dx}{dy} = m$; deter-
 minando despues por medio de la equacion diferenciada de
 la curva el valor de $\frac{dx}{dy}$, é igualandole con m , resultaría
 una equacion de la qual sacaría, despues de substituido en
 ella en lugar de y , su valor en x y constantes sacado de
 la equacion de la curva, el valor ó los valores de x cor-
 respondientes á los puntos donde la curva forma dicho án-
 gulo con su ordenada; y si la curva no formare en pun-
 to alguno un ángulo igual al ángulo dado, sacaría imagi-
 nario el valor ó los valores de x , ó la equacion pararía
 en un absurdo manifiesto.

Por egemplo, respecto de la hypérbola cuya equacion
 fuese $yy = 2(ax + xx)$ sería $\frac{dx}{dy} = \frac{2y}{2a + 4x}$, cuya cantidad
 igualada con m daría $\frac{2y}{2a + 4x}$ ó $\frac{y}{a + 2x} = m$; de donde sa-

Fig. caríamos $y = ma + 2mx$; como la equacion de la curva dá $y = \sqrt{2(ax + xx)}$, sería $ma + 2mx = \sqrt{2(ax + xx)}$, ó quadrando $mma + 4mmax + 4mmxx = 2ax + 2xx$. Si hubiéramos de averiguar en qué punto forma esta hypérbola con su ordenada un ángulo de 45° ; por ser igual (I. 643) al radio la tangente de 45° , sería $m = 1$, cuyo supuesto reduce la equacion á $aa + 4ax + 4xx = 2ax + 2xx$ ó $2xx + 2ax + aa = 0$, de cuya resolucion sacaríamos $x = -\frac{1}{2}a \pm \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}aa\right)} = -\frac{1}{2}a \pm \sqrt{-\frac{1}{4}aa}$; y por ser imaginarios estos valores, hemos de inferir que la hypérbola cuya equacion fuese $yy = 2(ax + xx)$ no formará en punto alguno con su ordenada un ángulo de 45° .

377 En todo lo dicho hasta aquí hemos supuesto que son las ordenadas paralelas las unas á las otras, y que salen de la linea en la qual se cuentan las abscisas. Pero hay muchas curvas, conforme hemos visto (366 &c.), cuyas ordenadas salen todas de un punto fijo; hay otras cuyas abscisas son arcos de otra curva, siendo sus ordenadas lineas rectas ó lineas curvas. No obstante sea la que fuere la naturaleza de las lineas á las quales se refieren los puntos de la curva principal, siempre estará cifrada ó se podrá cifrar en una equacion la relacion entre sus abscisas y sus ordenadas. Quando se hiciere uso de esta equacion para determinar las tangentes ú otras lineas, será preciso valerse, quanto sea posible, para determinar dichas tangentes, de lineas que no contengan diferenciales distintas de las que llevare la equacion de la curva.

Va. Con los egemplos nos daremos mejor á entender.

Fig.

378 Supongamos primero que siendo AM una curva conocida á la qual sabemos tirar una tangente, sea BS otra curva cuyas abscisas son los arcos AM de la primera, y las ordenadas las lineas MS paralelas á una linea dada. ¿Cómo se podria tirar una tangente en un punto S de la curva BS , en el supuesto de estar cifrada en una equation qualquiera la relacion entre AM y MS ?

Imaginaremos el arco infinitamente pequeño Ss , cuya prolongacion SQ que es la tangente, encuentra en Q la tangente MT correspondiente al punto M de la curva AM ; y con tirar la linea SK paralela á MT ó á Mm , el triángulo SKs será semejante al triángulo QMS ; por manera que tendremos $sK : SK :: MS : MQ$; pero si llamamos el arco AM , x ; y la ordenada MS , y ; será $Mm = SK = dx$, y $sK = sm - SM = dy$; luego $dy : dx :: y : MQ = \frac{ydx}{dy}$; por consiguiente si en la tangente MT tomamos la parte MQ igual al valor de $\frac{ydx}{dy}$ que determinaremos por medio de la diferenciacion de la equation de la curva, hallaremos el punto Q , y si por este punto y el punto S tiramos la SQ , será esta linea la tangente de la curva.

379 Si la equation de la curva cuya tangente se ha de determinar, en vez de espresar la relacion entre AM y MS , espresára la relacion entre AM y PS ; quiero decir que si las abscisas x fuesen los arcos AM , y las ordenadas PMS ó y se contáran desde una linea recta determinada AP ; en este caso se tiraría su paralela á AP , y se

Fig. determinaría la subtangente PI en la línea AP del modo siguiente.

Como suponemos conocida la curva AM , conocemos el valor de la subtangente y tangente correspondientes á cada uno de sus puntos; por consiguiente si tiramos Mr paralela á AP , y llamamos PT , s ; TM , t , y comparamos los triángulos semejantes TPM , Mrm , inferiremos $TP:TM::Mr:Mm$, esto es, $s:t::Mr:dx$; luego $Mr = \frac{sdx}{t} = Su$. Si comparamos despues los triángulos semejantes Sus , IPS , sacaremos $su:Su::PS:PI$; y como PS es aquí y , su será dy ; luego $dy:\frac{sdx}{t}::y:PI = \frac{sydx}{tdy}$. Por lo que, si diferenciamos la equacion de la curva, sacaremos el valor de $\frac{dx}{dy}$, y substituyéndole en $\frac{sydx}{tdy}$, sacaremos últimamente el valor de PI , en que no habrá mas diferencias.

380 En algunas ocasiones no espresa la equacion de la curva la relacion entre sus abscisas y sus ordenadas, sino la relacion que se supone haber entre las ordenadas de la curva propuesta, y las ordenadas de otras curvas conocidas. Para tirar las tangentes en estos casos, se practicará lo siguiente. Supongamos, por egemplo, que la curva BMS resulte de las dos curvas conocidas AL y CN , por medio de una equacion entre las ordenadas correspondientes PL , PM , PN , que llamaremos respectivamente x , y , z . Una vez que suponemos conocidas las curvas AL y CN , hemos de suponer tambien conocidas sus subtangentes PS y PR ; llamemos, pues, PS , s ; y PR , t ; é imaginemos la

ordenada infinitamente próxima $pnml$, y las líneas Lu , Mr , $Fig.$
 on paralelas á AP . De los triángulos semejantes LPS , luL
 inferirémos $PS: PL:: Lu: ul$, esto es, $s: x:: Lu: dx$; luego
 $Lu = \frac{sdx}{x} = Mr = on$. Pero los triángulos semejantes TPM ,
 Mrm dán $rm: Mr:: PM: PT$, esto es, $dy: \frac{sdx}{x}:: y: PT$; luego
 $PT = \frac{sydx}{x dy}$. Por consiguiente si no hubiera en la equacion
 de la curva mas indeterminadas que x é y , hallaríamos,
 con diferenciarla, el valor de $\frac{dx}{dy}$, cuyo valor substituido
 en $\frac{sydx}{x dy}$ nos manifestaria el valor de PT , sin diferencia algu-
 na; pero como en la espresada equacion hay las tres varia-
 bles x, y, z , estarán tambien dx, dy, dz en su diferencial; es
 pues indispensable sacar el valor de dz en dx ó dy . Acudi-
 remos para conseguirlo á los triángulos semejantes Non ,
 NPR que nos darán $No: on$ ó $Lu:: NP: PR$; esto es,
 $— dz: \frac{sdx}{x}:: z: t$, porque como PN mengua al paso que
 PM crece, su diferencia No ó dz será negativa; luego
 $dz = — \frac{szdx}{tx}$; y substituyendo en la equacion diferencia-
 da de la curva la cantidad $\frac{szdx}{tx}$ en lugar de dz , hallaremos
 facilmente el valor de $\frac{dx}{dy}$, para substituirle en la fórmula
 $\frac{sydx}{x dy}$ de la subtangente.

Para aclarar lo que acabamos de decir, supongamos
 que AL y CN sean dos curvas conocidas cualesquiera, y
 sea siempre la ordenada PM media proporcional entre PL
 y PN ; será $x: y:: y: z$, ó $xz = yy$ la equacion de la
 curva BM . Si la diferenciamos, sacaremos $x dz + z dx =$
 $2y dy$, y substituyendo en lugar de dz su valor general
 $— \frac{szdx}{tx}$, resultará $— \frac{szdx}{t} + z dx = 2y dy$; de donde infe-

Fig. tirémos $\frac{dx}{dy} = \frac{2ty}{x(t-s)}$; luego PT ó $\frac{sydx}{x dy}$ se transformará en $\frac{2sty^2}{x(t-s)}$, ó en $\frac{2st}{t-s}$, despues de substituido en lugar de y^2 su valor xz , y hecha la reduccion correspondiente. Luego finalmente $PT = \frac{2st}{t-s}$.

381 Quando las ordenadas salen todas de un punto fijo, se toman por abscisas los arcos de una curva conocida que las mas veces es un círculo; quiero decir que en este último caso la equacion espresa la relacion entre la ordenada CM y el ángulo ACM que forma dicha linea con una linea fija AC ; ó espresa la relacion de la misma ordenada CM con el arco OS trazado con un radio determinado.

Para tirar las tangentes en el caso de representar la equacion la relacion entre la ordenada CM y el ángulo ACM ó el arco OS , se supone respecto de cada punto M , tirada á la CM la perpendicular CT que encuentre la tangente TM en T ; hecho esto, se concibe trazado el arco infinitamente pequeño Mm , y tirando la ordenada mC , se supone trazado con el radio CM , el arco Mr que puede considerarse como una linea recta perpendicular en el punto r á la linea Cm . Los triángulos Mrm , TCM son semejantes, y dán $rm : Mr :: y : CT = \frac{Mr \times y}{dy}$; si llamamos el arco OS , x , y su radio, a , los sectores semejantes CSs , CMr darán $CS : CM :: Ss : Mr$, esto es. $a : y :: dx : Mr = \frac{ydx}{a}$, y substituyendo este valor de Mr en el de CT , hallaremos que CT ó la subtangente $= \frac{y^2 dx}{a dy}$. Y como suponemos conocida la relacion entre x é y , se sacará facilmente, con diferenciar la equacion en que

es-

está cifrada dicha relacion , el valor de $\frac{dx}{dy}$, y si le substituímos en el valor de CT , le transformará en otro en que no habrá mas diferencias.

382 Supongamos tambien que siendo OS una línea conocida , ó á la qual sabemos tirar las tangentes , sea la curva BM tal , que esté cifrada en una equacion dada la relacion determinada que hay entre CS , x , y CM , y . Si imaginamos el arco infinitamente pequeño Mm , las ordenadas CM , Cm , y los arcos Mr , Sq trazados desde el centro C con los radios CM , CS ; es constante que de la diferenciacion de la equacion no sacaremos mas que la relacion entre dx y dy , ó entre rm y sq , pues en la equacion de la curva no hay mas variables que x é y . Pero como para determinar la subtangente CT , es preciso conocer la relacion que hay entre rm y rM , hemos de ver como se puede determinar rM por las condiciones de la cuestion.

Una vez que es conocida la curva OS , será dada su subtangente CQ correspondiente á cada punto S ; y como los triángulos semejantes QCS , Sqs dan $CS : CQ :: qs : qS$: si llamamos CQ , s , tendremos $x : s :: dx : qS = \frac{sdx}{x}$. Pero los sectores semejantes CSq , CMr dan $CS : CM :: Sq : Mr$, ó $x : y :: \frac{sdx}{x} : Mr = \frac{sydx}{xx}$, sera facil hallar ahora la subtangente CT , comparando los triángulos semejantes Mrm , TCM , de los quales inferiremos $rm : rM :: CM : CT$, ó $dy : \frac{sydx}{xx} :: y : CT = \frac{sy^2 dx}{x \cdot dy}$.

Apliquemos esta doctrina á la curva BM , que supondremos trazada con la circunstancia de que sea SM de una

mís-

Fig. misma longitud ó igual á una línea dada a , sea la que fuere la línea OS . Tendremos, pues, $x + a = y$, y $dx = dy$; y por consiguiente $\frac{dx}{dy} = 1$; será, pues, la subtangente $CT = \frac{xy^2}{x^2}$, que construiremos del modo siguiente.

Tiraremos la tangente SQ , la tiraremos por el punto M la paralela MX : tiraremos despues SX , y por el punto M la MT paralela á SX ; será MT la tangente que se pide. Porque de los triángulos semejantes CSQ , CMX inferiremos $CS : CQ :: CM : CX$, ó $x : s :: y : CX = \frac{sy}{x}$. De los triángulos semejantes CSX y CMT inferiremos $CS : CX :: CM : CT$, ó $x : \frac{sy}{x} :: y : CT$; luego $CT = \frac{sy^2}{x^2}$.

172. 383 Cuestion I. Tirar por el punto M una tangente al círculo AMB , estando en A el origen de las abscisas, y el centro en C .

Si llamamos a el diámetro AB ; la abscisa AP , x ; la ordenada PM , y , tendremos, en virtud de la propiedad tantas veces mencionada del círculo, $yy = ax - xx$: la diferencial de esta equacion será $2ydy = adx - 2xdx$, y,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2y}{a - 2x} = \frac{y}{\frac{1}{2}a - x}; \text{ luego } \frac{ydx}{dy} = \frac{y^2}{\frac{1}{2}a - x} = PT.$$

Si estuviera en C el origen de las abscisas, ya hemos visto (374) de qué caracter saldria la espresion de la subtangente.

384 Cuestion II. Hallar la espresion general de la subtangente para las parábolas de todos los grados cifradas en la equacion $y^{m+n} = a^m x^n$.

La diferencial de esta equacion será $(m+n)y^{m+n-1}dy =$

$= na^m x^{n-1} dx$; luego $\frac{dx}{dy} = \frac{(m+n)y^{m+n-1}}{na^m x^{n-1}}$; será, pues, Fig.

$$\frac{ydx}{dy} = \frac{(m+n)y^{m+n}}{na^m x^{n-1}}; \text{ y si sustituimos en lugar de } y^{m+n}$$

su valor $a^m x^n$, sacaremos $\frac{ydx}{dy} = \frac{(m+n)a^m x^n}{na^m x^{n-1}} = \frac{m+n}{n} x$

Manifiesta esta espresion que en estas curvas la subtangente es tantas veces igual á la abscisa x , quantas unidades hay en el esponente de y , dividido por el esponente de x , conforme ya lo sabíamos, respecto de la parábola vulgar, cuya subtangente es $2x$, y es 2 con efecto el esponente de y dividido por el de x .

385 Question III. Hallar el valor de la subnormal en la parábola vulgar, cuya equacion es $yy = px$.

La equacion, despues de diferenciada será $2ydy = p dx$; luego $\frac{dy}{dx} = \frac{p}{2y}$; luego la subnormal $\frac{ydy}{dx}$ (373) $= \frac{py}{2y} = \frac{1}{2}p$, lo mismo que sacamos tiempos há (65).

386 Question IV. Hallar el valor de la subtangente de la elipse AMB, cuya equacion es $yy = \frac{bb}{aa}(ax - xx)$ (93) en el supuesto de ser AB , a ; el ege menor, b ; AP , x ; y PM , y . 263.

La diferencial de esta equacion es $2ydy = \frac{bb}{aa}(adx - 2xdx)$, ó $2aaydy = abbdx - 2bbxdx$, de donde sacaremos $\frac{dx}{dy} = \frac{2aay}{abb - 2bbx}$. Substituyo este valor en $\frac{ydx}{dy}$, y sale $\frac{ydx}{dy} = \frac{2aay^2}{abb - 2bbx}$; substituyo finalmente en lugar de yy su valor $\frac{bb}{aa}(ax - xx)$, y despues de egecutadas las reducciones

cor-

Fig.

correspondientes saco $\frac{ydx}{dy}$, ó $PT = \frac{2(ax - xx)}{a - 2x} = \frac{ax - xx}{\frac{1}{2}a - x}$

387 Cuestion V. Hallar la espresion de la subnormal de la elipse.

Como la equacion de esta curva despues de diferenciada es $2ydy = \frac{bb}{aa}(adx - 2xdx)$, será $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{bb}{a^2}(a - 2x)}{2y}$.

Por consiguiente la subnormal $\frac{ydy}{dx} = \frac{bb}{aa}\left(\frac{a - 2x}{2}\right) = \frac{bb}{aa} \times \left(\frac{1}{2}a - x\right)$.

164.

388 Cuestion VI. Tirar una tangente al punto M de la hypérbola AMH, cuya equacion es $yy = \frac{bb}{aa}(ax + xx)$, siendo a un primer diámetro; b , el segundo; AP , x ; PM , y .


Despues de diferenciada esta equacion, tendremos $2aaydy = abbdx + 2bbxdx$: luego $\frac{dx}{dy} = \frac{2aay}{abb + 2bbx}$; y $\frac{ydx}{dy} = \frac{2aay}{abb + 2bbx}$; substituyendo en lugar de yy su valor $\frac{bb}{aa}(ax + xx)$, y egecutando la reduccion correspondiente, resultará $\frac{2ay + 2ax}{a + 2x} \frac{ax + xx}{\frac{1}{2}a + x} = PT$, y finalmente $AT = PT - AP = \frac{\frac{1}{2}ax}{\frac{1}{2}a + x}$.

165.


389 Cuestion VII. Hallar el valor de la subtangente correspondiente al punto M de una hypérbola entre sus asymtotas, cuya equacion es $aa = xy$, en el supuesto de ser AP , x ; PM , y ; y aa la potencia de la hypérbola.

La equacion $aa = xy$ despues de diferenciada será $xdy + ydx = 0$; luego $dx = \frac{-xdy}{y}$; y por consiguiente $PT = \frac{ydx}{dy} = -x$; cuyo valor manifiesta que la subtangente es igual á la abscisa correspondiente al punto M, pero que


151




152




154




155




153




159




156




157




158




160




162




163




164



161





que se ha de tomar á la parte opuesta, respecto del origen *A*.

390 Cuestion VIII. Tirar en el punto *M* una tangente á la conchoide de Nicomedes, cuya equacion es $x^2y^2 = (a+y)^2 \times (bb - yy)$, en el supuesto de ser *BC*, *a*; *RV* = *CA*, *b*; *CP*, *x*; *PM*, *y* (234).

Si diferenciamos la equacion de la curva, resultará $2x^2ydy + 2y^2xdx = 2dy(a+y)(b^2 - y^2) - 2ydy \times (a+y)^2 = 2dy \times (a+y)(b^2 - ay - 2y^2)$; luego $\frac{dx}{dy} = \frac{(a+y) \times (b^2 - ay - 2y^2) - x^2y}{(a+y)y(b^2 - ay - 2y^2) - (a+y)^2 \times (b^2 - y^2)}$; y por consiguiente $\frac{ydx}{dy} = \dots$

$$\frac{(a+y)y(b^2 - ay - 2y^2) - x^2y}{y \times xy} = \frac{(a+y)y(b^2 - ay - 2y^2) - (a+y)^2 \times (b^2 - y^2)}{y \times (a+y) \times \sqrt{(b^2 - y^2)}}$$
,
 porque $x^2y^2 = (a+y)^2 \times (b^2 - y^2)$; si dividimos el numerador y el denominador de la última fraccion por $a+y$, y egecutamos despues las multiplicaciones que quedaren indicadas en el numerador, sacaremos

$$\frac{b^2 - ay^2 - 2y^3 - x^2 + xy^2 - b^2y + y^3}{y\sqrt{(bb - yy)}} = \frac{-ab^2 - y^3}{y\sqrt{(bb - yy)}} = PT,$$

cuyo valor por ser negativo se ha de tomar al otro lado de *PM* respecto del origen.

391 Cuestion IX. Tirar en el punto *M* una tangente á la cisoide *AM*.

Llamemos *AP*, *x*; *PM*, *y*; *AB*, *a*; será $ay^2 - xy^2 = x^3$ la equacion de la curva (236), de cuya diferenciacion sacaremos $3x^2dx = 2aydy - 2xydy - y^2dx$; luego $\frac{dx}{dy} = \frac{2ay - 2xy}{3x^2 + y^2}$, y $\frac{ydx}{dy} = \frac{2ay^2 - 2xy^2}{3x^2 + y^2} = PT = \frac{2ax - 2xx}{3a - 3x}$, despues de substituido en lugar de *yy* su valor sacado de la equacion de la curva.

392 Cuestion X. Hallar el valor de la subtangente

MH

Fig. MH de la *Quadratriz de Dinostrates*.

168. Por el punto dado M tiraremos el radio CN , y supondremos que sea TM la tangente; tiraremos tambien las líneas MK , TK , respectivamente perpendiculares á las líneas CM y MK , y las Cn y pm infinitamente próximas respectivamente á las CN y PM . Llamaremos AP , y ; AN , x ; CM , p ; ANB , a ; AC , b ; en cuyos supuestos será $MI = b - y$, $Pp = MR = dy$, y $Nn = dx$.

Sentado esto, los triángulos semejentes CNn , CMH darán $CN : Nn :: CM : MH$, ó $b : dx :: p : \frac{pdx}{b} = MH$; las líneas TK y CH que son perpendiculares á MK serán paralelas, y serán semejantes los triángulos MTK , MmH ; y darán $Mm : MT :: MH : MK$; por razon de ser las líneas mR y TI ambas perpendiculares á MI , serán semejantes los triángulos MIT , MRm , y será $Mm : MT :: MR : MI$; luego $MR : MI :: MH : MK$, esto es, $dy : b - y :: \frac{pdx}{b} : \frac{pdx}{dy} - \frac{pydx}{bdy} = MK$.

De la equacion de la quadratriz que (365) es $bx = ay$, sacaremos $\frac{bx}{a} = y$, y $dx = \frac{ady}{b}$. Si substituimos estos valores en el valor de MK en lugar de dx é y , resultará $MK = \frac{ap}{b} - \frac{apbx}{abb} = \frac{ap - px}{b} = \frac{(a-x)p}{b} = \frac{NB \times MC}{AC}$. Como NB es un arco de círculo, pende la determinacion de la subtangente de la quadratriz de la rectificacion de dicho arco.

169. 393 Cuestion XI. Tirar una tangente MT en el punto M de la espiral CKM de Arquimedes.

La equacion de esta curva será $ay = bx$, si llamamos

a la circunferencia del círculo BN , AB ; b , su radio CB ; Fig. x , el arco BN ; y , la ordenada CM . Si tiramos el radio Cmn infinitamente próximo al radio CMN , y desde el centro C trazamos con el radio CM el arco Mr , será $Nn = dx$, y $rm = dy$. Sentado esto, los sectores semejantes CNn , CMr darán $CN : CM :: Nn : Mr$, ó $b : y :: dx : Mr = \frac{y dx}{b}$. Los triángulos semejantes Mmr , MCT darán $rm : rM :: CM : CT$, ó $dy : \frac{y dx}{b} :: y : CT = \frac{y^2 dx}{b dy}$. Pero si diferenciamos la equacion $ay = bx$ de la curva, sacaremos $\frac{dx}{dy} = \frac{a}{b}$, cuyo valor substituido en $\frac{y^2 dx}{b dy}$ dará $CT = \frac{ay^2}{bb} = \frac{ay}{bb} \times \frac{bx}{a} = \frac{xy}{b} =$ al arco QM .

394 Cuestion XII. Hallar el valor de la subtangente correspondiente al punto F de la espiral parabólica $AGFB$, cuya equacion será $px = yy$, si llamamos p una linea dada; x el arco BC ; y , la ordenada AF ; b , el radio AB . 170.

Tiraremos el radio AD infinitamente próximo al radio AC , y al mismo radio AC las perpendiculares CL , AH , y desde el centro A con el radio AG el arco GI . Diferenciaremos la equacion de la curva, y sacaremos $p dx = 2y dy$, $\frac{dx}{dy} = \frac{2y}{p}$. Sentado esto, los triángulos semejantes ADC , AGI darán $AD : AG :: DC : GI$, ó $b : b - y :: dx : GI = \frac{(b - y) dx}{b}$; los triángulos semejantes FGI , CAH , CFL darán $FI : IG :: FA : AH :: FC : CL$; esto es, $dy : \frac{(b - y) dx}{b} :: b - y : \frac{(b - y)^2 dx}{b dy} :: y : \frac{(by - y^2) dx}{b dy}$. Por consiguiente, $AH = \frac{(b - y)^2 dx}{b dy}$, y $CL = \frac{(by - y^2) dx}{b dy}$. Si en el valor de AH substituímos $\frac{2y}{p}$ en lugar de $\frac{dx}{dy}$, resultará $AH = \frac{2pxy - 4bpx + 2b^2y}{b^2p} = \frac{2xy}{b} - 4x + \frac{2by}{p}$, despues de substituido

en

Fig. en lugar de yy su valor px . Practicando lo propio con el valor de CL , hallaremos que $CL = \frac{(by - yy) dx}{b dy} = \frac{2by^2 - 2y^3}{bp} = 2x - \frac{2xy}{b}$.

395 Cuestion XIII. Tirar una tangente al punto M de la espiral hyperbólica, cuya equacion es $xy = ab$, en el supuesto de ser CA, a ; AN, x ; CM, y ; $AG = QM = b$.

Tiraremos la Crm infinitamente próxima á la CM , y el arco mq : tiraremos tambien la CT perpendicular á CM , que encuentre en T la tangente MT ; será $Qq = rm = dy$, y $Nn = -dx$ (336); y de la equacion diferenciada de la curva sacaremos $\frac{dx}{dy} = -\frac{x}{y}$. Los sectores semejantes CNn, CMr darán $CN : Nn :: CM : Mr$; esto es, $a : -dx :: y : Mr = \frac{-y dx}{a}$; los triángulos semejantes mrM, MCT darán $mr : Mr :: MC : CT$; esto es, $dy : \frac{-y dx}{a} :: y : CT = \frac{-y dy}{a} = \frac{xy}{a} = b$, despues de substituido en lugar de $\frac{dx}{dy}$ su valor hallado poco há. Luego la subtangente de la espiral hyperbólica es constante, del mismo modo que la de la logarítmica (339).

396 Cuestion XIV. Tirar una tangente en el punto M de la cycloide BMA.

Tiraremos la pm infinitamente próxima á la PM , y la Mr paralela á la tangente OT del punto O del círculo generador. Llamaremos el arco BIO, x ; la OM, y ; será $mr = dy$, y $Mr = dx$: los triángulos semejantes mrM, MOT darán $dy : dx :: y : OT = \frac{y dx}{dy}$. Pero como por lo dicho (369) $OM = \frac{b}{a} BIO$; esto es, $y = \frac{b}{a} x$, será $ay = bx$ la equacion de la curva, de la qual despues de diferenciada, sacaremos

$$\frac{dx}{dy}$$

$\frac{dx}{dy} = \frac{a}{b}$, y substituyendo este valor en el de OT , saldrá OT Fig.
 $= \frac{ay}{b} = x$; luego se ha de tomar en la tangente del círculo generador la parte $OT = BIO$; la línea que pasare por los puntos M y T será la tangente de la cycloide.

De las Asímtotas rectilíneas de las líneas curvas.

397 Los principios sentados (371 y sig.) sirven igualmente para determinar las asímtotas rectilíneas de las líneas curvas, cuyas asímtotas yá digimos (172) qué líneas son quando tratamos de las asímtotas de la hypérbola. Por lo dicho acerca de estas se echa de ver que una curva tiene una asímtota rectilínea, quando la tangente tirada desde el extremo de algun ramo infinito de la curva encuentra el ege de las abscisas ó el de las ordenadas á una distancia finita del origen. Por exemplo, si de la subtangente PT , ó $\frac{ydx}{dy}$ restamos la abscisa AP ó x , será $\frac{ydx}{y} - x$ el valor de AT ó de la distancia que hay entre el origen A y el punto donde la tangente encuentra el ege de las abscisas. Si despues de calculado el valor de $\frac{ydx}{dy} - x$ le suponemos igual á una cantidad finita s , haremos uso de esta equacion para eliminar y , y sacar una equacion en x y s , ó para eliminar x , y sacar una equacion en y y s . Si suponemos despues x ó y infinita, y resultan de este supuesto uno ó muchos valores finitos de s , espresarán estos valores las distancias AC por donde han de pasar las asímtotas de la curva. Pero como el punto C no basta solo para determinar la dirección de la asímtota; imaginaremos tira-

Fig. da por el origen A la linea AK paralela á las ordenadas, y los triángulos semejantes TPM , TAK darán $TP : PM :: TA : AK$; esto es, $\frac{ydx}{dy} : y :: \frac{ydx}{dy} - x : AK = y - \frac{xdy}{dx}$. Calcularémos, pues, tambien el valor de $y - \frac{xdy}{dx}$, y suponiéndole igual á una cantidad finita t , servirá esta espression con la equacion de la curva para eliminar x ó y ; y el valor ó los valores de t que resultaren, suponiendo y ó x infinita, determinarán la distancia AR , que habrá desde el origen A al punto R , por donde pasará la asímtota.

Si quisiésemos determinar la asímtota de una curva cuya equacion fuese $y^3 = x^2(a+x)$, sacaríamos $3y^2dy = 2xdx(a+x) + x^2dx = 2axdx + 3x^2dx$; luego $\frac{ydx}{dy} - x = \frac{3y^3}{2ax+3x^2} - x$; ó substituyendo en lugar de y^3 su valor, $\frac{ydx}{dy} - x = \frac{3ax^2+3x^3}{2ax+3x^2} - x = \frac{ax^2}{2ax+3x^2} = \frac{ax}{2a+3x} = s$, y suponiendo x infinita, sería $s = \frac{a}{3}$. Tambien hallaríamos $y - \frac{xdy}{dx} = y - \frac{2ax^2+3x^3}{3y^2} = \frac{3y^3-2ax^2-3x^3}{3y^2}$, que, despues de substituirlo en lugar de y su valor, se reduce á $\frac{ax^2}{3x\sqrt[3]{(a+x)^2}} = t$; y suponiendo x infinita será $t = \frac{1}{3}a$.

Si fuese finito el valor de s , y saliese infinito el de t , sería señal de que la asímtota sería paralela á las y ; y sería al revés paralela á las x , si fuese s infinita, y t finita, infinitamente pequeña, ó cero.

De los límites de las cantidades, y de las cuestiones de Máximos y Mínimos.

398 Espresa, segun hemos visto (376), $\frac{dx}{dy}$ la tan-

tangente del ángulo que la curva, ó su tangente forma Fig. con la ordenada, y $\frac{dy}{dx}$ el valor de la tangente del ángulo, que forma la curva ó su tangente con el ege de las abscisas. De lo dicho (I. 645) tambien se puede inferir que la tangente de un ángulo nulo, ó cuyo valor es cero, es tambien cero; luego quando fuese cero el valor de $\frac{dx}{dy}$, no formará la tangente ángulo alguno con la ordenada; quiero decir que será la tangente paralela á la ordenada; y de los mismos principios inferirémos que quando fuese $\frac{dy}{dx} = 0$, no formará la tangente ángulo alguno con el ege de las abscisas; quiero decir que la tangente será paralela al ege de las abscisas.

Pero como el valor de un quebrado es cero, quando su numerador $= 0$, síguese que $\frac{dx}{dy} = 0$, quando $dx = 0$, y que quando $dy = 0$, será tambien $\frac{dy}{dx} = 0$; y como dx es el numerador, y dy el denominador del quebrado $\frac{dx}{dy}$, hemos de inferir que la tangente de una curva será paralela á las ordenadas, ó á las abscisas de dicha curva, segun que en el quebrado $\frac{dx}{dy}$ fuese cero el numerador ó el denominador. Por consiguiente, para verificar en qué punto ó puntos tiene una curva su tangente paralela á las ordenadas ó á las abscisas, se deberá sacar de su equacion diferenciada el valor de $\frac{dx}{dy}$, se hará el numerador igual á cero, y se sacará una equacion que comparada con la equacion de la curva dará el valor de x y de y correspondientes al punto de la curva, donde la tangente es paralela á las ordenadas. Si se supusiese igual á cero

Fig. el valor de dy , ó del denominador del quebrado $\frac{dx}{dy}$, se sacaría otra equacion, de la qual, combinándola con la de la curva, se inferiria los valores de x é y correspondientes al punto de la curva, donde la tangente es paralela al ege de las abscisas.

Para aclarar esto con un egemplo familiar, consideraremos la curva cuya equacion es $yy + xx = 2ay + 2bx - aa - bb + rr$, que pertenece al círculo (5).

174 Las lineas AP son x , y las lineas PM , PM' son los valores de y correspondientes á cada valor de x , que salen de la resolucion de dicha equacion. Si la diferenciamos saldrá $2ydy + 2xdx = 2ady + 2bdx$, y $\frac{dx}{dy} = \frac{2y - 2a}{2b - 2x}$.

Supongamos primero el numerador igual á cero, para averiguar en qué puntos la tangente es paralela á las ordenadas. Tendremos $2y - 2a = 0$, ó $y = a$. Substituyendo este valor en la equacion de la curva, sale $aa + xx = 2aa + 2bx - aa - bb + rr$, ó $xx - 2bx = rr - bb$, cuya resolucion dá $x = b \pm r$, esto es, $x = AQ'$, y $x = AQ$; de lo que se infiere que la curva, ó su tangente es paralela á las ordenadas en dos puntos R y R' , á cada uno de los cuales pertenece una ordenada igual á la línea a .

Hagamos ahora igual á cero el denominador del valor de $\frac{dx}{dy}$, para saber en qué puntos la curva ó su tangente es paralela á las abscisas; tendremos $2b - 2x = 0$, $x = b$. Si substituimos este valor en la equacion de la

cur-

curva , resultará $yy + bb = 2ay + 2bb - aa - bb + rr$, Fig.
 ó $yy - 2ay - rr + aa = 0$; y de cuya resolucion sacaré-
 mos $y = a \pm r$; cuya expresion está manifestando que la
 tangente es paralela á las abscisas en dos puntos que son
 T y T' que tienen por abscisa comun la linea $AS = b$,
 siendo la ordenada correspondiente al punto T' la linea
 $ST' = a + r$, y la linea $ST = a - r$ la ordenada corres-
 pondiente al punto T .

Los puntos Q y Q' se llaman los *Límites* de las abs- 174
 cisas , porque entre Q y Q' á cada abscisa AP corres-
 ponden valores reales de y que son PM y PM' ; pero en-
 tre Q y A , y mas allá de Q' respecto de A no hay pun-
 to alguno de la curva ; de suerte que si supusiéramos x
 menor que $AQ = b - r$, ó mayor que $AQ' = b + r$,
 no se hallaria valor alguno real de y . Para comprobarlo,
 no hay mas que substituir en la equacion en lugar de x
 una cantidad $b - r - q$ menor que $b - r$, ó una can-
 tidad mayor que $b + r$, qual sería $b + r + q$, resol-
 viendo la transformada que resultare de esta substitucion,
 saldrán imaginarios los dos valores de y .

Asimismo , si concebimos tirada por el punto A la
 AL' paralela á las ordenadas , y si por los puntos T y T'
 tiramos las lineas TL , $T'L'$ paralelas á las abscisas ; las li-
 neas $AL = ST = a - r$, y $AL' = ST' = a + r$, serán
 los límites de las ordenadas ; porque se viene á los ojos
 que no puede haber ordenada ninguna mayor que AL' ,
 ni menor que AL si ha de ser la tangente paralela á las

Fig. abscisas. Y si en la equacion de la curva substituyéramos en lugar de y una cantidad menor que $a - r$, qual sería $a - r - q$, saldrian imaginarios los valores de x despues de resuelta la equacion. Lo propio sucedería si en lugar de y substituyéramos la cantidad $a + r + q$, mayor que $a + r$.

399 La ordenada ST' es la mayor de todas las que rematan en la concavidad $RT'R'$ de la circunferencia; la ordenada ST es la menor de todas las que rematan en la convexidad; y las ordenadas QR y $Q'R'$ son á un tiempo las menores que rematan en la concavidad y las mayores que rematan en la convexidad.

400 De todo esto se sigue que por un mismo método se determinan 1.^o Los límites de las abscisas y de las ordenadas. 2.^o Los casos en que la tangente es paralela á las abscisas ó á las ordenadas. 3.^o Finalmente las mayores ó las menores abscisas ú ordenadas.

401 Pero sea la que fuere la expresion algebraica de una cantidad, se puede considerar dicha expresion como que representa la ordenada de una linea curva. Pongo por caso que sea $\frac{x^2(a-x)}{aa}$ la expresion de una cantidad que llamaré y , de modo que $y = \frac{x^2(a-x)}{aa}$; puedo considerar esta equacion como si fuese la de una linea curva, cuya abscisa sería x , é y la ordenada. En este supuesto es evidente que si la cantidad $\frac{x^2(a-x)}{aa}$ puede ser en algunos casos mayor ú menor que en otros, ó llegar á ser un *máximo* ó un *mínimo*, se habrá de practicar el método que hemos de-

declarado, quiero decir que se habrá de diferenciar dicha Fig.
equacion, é igualar con cero el numerador ó el denomi-
nador de la fraccion que fuese igual á $\frac{dx}{dy}$.

402 En esto consiste el método llamado de *máximos*
y *mínimos*, que es sin duda alguna uno de los mas socorri-
dos de la Analysis, y sirve para averiguar qual es la mayor
ó la menor entre muchas cantidades que crecen ó men-
guan en virtud de una misma ley, ó en general, qual es la
que tiene en mayor grado que todas sus semejantes, algu-
nas propiedades determinadas.

403 Para hacer mas patentes todavia sus fundamen- 174.
tos, y segura su aplicacion, hemos de prevenir que de lo
dicho (399) resulta que una cantidad puede llegar á
ser por dos caminos distintos la mayor entre sus semejan-
tes; quando vá primero creciendo como PM' para men-
guar despues; ó quando vá creciendo como $P'M''$ para pa-
rarse de repente en llegando á ser $Q'R'$; pero en este últi-
mo caso es á un tiempo la mayor entre todas las ordena-
das que rematan en la convexidad, y la menor entre to-
das las que rematan en la concavidad. Son tambien dos
los caminos por donde puede llegar una cantidad á ser la
menor entre sus semejantes; porque ó puede ir menguando
como PM , para crecer despues; ó puede ir menguando
como $P'M'''$ para pararse de repente, y en este último caso
es un máximo, y un mínimo á un tiempo; es un mínimo
respecto del ramo $M'T'M'''$, y un máximo respecto del
ramo MTM'' .

Fig. 404 Por consiguiente , para distinguir si una cantidad es un máximo ó un mínimo , ó uno y otro , se ha de suponer que sea a el valor de x correspondiente al máximo ó al mínimo , y substituir succesivamente en la cantidad propuesta en lugar de x , $a + q$, a , y $a - q$. Quando los dos resultados extremos fueren reales y menores que el del medio , la cantidad será un máximo ; al contrario , si los dos resultados extremos fuesen mayores que el del medio , la cantidad será un mínimo : finalmente , si el uno de los dos resultados extremos fuese real , y el otro imaginario , la cantidad será á un tiempo un máximo y un mínimo.

405 Quando en la determinacion de un máximo ó mínimo , el valor de la variable es tal que hace negativo el del máximo ó mínimo , es señal de que el máximo ó mínimo que representa no corresponde á la cuestion conforme viene propuesta , y de que pertenece á otra cuestion en que haya algunas circunstancias contrarias á las que acompañaban la cuestion que se intentó resolver.

Si se nos propusiese , por egemplo , que dividiésemos 175. la linea AB en el punto C , de manera que el cociente del quadrado de AC , dividido por CB fuese el menor posible ; llamaríamos a á la linea dada AB , y x la parte AC : la otra parte BC sería $a - x$, y el cociente sería $\frac{x^2}{a-x}$; la diferencial de esta cantidad , ó de $x^2(a-x)^{-1}$ será $2x dx (a-x)^{-1} + x^2 dx (a-x)^{-2} = 0$, ó $\frac{2x dx}{a-x} + \frac{x^2 dx}{(a-x)^2} = 0$, ó $2ax dx - x^2 dx = 0$, ó $(2a - x)x = 0$, que dá $x = 0$, ó $2a - x = 0$. El primer valor representa un

un mínimo, que se conoce sin cálculo alguno. Por lo que toca al segundo, que dá $x = 2a$; si substituimos este valor en $\frac{x^2}{a-x}$, se transforma esta cantidad en $\frac{4a^2}{a-a} = -4a$. Luego no pertenece el mínimo á la cuestion actual. Pero si consideramos con algun cuidado el valor hallado $x = 2a$, echaremos de ver que el punto C no puede estar entre A y B , y que la cuestion admitirá una resolucion, quando se tratáre de hallar el punto C en AB prolongada mas allá de B respecto de A . Si en este caso llamamos AC' , x ; la distancia BC' yá no será $a-x$, sino $x-a$, y el cociente que buscamos será $\frac{x^2}{x-a}$, cuya diferencia igualada con cero será $\frac{2xdx}{x-a} - \frac{x^2dx}{(x-a)^2} = 0$, ó despues de egecutadas las reducciones correspondientes $x^2dx - 2axdx = 0$, que dá $x = 2a$, como antes; y como la substitution de esta cantidad en $\frac{x^2}{x-a}$ la transforma en $4a$, es señal de que le corresponde un mínimo á este caso.

Si igualásemos con cero el denominador $(x-a)^2$ de la diferencial, sacaríamos $x = a$, que representa un máximo; y así debe ser, pues quando $x = a$, la cantidad es infinita. No por esto deja de acompañarle el caracter distintivo del máximo, porque sea que supongamos x menor ó mayor que a , sale una cantidad menor que si supusiéramos $x = a$.

406 Quando en la espresion de una cantidad que ha de ser un máximo ó un mínimo hay algun multiplicador ó divisor constante, se puede omitir dicho multiplicador ó divisor, antes de diferenciar. Supongamos, por egeemplo, que

Fig. que $\frac{ay}{b}$ represente generalmente una cantidad que ha de ser un máximo ó un mínimo, siendo a y b cantidades constantes; será, pues, preciso que $\frac{ady}{b} = 0$; pero una vez que ni a ni b son cero, es indispensable que $dy = 0$; es, pues, el resultado el mismo que si solo y hubiera representado la cantidad que ha de ser un máximo ó un mínimo, y el mismo que hubiéramos hallado despues de borrados el multiplicador y el divisor constantes. Luego lo mismo será para el caso diferenciar sola la cantidad que ha de ser un máximo ó un mínimo, que diferenciar uno de sus submúltiplos ó múltiplos, ó alguna de sus potencias.

407 Cuestion I. *Dividir un número dado a en dos partes, tales que el producto de la una por la otra sea mayor que el de otras dos partes qualesquiera del espresado número.*

Llamarémos x á la una de las dos partes, será la otra $a - x$, y el producto de las dos será $ax - xx$; y en virtud de lo dicho (401) será $y = ax - xx$: diferenciando, $dy = adx - 2x dx$, y por consiguiente $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{a - 2x}$. Si suponemos el numerador igual á cero, sacaremos $1 = 0$, que es un absurdo; luego si hay un máximo le hemos de sacar igualando con cero al denominador. Pongámoslo, pues, en práctica, y sacaremos $a - 2x = 0$, que dá $x = \frac{1}{2}a$, cuyo valor nos está diciendo que de qualquiera modo que se divida un número dado en dos partes, el producto de las dos será el mayor posible, quando cada parte fuere la mitad del número dado.

408 Si en la cuestion que acabamos de resolver hu- Fig.
biéramos igualado con cero la diferencial de $ax - xx$, hu-
biéramos sacado $adx - 2xdx = 0$, cuya equacion nos
hubiera encaminado al resultado $x = \frac{1}{2}a$, el mismo que
hemos sacado con suponer $y = ax - xx$ en virtud de lo
dicho (401). De donde inferirémos que se podrá es-
cusar en muchos casos suponer igual á una nueva variable
 y la espresion algebraica de la cantidad; bastará diferen-
ciarla, y suponer igual á cero su numerador ó su deno-
minador, si fuese un quebrado. La conclusion siempre será
la misma que si se practicase lo prevenido en el lugar citado.

409 Cuestion II. *Dividir un número conocido a en
dos partes, tales que el producto de la potencia m de la
una, multiplicada por la potencia n de la otra, sea el ma-
yor posible.*

Si llamamos x la primera parte, la segunda será $a - x$;
será, pues, $x^m(a - x)^n$ el producto espresado. Si diferen-
ciamos esta espresion, é igualamos con cero su diferencial,
sacarémos $mx^{m-1}dx(a - x)^n - nx^m(a - x)^{n-1}dx = 0$.
Dividiéndolo todo por $x^{m-1}dx(a - x)^{n-1}$, resultará
 $m(a - x) - nx = 0$, ó $ma - mx - nx = 0$, que dá
 $x = \frac{ma}{m+n}$. Si fuese $m = 2$, y $n = 3$, sería $x = \frac{2a}{2+3} =$
 $\frac{2}{5}a$; y quiere decir, que la una de las dos partes debería
ser los $\frac{2}{5}$ del número propuesto para cumplir con las con-
diciones de la cuestion.

410 Cuestion III. *Hallar entre todas las líneas que 176.
se pueden tirar por un mismo punto D dado dentro del án-*

gu-

Fig. gulo conocido ABC , qual es la que forma con los lados del espresado ángulo, el menor triángulo que sea posible.

Tiraremos por el punto D la linea DG paralela al lado AB ; supondrémos que sea EF una recta qualquiera tirada por el punto D ; bajaremos DK perpendicular á BC , y desde el punto E donde la EF encuentra la AB , bajaremos la EL perpendicular á BC . Hemos de considerar como conocida la linea BG , y tambien la perpendicular DK . Llamemos, pues, BG, a ; DK, b ; y la base BF del triángulo BEF , x . Se echa de ver que desde cierto término, quanto mas creciere BF , tanto mayor será el triángulo. Pero si BF menguáre, se viene á los ojos que tambien menguará el triángulo; pero solo hasta cierto punto; porque si BF llegáre á ser quasi igual á BG , la recta EDF sería quasi paralela á AB , pues estaria para confundirse con GD ; en cuyo caso sería el triángulo estremadamente grande. Hay, pues, un valor determinado de BF , que dá el menor triángulo posible. Para hallar este valor, buscaremos la espresion general del triángulo BEF .

Los triángulos semejantes BEF, GDF dán $GF:BF::DF:EF$, y los triángulos semejantes DKF, ELF dán $DF:EF::DK:EL$; luego $GF:BF::DK:EL$; esto es, $x - a : x :: b : EL = \frac{bx}{x-a}$; luego la superficie del triángulo BEF , que es $\frac{EL \times BF}{2}$ será $\frac{bx}{x-a} \times \frac{x}{2}$, ó $\frac{\frac{1}{2}bxx}{x-a}$.

Diferenciaremos, pues, esta cantidad, ó estotra $\frac{xx}{x-a}$ (4 o 6), é igualaremos con cero el numerador ó el denominador: si

lo practicáramos así, sacaríamos como antes (405) que x Fig.
 $\equiv 2a$; luego con hacer $BF \equiv 2a \equiv 2BG$, y tirar por el pun-
 to D la línea FDE , será el triángulo FBE el que se pide.

411 Cuestion IV. *Determinar el rectángulo mayor* 177.
que se pueda inscribir en un triángulo dado ADC.

Llamaremos b la base AC del triángulo; a , su altura
 BD ; x , la altura BE del rectángulo inscripto. En estos
 supuestos, por razon de las paralelas AC , HI , tendremos
 $BD : AC :: DE : HI$, ó $a : b :: a - x : \frac{ba - bx}{a} \equiv HI$. Por
 consiguiente, la area del rectángulo $HI \times BE \equiv \frac{bax - bx^2}{a}$
 $\equiv \frac{b}{a}(ax - x^2)$. Diferenciando, pues, $ax - x^2$, y supo-
 niendo la diferencial igual á cero, sacaremos $x \equiv \frac{1}{2}a$. Cu-
 yo resultado manifiesta que el mayor rectángulo inscripto
 en el triángulo dado será aquel cuya altura fuere la mitad
 de la altura del triángulo.

412 Cuestion V. *Hallar entre muchos triángulos rec-* 178.
tángulos que tienen una misma hypotenusa dada, el que tie-
ne mayor superficie.

Llamemos la hypotenusa dada AC , a ; AB , x ; BC , y .
 Será $y \equiv \sqrt{(a^2 - x^2)}$, y por lo mismo $\frac{xy}{2} \equiv \frac{x}{2}\sqrt{(a^2 - x^2)} \equiv$
 la area del triángulo. Diferencio su quadrado (II. 63 y
 II. 69) $\frac{a^2 x^2}{4} - \frac{x^4}{4}$, é igualando su diferencia $\frac{a^2 x dx}{2} - x^3 dx$
 con cero, saco $x \equiv a\sqrt{\frac{1}{2}}$, é $y \equiv \sqrt{(a^2 - x^2)} \equiv a\sqrt{\frac{1}{2}}$.

413 Cuestion VI. *Hallar entre todos los triángu-* 178.
los rectilineos rectángulos de una misma area dada uno, tal
que la suma de sus dos lados $AB + BC$ sea la menor po-
sible.

Fig. Si llamamos x el un lado AB , y a la area del triángulo; el otro lado será $\frac{2a}{x}$, y la suma de los dos lados será $x + \frac{2a}{x}$. Igualando con cero la diferencial $dx - \frac{2adx}{x^2}$ de dicha suma, y reduciendo, sacaremos $x = AB = \sqrt{2a}$; y $BC = \frac{2a}{x} = \sqrt{2a}$. Por consiguiente, los dos lados serán iguales uno con otro.

414 Cuestion VII. *Hallar el menor triángulo isósceles posible ACD que se pueda circunscribir á un círculo dado.*

Llamemos x la distancia ED que hay desde el vértice del triángulo al centro del círculo, y llamemos a el radio BE del círculo dado. Si tiramos la EF perpendicular á DC , será $DF = \sqrt{(x^2 - a^2)}$; y por ser $DF : FE :: DB : BC$, ó $\sqrt{(x^2 - a^2)} : a :: x + a : BC = \frac{a(x+a)}{\sqrt{(x^2 - a^2)}}$, cuya cantidad multiplicada por $BD = x + a$, dará $\frac{a(x+a)^2}{\sqrt{(x^2 - a^2)}}$, que será la area del triángulo. Como esta area ha de ser un mínimo, lo será tambien su quadrado, y por lo mismo (406) $\frac{(x+a)^4}{x^2 - a^2} = \frac{(x+a)^3}{x-a}$ representará tambien un mínimo. Si igualamos con cero la diferencial $\frac{3dx(x+a)^2(x-a) - dx(x+a)^3}{(x-a)^2}$ de la última espresion, y dividimos despues por $\frac{dx(x+a)^2}{(x-a)^2}$ la equacion que resultáre, sacaremos $3(x-a) - (x+a) = 0$; y finalmente $x = 2a$, cuyo valor nos está diciendo, que $ED = 2EF$; como los triángulos DEF , DBC son semejantes, tambien inferiríamos que DC tambien $= 2BC = AC$, y que el triángulo ADC , el menor posible, será equilátero.

415 Cuestion VIII. *Determinar entre todos los pa-*
ra-

ralelipédos de una misma superficie y altura , qual es el Fig.
de mayor cabida.

Llamaremos a la altura ; cc la superficie del paralelipédo ; x é y los dos lados del rectángulo de la base. Toda la superficie se compone de seis rectángulos , habiendo dos cuyo lado ó altura es a , y x su base ; hay otros dos cuya altura es a , é y la base ; finalmente hay otros dos cuya base es x , é y la altura. Por consiguiente , la espresion de la superficie total será $2ax + 2ay + 2xy$; quiero decir , que $2ax + 2ay + 2xy = cc$. Por lo que mira á la solidez , sabemos que es axy ; y como ha de ser la mayor entre todas las de igual superficie , es preciso que su diferencial $axdy + aydx = 0$, ó que $xdy + ydx = 0$ (406). Pero de la equation $2ax + 2ay + 2xy = cc$, que nos está diciendo que la superficie de todos los expresados paralelipédos es constante , sacamos $2adx + 2ady + 2xdy + 2ydx = 0$; luego si substituimos en esta equation el valor de dx sacado de la primera , hallaremos , despues de egecutadas todas las reducciones , $x = y$; luego la base ha de ser un quadrado.

Para determinar su lado , hemos de substituir en lugar de y su valor x en la equation $2ax + 2ay = cc$, que con esta substitution se transformará en $4ax + 2x^2 = cc$, de cuya resolucioñ sacaremos $x = -a \pm \sqrt{aa + \frac{1}{2}cc}$; y como la raiz negativa $-a - \sqrt{aa + \frac{1}{2}cc}$ no sirve para el caso actual , será el valor que buscamos de $x = -a + \sqrt{aa + \frac{1}{2}cc}$.

Fig. 416 Si queremos averiguar cuál ha de ser la altura a para que el paralelepípedo tenga la mayor solidez entre todos los de igual superficie; consideraremos que pues siendo a la altura, la base ha de ser un quadrado, dicha solidez será axx ; es, pues, preciso que la diferencial de axx , en el supuesto de ser variables a y x , sea 0; y por consiguiente $2axdx + xxda = 0$, ó $2adx + xda = 0$, despues de dividido por x . Pero como la equacion $4ax + 2x^2 = cc$, que espresa que la superficie es entonces constante, dá, despues de diferenciada $4adx + 4xda + 4xdx = 0$; y si en esta equacion substituimos en lugar de da , su valor sacado de la equacion $2adx + xda = 0$, resultará despues de egecutadas todas las reducciones $a = x$; luego el paralelepípedo que buscamos ha de ser un cubo, una vez que su lado ó su altura a ha de ser igual al lado x del quadrado que sirve de base.

En quanto al lado de este cubo, le hallaremos si substituimos en lugar de a su valor x en la equacion $4ax + 2x^2 = cc$, que se transformará en $4x^2 + 2x^2 = cc$, ó $6x^2 = cc$ que dá $x = \sqrt{\frac{cc}{6}}$. Luego entre todos los paralelepípedos de igual superficie, el de mayor solidez es el cubo, cuyo lado es igual á la raiz quadrada de la sexta parte de la superficie.

417 Cuestion IX. *Determinar entre todos los triángulos de un mismo perímetro, y de igual base, qual tiene mayor superficie.*

Bajaremos la perpendicular CP , y llamaremos a la
ba-















base del triángulo ABC ; c , su perímetro; AP , x ; CP , y . Fig. En estos supuestos será $PB = a - x$, $AC = \sqrt{xx + yy}$, 180. y $CB = \sqrt{[(a - x)^2 + yy]}$. Luego el perímetro será $\sqrt{xx + yy} + \sqrt{[(a - x)^2 + yy]} + a$, y la superficie $\frac{ay}{2}$; será, pues, $\sqrt{xx + yy} + \sqrt{[(a - x)^2 + yy]} + a = c$, y la diferencial de $\frac{ay}{2}$ igual á cero; quiero decir que $\frac{ady}{2} = 0$, ó $dy = 0$. Pero si diferenciamos la equacion con que expresamos que el perímetro es constante, sacaremos $\frac{x dx + y dy}{\sqrt{xx + yy}} + \frac{(a - x) \times dx - y dy}{\sqrt{[(a - x)^2 + yy]}} = 0$, que por ser $dy = 0$, se reduce á $\frac{x dx}{\sqrt{xx + yy}} - \frac{(a - x) dx}{\sqrt{[(a - x)^2 + yy]}} = 0$. Si dividimos esta espresion por dx , trasparamos, y eliminamos los denominadores, sacaremos $x\sqrt{[(a - x)^2 + yy]} = (a - x)\sqrt{xx + yy}$; y si quadramos esta equacion, sacaremos $xx(a - x)^2 + xx yy = (a - x)^2 xx + (a - x)^2 yy$; y finalmente, si egecutamos las operaciones indicadas, borramos en ambos miembros los términos iguales, y reducimos, hallaremos $xx = (a - x)^2$, ó $xx = aa - 2ax + xx$, que dá $x = \frac{1}{2}a$, y manifiesta que el triángulo ha de ser isósceles. Por consiguiente, levantaremos en medio de AB una perpendicular, trazaremos desde el centro C , y con un radio igual á la mitad del exceso que el perímetro c lleva á la base, un arco que corte dicha perpendicular en c : tiraremos finalmente CB y CA , y estará determinado el triángulo de mayor superficie entre todos los de igual perímetro y base.


418 Cuestion X. *Determinar cuál es en general entre todos los triángulos de igual perímetro el que tiene mayor superficie.*

Fig. Para resolver esta cuestion hemos de tener presente que sea la que fuere la base (417), x ha de ser su mitad; quiero decir que sea la que fuere a , siempre ha de ser $x = \frac{1}{2}a$. En virtud de esto la equacion que espresa el perímetro se transformará en $\sqrt{(\frac{1}{4}aa + yy)} + \sqrt{(\frac{1}{4}aa + yy)} + a = c$, ó $2\sqrt{(\frac{1}{4}aa + yy)} = c - a$; quadrando, sacaremos $aa + 4yy = c^2 - 2ac + aa$, que dá $y = \sqrt{(\frac{cc-2ac}{4})}$. Luego la superficie del triángulo que es en general $\frac{ay}{2}$, será $\frac{a}{2}\sqrt{(\frac{cc-2ac}{4})}$. Y como ha de ser la mayor entre todas las de igual perímetro, sea la que fuere la base a , hemos de igualar con cero la diferencial de $\frac{a}{2}\sqrt{(\frac{cc-2ac}{4})}$ ó de $a(cc - 2ac)$, sacada en el supuesto de ser a variable. Tendremos, pues, $d(a\sqrt{cc - 2ac})$ ó $d[a(cc - 2ac)^{\frac{1}{2}}]$, esto es, $da(cc - 2ac)^{\frac{1}{2}} - a \cdot cda(cc - 2ac)^{-\frac{1}{2}} = 0$, ó $da\sqrt{cc - 2ac} - \frac{cada}{\sqrt{cc-2ac}} = 0$, ó $da(cc - 2ac) - cada = 0$, ó $ccda - 3cada = 0$, de donde se saca $a = \frac{c}{3}$; luego la base a ha de ser el tercio del perímetro; y como ya sabemos que el triángulo ha de ser isósceles (417), se sigue que ha de ser equilátero. Luego entre todos los triángulos de un mismo ámbito, el triángulo equilátero es el de mayor superficie.

419 Cuestion XI. *Determinar el mayor cilindro que se pueda inscribir en un cono dado ABC.*

Llamemos a la altura BP del cono; b , el diámetro AC
 181. de su base; x , el diámetro $FG = DE$ del cilindro, considerándole como variable; p , la area de un círculo cuyo diámetro $= 1$. Ha de ser $p = \frac{3,14159 \&c.}{4}$; porque una vez
 que





que el diámetro es (II.424) á la circunferencia :: 1 : Fig. 3,1415 &c. podemos mirar 3,14159 como la circunferencia de un círculo, cuyo diámetro = 1. Y como la area de un círculo es (I.503) el producto de su circunferencia por la mitad del radio, ó la quarta parte del diámetro, será $\frac{3,14159 \text{ \&c.}}{4}$ la area del círculo cuyo diámetro = 1.

Sentado esto, yá que las areas de los círculos tienen unas con otras la misma razon que los quadrados de sus diámetros, será $1^2 : x^2 :: p : px^2$ = la area del círculo *FIGL*. De los triángulos semejantes *ABP*, *ADF* sacaremos *AP* : *BP* :: *AD* : *DF*, ó $\frac{1}{2}b : a :: \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}x : \frac{ab - ax}{b} = DF$; cuyo valor multiplicado por la area px^2 hallada poco há, dará $\frac{pabx^2 - pax^3}{b}$, y será la espresion de la solidez del cilindro que ha de ser un máximo, y haremos por lo mismo su diferencial $\frac{2pabxdx - 3pax^2dx}{b} = 0$, que nos dará $x = \frac{2b}{3}$, y $DF = \frac{a}{3}$. De donde inferiremos que el mayor cilindro inscripto en el cono dado, es aquel cuya altura es el tercio de la del cono.

420 Cuestion XII. *Hallar las dimensiones de una medida cilíndrica, tal que con la menor superficie interior posible tenga una cabida determinada, ó quepa en ella una cantidad determinada de trigo, agua &c.* 182.

Llamemos el diámetro *AB* de dicha medida, *x*; su altura *AD*, *y*; *c*, su cabida; *p*, la circunferencia de un círculo cuyo diámetro = 1. En estos supuestos, haremos esta proporcion $1 : x :: p : px$, cuyo quarto término es la peri-

Fig. fería de la base, y su producto por la altura y será la expresión de la superficie cóncava del cilindro. Si á esta le añadimos la superficie de la base, tendremos toda la superficie interior del espresado cilindro. Pero la superficie de la base la sacaremos multiplicando su periferia px por $\frac{x}{4}$ que es la quarta parte del diámetro; luego $\frac{px^2}{4}$, será la expresión de la area de la base, cuyo producto por la altura y espresará la cabida de la medida; y como suponemos que c es la tal cabida, será $\frac{pyx^2}{4} = c$, de donde inferiremos que la superficie cóncava $pxy = \frac{4c}{x}$. Por consiguiente toda la superficie interior de la medida será $\frac{4c}{x} + \frac{px^2}{4}$. Igualando su diferencial con cero, saco $-\frac{4cdx}{x^2} + \frac{pxdx}{2} = 0$, $-8c + px^3 = 0$; y finalmente $x = \sqrt[3]{\frac{8c}{p}} = 2\sqrt[3]{\frac{c}{p}}$. Ya que $px^3 = 8c$, y $px^2y = 4c$, si divido la primera de estas dos equaciones por la segunda, resultará $\frac{x}{y} = 2$; luego $x = 2y$; y por consiguiente será la medida qual se pide, si fuere el diámetro de su base duplo de su altura.

421 Cuestion XIII. *Determinar entre todos los conos de una misma superficie dada, el que tiene la mayor solidez.*

Llamarémos s la superficie dada; el semidiámetro 183. AC de la base, x ; el lado obliquo AB , y ; p , la periferia de un círculo, cuyo diámetro $= 1$. En virtud de estos supuestos, la circunferencia de la base será $2px$, su area px^2 , y la superficie convexa del cono será pxy , esto es el producto de la mitad de la periferia de la base por el lado obliquo (I. 574). Como toda la superficie

=

$\equiv px^2 + pxy = s$, será $y = \frac{s}{px} - x$; y por consiguiente la altura $CB = \sqrt{(AB)^2 - (AC)^2} = \sqrt{\left(\frac{s^2}{p^2x^2} - \frac{2s}{p}\right)}$; cuyo valor multiplicado por $\frac{px^2}{3}$, esto es por el tercio de la area de la base, dará (1.605) el producto $\frac{px^2}{3} \sqrt{\left(\frac{s^2}{p^2x^2} - \frac{2s}{p}\right)}$ que será la espresion de la solidez del cono. Como ha de ser un máximo, lo será tambien (406) su quadrado $\frac{s^2x^2}{9} - \frac{2psx^4}{9}$, cuya diferencial $\frac{2s^2xdx}{9} - \frac{8x^3psdx}{9} = 0$; de aquí sacaremos $s - 4px^2 = 0$; y por lo mismo $x = \sqrt{\frac{s}{4p}}$. Para hallar el valor de y , consideraremos la equation hallada antes $y = \frac{s}{px} - x = \frac{s - px^2}{px} = \frac{3px^2}{px}$ con substituir en lugar de s su valor $4px^2$ sacado de la equation $s - 4px^2 = 0$; luego finalmente $y = 3x$. Todo esto manifiesta que el mayor cono entre todos los de una misma superficie dada, será aquel cuyo lado obliquo tuviese con el semidiámetro de la base la misma razon que 3 con 1, pues de $y = 3x$ sale $y : x :: 3 : 1$.

422 Cuestion XIV. Dado en el ege mayor Aa de una 184.
elipse el punto P, hallar la espresion de la menor distancia PD desde el punto dado á la curva.

Llamaremos AC, a; CB, b; AP, p; Pa, q; PQ, x. Por la propiedad de la elipse tendremos $(QD)^2 = \frac{bb}{aa}(pq + qx - px - xx)$, y $(PD)^2 = \frac{bb}{aa} \times (pq + qx - px - xx) + xx = m^2$. Haremos, pues, su diferencial
 $\frac{bbqdx - bbpdx - 2bbxdx}{aa} + 2xdx = 0$, de la qual sacaremos despues de reducido el entero á quebrado, $x = \frac{bb(p-q)}{2(aa-bb)} = \frac{bb}{aa-bb} \times CP$.

Para entender este último resultado, se ha de consi-
Tom.III. V 3 de-

Fig. derar que $p = AP = AC + CP$, y $q = Pa = AC - CP$ ó $aC - CP$, pues en la elipse $CA = Ca$. Luego $p - q = AC + CP - AC + CP = 2CP$, y por lo mismo $\frac{bb(p-q)}{2(aa-bb)} = \frac{bb \ 2CP}{2(aa-bb)} = \frac{bb}{aa-bb} \times CP$.

De las diferencias segundas , terceras &c.

423 Ademas de las diferenciales que hemos encontrado hasta aquí , y que se llaman diferencias primeras, hay tambien diferencias segundas , terceras , &c. Las segundas se señalan escribiendo dd inmediatamente antes de la variable ; las terceras con escribir ddd , y así prosiguiendo ; ddx , por egeemplo , representa la diferencia segunda de x .

424 Para hacerse cargo de lo que son las diferencias segundas , es menester considerar la variable como que vá creciendo por grados desiguales , cuya diferencia es infinitamente pequeña respecto de los mismos incrementos. Así, ddx es infinitamente pequeña respecto de dx . En las diferencias terceras $dddx$, ó lo que es lo mismo d^3x , es infinitamente pequeña respecto de ddx ; y así de las demás.

425 Antes de declarar los fundamentos del método que sirve para sacar las diferenciales de que vamos hablando , hemos de hacer algunas prevenciones que podrán escusar muchas equivocaciones. Aunque para representar el cuadrado de dx , se debiera escribir $(dx)^2$, no obstante se escribe dx^2 para abreviar ; cuya espresion no podrá tomar por la diferencial de x^2 el que tuviere presente que hemos

con-

convenido en representar dicha diferencial de este modo Fig. $d(x^2)$.

Conviene tambien considerar que aunque ddx y dx^2 sean ambos infinitamente pequeños de segunda orden, no por esto son dos cantidades iguales; pues ddx es la diferencia segunda de x ; y dx^2 es el quadrado de dx .

426 Para determinar las diferencias segundas, no hay cosa mas natural que considerar la cantidad variable en tres estados consecutivos, infinitamente próximos; tomar la diferencia entre el segundo estado y el primero, la diferencia entre el tercer estado y el segundo; y tomar finalmente la diferencia entre estas dos diferencias. Por egemplo, el primer estado de x es x ; en el segundo instante á x se le agrega el incremento dx , y llega á ser $x + dx$; en el instante inmediato á $x + dx$ se le agrega el incremento $dx + d(dx)$, señalando $d(dx)$ el exceso que el incremento del segundo instante lleva al incremento del primero, ó la diferencia de dx . Por consiguiente los tres estados consecutivos de x son x , $x + dx$, $x + 2dx + d(dx)$. La diferencia que vá del segundo al primero es dx ; la que vá del tercero al segundo es $dx + d(dx)$; finalmente la diferencia que vá de la una á la otra de estas dos diferencias, ó la segunda diferencia de x es $d(dx)$; es, pues, $ddx = d(dx)$. Luego para sacar las diferencias segundas, se han de diferenciar las diferencias primeras por las reglas que hemos dado para sacar estas.

En virtud de esto, sacaremos facilmente la diferencia

Fig. segunda de xy ; sacaremos primero su diferencia primera que es $xdy + ydx$; despues diferenciaremos esta cantidad como si x , dx , y y , dy fuesen otras tantas variables diferentes, y hallaremos $xddy + dydx + dydx + yddx$, ó $xddy + 2dydx + yddx$. Si hubiésemos de sacar la segunda diferencia de x^2 , sacaríamos primero su primera diferencia que es $2xdx$, despues diferenciaríamos $2xdx$ como si x y dx fuesen dos variables finitas, y resultaría $2xddx + 2dx^2$. Por el mismo camino hallaríamos que $dd(ax^m) = d(max^{m-1}dx) = m \cdot \overline{m-1} ax^{m-2}dx + max^{m-1}ddx$.

427 Acerca de lo que acabamos de sentar podria ofrecérseles á algunos un reparo que es del caso precaver. Quando determinamos las diferencias primeras, desechamos las cantidades infinitamente pequeñas de segunda orden; pero como las diferencias segundas son tambien infinitamente pequeñas de segunda orden, no puede menos de hacer falta en las segundas, lo que se desechó en las primeras.

No se corre ese riesgo, porque la diferencia del infinitamente pequeño desechado de segunda orden, ha de ser indispensablemente un infinitamente pequeño de tercera orden, que es de ningun momento respecto de una diferencia segunda, que es un infinitamente pequeño de segunda orden.

Si se nos ofreciera diferenciar alguna cantidad que llevase diferencias primeras, proviniese ó no dicha cantidad de una diferenciacion exacta, la egecutaríamos por el mismo método. Por esta razon $d(xdy) = xddy + dxdy$; $d\left(\frac{dy}{x}\right) =$

$$\begin{aligned} &= d(x^{-1}dy) = -x^{-2}dxdy + x^{-1}ddy ; d\left(\frac{dx}{dy}\right) \text{ Fig.} \\ &= d(dxdy^{-1}) = dxdy^{-1} - dxdy^{-2}ddy = \frac{ddx}{dy} - \frac{dxddy}{dy^2}. \end{aligned}$$

428 Es frecuente considerar como constante la diferencia primera de una variable en los cálculos donde hay muchas variables. Este supuesto, sobre ser lícito, pues podemos tomar una de las diferencias primeras por término de comparacion, simplifica muchísimo los cálculos, porque se habrán de desaparecer del cálculo los términos que llevarán la diferencia segunda de la espresada variable, porque si dx es constante, $ddx = 0$, y serán nulos todos los términos donde se hallare ddx . Dará este supuesto resultados seguros, con tal que se ponga cuidado en no diferenciar dx , ó la diferencial constante en los términos donde se hallare. En virtud de esto, la diferencial de $\frac{dx}{dy}$, suponiendo dx constante, ó $d(dxdy^{-1})$ es en este mismo supuesto $-dxdy^{-2}ddy$ ó $-\frac{dxddy}{dy^2}$. Si supusiéramos dy constante, la diferencial de $\frac{dx}{dy}$ sería $\frac{ddx}{dy}$.

429 Lo que hemos dicho en orden á las diferencias segundas está declarando lo que se ha de practicar con las diferencias terceras &c.

De la fraccion $\frac{0}{0}$, y de los Puntos múltiples de las curvas.

430 Hay en algunas curvas ciertos puntos que por razon de alguna estraña circunstancia que los acompaña, se llaman *Puntos singulares*. Tales son, por egemplo, los puntos de una curva que son comunes á muchos ramos de la mis-

Fig. misma curva, á los quales por esta razon llamamos *Puntos multiplos*. Quando el punto pertenece á solo un ramo de la curva, se llama *Punto sencillo*; y se llama *Punto duplo*, *triplo*, &c. segun pertenece á un tiempo á dos, tres, &c. ramos de una curva.

431 Son tambien puntos singulares los *Puntos de Inflexion* ó *Serpentinos*. Nos haremos cargo de lo que es una *Inflexion* ó un *Serpanteman* y de sus diferentes grados, si tubiéremos presente que una recta corta una línea, quando la atraviesa en el punto donde la encuentra, dejando al un lado una porcion de la línea, y otra porcion al otro lado, en cuyo caso se llama dicha línea *Secante*.

Puede la secante encontrar la curva en mas de un punto. Si dos puntos de seccion se arriman infinitamente el uno al otro hasta juntarse y confundirse en solo un punto, la secante se transforma en tangente, y los dos puntos de seccion juntos no componen mas que un solo punto de contacto.

185. Supongamos, por egemplo, un círculo *AEHFB*, cuyo diámetro es *AB*, y corta la circunferencia en dos puntos *A*, *B* que separa el intervalo *AB*. Si imaginamos que dicho diámetro se mueve paralelo á sí mismo, y llega á la situacion *CD*; los puntos de seccion se habrán arrimado el uno al otro, porque la cuerda *CD* es menor que el diámetro *AB*. Si prosiguiese moviéndose hasta *EF*, los puntos de seccion se habrán arrimado todavia mas, porque una cuerda es tanto menor quanto mas apartada está del centro,

tro, hasta que llegando el espresado diámetro á GL , dejará Fig. de cortar la circunferencia, pero la tocará en el punto H , donde podemos concebir, que la corta en dos puntos infinitamente próximos el uno al otro; porque cortar en dos puntos unidos es tocar con efecto en un punto solo.

Por consiguiente hemos de considerar una tangente como una linea que encuentra la curva que toca, en dos puntos; pero en dos puntos infinitamente próximos y coincidentes. Así, en las curvas de segunda orden la tangente no puede encontrar la curva sino en el punto de contacto; porque si la encontrase en otro punto, sería lo mismo que si la encontrase tres veces, y esto es (26) imposible en las lineas de la espresada orden.

432 Pero en las lineas de órdenes superiores, puede la tangente encontrar la curva, aunque la toque. Si tres puntos de seccion se juntan, la recta que pasare por dichos tres puntos juntos ó infinitamente inmediatos, tocará y cortará á un tiempo la curva, y el punto donde se juntáren será un punto de inflexion.

Sea, por egemplo, ADC una parábola cúbica, cuya equacion es $y = ax^3$, é imaginemos en el punto C una tangente que tambien corte la curva en F . Si dicha tangente corriere á lo largo de la parábola, tocándola siempre mas cerca del origen A ; quando hubiere llegado á DE , el punto de seccion E se habrá arrimado al punto de contacto D , al qual se irá arrimando mas y mas, hasta que dichos dos puntos coincidan en A ; esto es, quando la tangente

186.

Fig. gente, llegando á la situacion BA , toca y corta la curva en un mismo punto A , donde podemos concebir tres puntos juntos; es á saber el punto de seccion, y los dos puntos á que equivale el punto de contacto.

Al punto A se le llama *Punto de Inflexion*, porque en este punto la curva hace, digamoslo así, un pliegue: el ramo que está al un lado es cóncavo ácia la parte, á la qual está la convexidad del ramo que está al otro lado.

187. Para hacer mas patente como tocar en un punto de inflexion viene á ser lo mismo que cortar en tres puntos coincidentes, consideraremos la parábola $GEADF$, por cuyo origen A se ha tirado una recta GAF oblicua á las coordenadas, y que encuentra la curva en dos puntos G , F . Si dicha recta diere la vuelta al rededor del punto A , acercándose á la linea de las abscisas, pasando desde GAF á EAD , los puntos de seccion E , D se habrán acercado al origen A , y se le acercarán mas y mas, hasta que llegando finalmente la recta GAF á la situacion BAC , que es la del ege de las abscisas, los tres puntos de seccion G , A , F se confundirán en un solo punto de inflexion A .

Por esta razon consideramos la tangente en el punto de inflexion como una linea que encuentra la curva en tres puntos. Luego las lineas de segunda orden no pueden tener punto alguno de inflexion (26); y por lo que mira á las de tercera orden, la tangente en el punto de inflexion no las puede encontrar en otro punto alguno.

433. Pero en las lineas de quarta orden, y de las
ór-

órdenes superiores, una tangente AB en un punto de inflexion A , puede encontrar todavía la curva en otro punto B , por egemplo. Si en fuerza de algun supuesto, la distancia AB llega á ser infinitamente pequeña como Ab , la recta AB no cortará mas la curva, no hará mas que rocarla. Pero este contacto vale por quatro intersecciones, ó por dos contactos sencillos infinitamente próximos el uno al otro. Verdad es que la inflexion, bien que exista realmente en un espacio infinitamente pequeño, no parece mas, pero no se le escapa á la analysis, cuya vista, digámoslo así, es mas perspicaz que la nuestra. Estos puntos se llaman *Puntos de doble Inflexion*, ó *Puntos serpentinos*, ó de *Serpanteman*. Fig. 188.

434 El *Punto de triple Inflexion* es aquel en cuyo contacto se confunden cinco intersecciones; y en el contacto del punto de quádrupla inflexion ó de duplo serpenteman, se consideran confundidos seis puntos de seccion. En general, la multiplicidad de la inflexion es igual al número de las intersecciones, menos dos, que se juntan en el contacto de dicho punto; y la multiplicidad del serpenteman es igual á la mitad del numero de las intersecciones, menos dos, que se consideran como confundidas en el contacto de dicho punto.

435 Es facil reparar que las inflexiones son alternadamente visibles é invisibles al pasar de un grado á otro; que las sencillas, las triplas, las quádruplas, y en general las de un grado impar, son visibles; porque en dicho punto la convexidad de la curva se muda en concavidad,

Fig. y la tangente es secante al mismo tiempo. Pero las inflexiones duplas, las quádruplas, y en general las de grado par, son invisibles, y á la vista en nada se distinguen de los puntos sencillos de la curva: solo los manifiestan los efectos que causa su existencia en el cálculo. Estos puntos de inflexion invisible son los que propiamente se llaman puntos serpentinos.

436 De todo lo dicho se infiere que las líneas mas sencillas que admiten una inflexion del grado t son las de la orden $t + 2$; porque una recta que toca una curva en un punto de inflexion del grado t , es como si la encontrára en $t + 2$ puntos (434). Que las líneas mas sencillas que admitan un serpenteman del grado u , son las líneas de la orden $2u + 2$ (434). Y que en las líneas de la orden $t + 2$ ó $2u + 2$, la recta que las toca en un punto de inflexion del grado t , ó en un punto serpentino del grado u , no las puede volver á encontrar (26).

Sentado esto, declaremos por qué método se puede averiguar si una curva cuya equacion es dada tiene puntos múltiplos, quáles son y dónde están. Pero primero hemos de volver á considerar la cantidad $\frac{dx}{dy}$.

437 Hemos visto que quando el numerador ó el denominador del quebrado $\frac{dx}{dy}$ es cero, hay siempre un máximo ó un mínimo. Nos falta considerar ahora los casos en que el numerador y el denominador de $\frac{dx}{dy}$ son ambos cero, y averiguar cuál es entonces el valor de la espresada fraccion.

Para conseguirlo, repararémolos desde luego que en la Fig. equacion de una curva despues de diferenciada no hay mas términos que los que multiplica dx , y los que multiplica dy ; podemos, pues, llamando A la suma de los primeros, y B la de los otros, darla á la equacion diferencial esta forma $A dx + B dy = 0$. De esta equacion sacaremos $\frac{dx}{dy} = -\frac{B}{A}$; y para que B y A lleguen á ser ambos cero á un tiempo, es preciso que tengan un comun divisor, que llegando á ser cero quando tienen x é y ciertos valores, hace que A y B sean tambien cada uno cero á un tiempo.

Si la equacion de una curva fuese, por egemplo, $y^2 = \frac{x(a-x)^2}{a}$, sacaríamos $\frac{dx}{dy} = \frac{2ay}{(a-x)^2 - 2x(a-x)}$, ó, con substituir en lugar de y su valor, $\frac{dx}{dy} = \pm \frac{2a(a-x)\sqrt{\frac{x}{a}}}{(a-x)^2 - 2x(a-x)}$,

cuya cantidad es $\frac{0}{0}$ quando $x = a$; pero tambien se echa se vér que $a - x$ es un divisor comun del numerador y del denominador, y que el valor de $\frac{dx}{dy}$ se reduce á $\frac{dx}{dy} = \pm \frac{2a\sqrt{\frac{x}{a}}}{a - 3x}$, que en el caso de ser $x = a$, se reduce á ± 1 ;

quiero decir, que en el egemplo propuesto el valor de $\frac{0}{0}$ es ± 1 . Parece, pues, que para hallar en el caso espresado el valor de $\frac{dx}{dy}$, se ha de buscar el comun divisor de los dos términos de la fraccion que le espresa, y dividirlos despues uno y otro por dicho comun divisor. Si esto bastára, no habria mas que hacer, pero no basta quando el valor de $\frac{dx}{dy}$ lleva mas de una variable, ni quando lleva cantidades ra-
di-

Fig. dicales, aunque no lleve en este caso mas de una variable. Esto nos empeña en proponer otro método mas general y facil; pero primero hemos de prevenir que esta singularidad solo se repara en los puntos múltiplos.

438 Concibamos, pues, que sea *SOMZM'ON* una curva, y que en el punto *O* concurren dos de sus ramos
189. por lo menos. Es patente que á cada abscisa *AP*, *x* corresponden, por lo menos en un intervalo determinado, cierto número de valores *PM*, *PM'* de *y*, y que los que pertenecen á los ramos que se han de encontrar, son iguales en el punto de concurso *O*.

Siendo *AZ* el ege de las ordenadas, es preciso que á cada ordenada *AQ* correspondan, á lo menos en un intervalo determinado, cierto número de abscisas *QN*, *QN'*, *QN''*, y que los que correspondan á los ramos que se han de encontrar, sean iguales en el punto de concurso.

Luego si representa *a* el valor de *x*, y *b* el valor de *y*, correspondientes al punto múltiplo, la equacion de la curva propuesta ha de ser tal, que quando substituyéremos en ella *a* en lugar de *x*, resulten tantos valores de *y* iguales á *b*, quantos fuesen los ramos que pasen por el punto múltiplo, y será tambien preciso que de substituir *b* en lugar de *y* resulte igual número de valores *a* de *x*.

De aquí se infiere que ha de ser tal la equacion, que se la pueda reducir á esta forma $(x-a)^m F + (x-a)^{m-1} (y-b) F' + (x-a)^{m-2} (y-b)^2 F'' + (x-a)^{m-3} (y-b)^3 F''' + \dots (y-b)^m T = 0$, donde *m* representa el grado de mul-

multiplicidad del punto que se considera , y $F, F' \&c.$ T Fig. son funciones de x é y .

Con efecto , se viene á los ojos que si hacemos $x = a$, la equation que en este supuesto se reduce á $(y - b)^m T = 0$, será m veces divisible por $y - b$, y dará por lo mismo m veces la equation $y - b = 0$, ó $y = b$. Lo propio sucederá si hacemos $y = b$; porque en este supuesto la equation se transformará en $(x - a)^m F$, será m veces divisible por $x - a$, y dará por consiguiente otras tantas la equation $x - a = 0$, ó $x = a$; nada de esto se verificará si no fuere reductible la equation á la forma que hemos dicho.

Todo esto sentado , supongamos que se diferencie m veces de seguida dicha equation , considerando tambien, si se quiere , dx y dy como variables. Del principio de la diferenciacion se sigue , y lo probaremos con un exemplo, 1.º que solo en la última equation diferencial habrá algunos términos que no estén afectos de $y - b$, ó de $x - a$. Luego quando huviere un punto múltiplo , las diferenciales primera , segunda , tercera &c. de la equation se desaparecerán todas , substituyendo en ellas en lugar de x é y sus valores a y b que corresponden al punto múltiplo , excepto aquella cuya diferencial fuere del grado m . 2.º Tambien se verificará que en la última equation diferencial los términos afectos de ddx , ddy , d^3x &c. y de todas las diferenciales de grados superiores, tendrán por factores alguna potencia de $x - a$, ó de $y - b$; y por consiguiente

Fig. se desaparecerán dichas diferenciales en el punto múltiplo.

439 De estos principios se sigue 1.º que en el punto múltiplo el valor de $\frac{dx}{dy}$ será siempre $\frac{0}{0}$, excepto el que se sacará de la última equacion diferencial; porque como entónces se desaparecen todas las equaciones diferenciales, todo quanto multiplica dx es cero, y lo es también todo quanto multiplica dy . 2.º que como en la espresada última equacion no habrá ni ddx ni ddy , ni otra qualquiera de las diferenciales superiores, podrá sacarse inmediatamente de la equacion propuesta diferenciada m veces de seguida, considerando como constantes dx y dy . 3.º que en la misma última equacion diferencial dx y dy serán del grado m ; y que por consiguiente si se partiere por dy^m , se sacarán resolviendo dicha equacion, m valores de $\frac{dx}{dy}$ que servirán para hallar las tangentes que pertenecen en el punto múltiplo á los diferentes ramos que por él pasaren.

Apliquemos todo esto, con la mira de aclararlo, á la curva cuya equacion es $a(y-b)^2 - x(x-a)^2 = 0$. Si diferenciamos esta equacion m veces, esto es dos veces, sacaremos 1.º $2ady(y-b) - dx(x-a)^2 - 2xdx(x-a) = 0$. 2.º $2addy(y-b) + 2ady^2 - ddx(x-a)^2 - 2dx^2(x-a) - 2xddx(x-a) - 2dx^2(x-a) - 2xdx^2 = 0$. La primera de estas dos equaciones diferenciales se desaparecerá si substituimos en ella a en lugar de x , y b en lugar de y ; y en la segunda se desaparecerán los términos afectos de ddx y ddy , por manera que se reducirá á $2ady^2 - 2adx^2 = 0$.

Pero si en vez de diferenciar dos veces la equacion Fig. de la curva , considerando como variables dx y dy , la hubiéramos diferenciado considerando ambas cantidades como constantes , hubiéramos sacado $2ady^2 - 2dx^2(x - a) - 2dx^2(x - a) - 2xdx^2 = 0$, que con substituir a en lugar de x se reduce igualmente á $2ady^2 - 2adx^2 = 0$, y dá $\frac{dx}{dy} = \pm 1$, de cuyo valor se indician dos tangentes en el punto donde $x = a$, é $y = b$; será , pues , dicho punto un punto duplo , y como el valor $\frac{ydx}{dy}$ de la subtangente es en este caso $\pm b$, las dos tangentes forman con la ordenada un ángulo de 45° ; todo esto lo verá patentemente el que trazare la curva por medio de su equacion que dá $y = b \pm (x - a)\sqrt{\frac{x}{a}}$, y manifiesta que tiene la curva dos ramos de todo punto iguales y semejantes , que se cruzan en el punto O donde $x = a$, é $y = b$. Está pintada en la fig. 189.

440 Por medio de estos principios es facil determinar si una curva , cuya equacion es dada , tiene puntos múltiples , quáles son y dónde están. Se diferenciará dicha equacion ; se igualará con cero el multiplicador de dx y el de dy . Las dos equaciones que resultaren determinarán el valor que corresponde á x , y el que corresponde á y , si tuviere un punto múltiplo ; ó los valores , si fuesen muchos los puntos múltiples ; pero el que quisiere cerciorarse de la existencia de dicho punto múltiplo , deberá indagar si los valores hallados de x é y cumplen con la equacion propuesta. Hecho esto , para averiguar el grado de multiplicidad del punto ó de los puntos hallados , se de-

Fig. berá diferenciar otra vez la equacion , considerando , para que sea menos complicado el cálculo , como constantes dx y dy . Si la substitucion de los valores hallados de x é y en la segunda equacion diferencial , no destruyere todos los términos , el punto hallado no será sino duplo ; pero será mas que duplo si los destruyere. En este último caso se diferenciará por tercera vez la equacion , considerando siempre como constantes dx y dy ; y si la substitucion de los valores de x é y no destruyere todos los términos , el punto será triplo ; y será quádruplo por lo menos , si los destruyere todos. Se proseguirá substituyendo , y diferenciando á este tenor , hasta parar en una diferencial , tal que la substitucion de los valores de x é y no destruya todos sus términos.

Supongamos que se nos pregunte , por egemplo , quales son los puntos múltiples de la curva , cuya equacion es $y^4 - axy^2 + bx^3 = 0$. Diferenciaremos esta equacion , y saldrá $4y^3dy - 2axydy - ay^2dx + 3bx^2dx = 0$, y despues de igualado con cero el coeficiente de dx y el de dy , tendremos $4y^3 - 2axy = 0$, y $3bx^2 - ay^2 = 0$. De la primera de estas dos equaciones inferiremos $y = 0$, ó $4y^2 - 2ax = 0$. La substitucion de 0 en lugar de y en la equacion $3bx^2 - ay^2 = 0$ dá $3bx^2 = 0$ ó $x = 0$; y como la substitucion de 0 en lugar de x , y en lugar de y en la equacion propuesta cumple con dicha equacion , ha de tener la curva un punto múltiplo donde $x = 0$ é $y = 0$, esto es en el origen.

Por lo que toca al valor $4y^2 - 2ax = 0$, ó $y^2 =$
 $=$

$= \frac{ax}{2}$, si le substituimos en la equacion $3bx^2 - ay^2 = 0$, Fig. sale $3bx^2 - \frac{a^2x}{2} = 0$, que dá $x = 0$, ó $x = \frac{a^2}{6b}$; pero el valor $x = 0$ dá $y = 0$, por donde sacamos el mismo punto que antes; y el segundo valor dá $y^2 = \frac{a^3}{12b}$; pero como estos valores de x é y^2 no cumplen con la equacion propuesta, es señal de que no tiene la curva mas punto múltiplo que el del origen.

Para averiguar el grado de su multiplicidad, diferenciaremos otra vez, y sacaremos $12y^2dy^2 - 2axdy^2 - 2aydx^2dy - 2aydx^2dy + 6bxdx^2 = 0$, cuyos términos se desaparecen todos si substituimos en lugar de x é y sus valores. Luego el punto es mas que duplo.

Conviene, pues, que volvamos á diferenciar, y sacaremos $24ydy^3 - 2adxdy^2 - 2adxdy^2 - 2adxdy^2 + 6bdx^3 = 0$; si substituimos en lugar de x é y su valor cero, sacaremos $6bdx^3 - 6adxdy^2 = 0$: y como no se desaparece esta tercera diferencial, es señal de que es triplo el punto que hemos hallado.

Para determinar sus tangentes, divido la última equacion por $6b$, y por dy^3 , y sale $\frac{dx^3}{dy^3} - \frac{adx}{bdy} = 0$, que dá $\frac{dx}{dy} = 0$, $\frac{dx^2}{dy^2} - \frac{a}{b} = 0$, y $\frac{dx}{dy} = \pm \sqrt{\frac{a}{b}}$. El primer valor de $\frac{dx}{dy}$ está manifestando que la una de las tangentes en el punto múltiplo es paralela á las ordenadas; esto es que el uno de los ramos toca el ege de las ordenadas; pues sabemos por otra parte que el punto múltiplo está en el origen. Los dos valores $\frac{dx}{dy} = \pm \sqrt{\frac{a}{b}}$ están diciendo que los otros dos ramos forman cada uno con el ege de las orde-

Fig. 190. Se tiran á los lados un ángulo cuya tangente es $\sqrt{\frac{a}{b}}$, y se tiran á los lados distintos respecto del eje. Se podrá pintar la curva, resolviendo su equacion que dá $y = \pm \sqrt{\left[\frac{ax}{2} \pm \frac{x}{2} \sqrt{(aa - 4bx)}\right]}$, tomando en lugar de a y b dos números á arbitrio, y dándole sucesivamente á x diferentes valores positivos, y negativos.

441 Pero aunque se pueda determinar por las operaciones que hemos especificado un punto múltiplo, no se puede asegurar sin embargo que sean visibles todos los ramos que se pueden considerar como que pasan por dicho punto. Puede suceder que tenga raíces imaginarias la equacion que determina las tangentes, en cuyo caso hay otros tantos ramos invisibles. Los puntos donde esto sucede están algunas veces apartados del curso de la curva, á la qual pertenecen no obstante, y se llaman *Puntos conjugados*; pero estén ó no apartados, siempre se debe considerar que en ellos se junta el número de ramos que señala su multiplicidad; la curva cuyos son es un individuo de una familia mas dilatada, en la qual todos los expresados ramos son visibles; pero llegan á ser invisibles en una, porque alguna de las cantidades constantes que lleva la equacion comun á toda la familia, es cero en el caso particular de la curva que se considera. Por esto en la curva cuya equacion es $m(y - b)^2 - x(x - a)^2 = 0$, de la qual la figura que citamos es un caso particular, y llega á ser la misma quando $m = a$, que tiene una hoja, se desaparecerá esta hoja quando $a = 0$, cuya circunstancia reduce la equacion á

$m(y - b)^2 - x^3 = 0$; los dos ramos OMZ , $OM'Z$ que Fig. estaban mas arriba del punto O , no se hallarán en la última , ó por lo menos no serán visibles. Porque podemos suponer que están todavía , mirando a no como de todo punto cero , sino como infinitamente pequeña. Verdad es que no por esto dejará de haber dos tangentes ; pero basta este egemplo para dar á entender cómo puede suceder que se desaparezcan algunos ramos.

442 De lo que acabamos de decir en orden á los puntos múltiples se pueden inferir muchas consecuencias útiles. 1.º Quando una espresion algebraica fraccionaria que lleváre una ó dos variables , fuere tal que substituyendo en ella en lugar de cada una de dichas variables ciertos valores determinados , llegue á ser $\frac{0}{0}$; se hallará el valor que entonces corresponderá á dicha espresion , diferenciando separadamente el numerador y el denominador , tantas veces de seguida quantas fuere menester para que no lleguen á ser ambos cero á un tiempo ; y en esta diferenciacion se considerarán como constantes las diferencias primeras. Con efecto , toda espresion algebraica $\frac{B}{A}$ que lleváre dos variables x é y , por egemplo , se puede considerar como si fuese el valor de $\frac{dx}{dy}$; quiero decir que podemos siempre suponer $\frac{dx}{dy} = \frac{B}{A}$, y por consiguiente $A dx - B dy = 0$. Pero una vez que segun suponemos A y B llegan á ser ambas cero á un tiempo , quando x é y tienen ciertos valores , se sigue de lo dicho hasta aquí , que para sacar el valor de $\frac{dx}{dy}$, se ha de diferenciar dicha equacion , mi-

Fig. rando dx y dy como constantes , hasta llegar á una equacion que subsista , aunque se substituyan los valores de x é y . Pero de estas diferenciaciones consecutivas se saca $dAdx - dBdy = 0$, $ddAdx - ddBdy = 0$, $d^3Adx - d^3Bdy = 0$ &c. que dán $\frac{dx}{dy} = \frac{dB}{dA}$, $\frac{dx}{dy} = \frac{ddB}{ddA}$, $\frac{dx}{dy} = \frac{d^3B}{d^3A}$; cuyas espresiones manifiestan que se han de diferenciar separadamente el numerador y el denominador , conforme hemos hecho , y la última de dichas equaciones dará el valor ó los valores de dx .

443 2.º Quando una equacion que lleváre muchas variables fuese tal , que á ciertos valores de la una de dichas variables , menos uno , haya de corresponder cierto número de valores iguales de la última , y que lo propio suceda con todas ; se hallarán dichos valores diferenciando tantas veces de seguida , menos una , la equacion propuesta , suponiendo constantes las primeras diferencias de las variables x , y , z , é igualando con cero los multiplicadores de dx , dy , dz &c. los de dx^2 , $dx dy$, $dz dy$ &c. y prosiguiendo á este tenor. Si todas estas equaciones concordaren unas con otras , y con la equacion propuesta , los valores de x , y , z &c. que de ellas se hubieren sacado , serán los valores que se buscaban.

444 Una vez que los valores de x é y que resultan de igualar con cero el coeficiente de dx y el de dy , han de convenir con la equacion finita propuesta , quando dicha equacion no viene propuesta en términos finitos , ó no se la puede reducir á que no lleve otros , no basta el cálculo

pa-

para asegurar la existencia de los puntos múltiples.

Fig.

De las Evolutas.

445 Para trazar las curvas no bastá saber por medio de sus tangentes qual es su direccion en cada uno de sus puntos ; es preciso averiguar tambien la cantidad de que se aparta la curva de su direccion , ó saber medir su *Curvatura*. Porque una misma curva no es igualmente curva en todos sus puntos ; no se aparta de la misma cantidad de su tangente ; no forma con ella en todos sus puntos ángulos de contacto siempre iguales. Solo el círculo tiene en todos sus puntos la misma curvatura , y por esta propiedad es muy acomodado para medir la curvatura de las demás curvas. Es tanto mas acomodado para esto , quanto aunque un mismo círculo sea igualmente curvo en todos sus puntos , los diferentes círculos tienen curvaturas diferentes , y recíprocamente proporcionales á sus radios ó á sus diámetros. Si *curvamos* circularmente dos rectas iguales, formando con la una una circunferencia entera , y con la otra no mas que media circunferencia , esta será dos veces menos curva que la otra , pues tambien el círculo cuya semicircunferencia fuese , tendrá un radio duplo del radio del círculo cuya circunferencia entera fuere la otra linea. En general , sean ABD , abd dos círculos desiguales , cuyos radios AC , ac estén uno con otro en razon de m á n ; tómense en dichos círculos arcos iguales AB , ab ; el arco AB será menos curvo que el arco ab en la misma razon que

191.

Fig. que el radio AC es mayor que el radio ac ; de suerte que si el arco ab tiene una curvatura de m grados, minutos ó partes, el arco AB tendrá una curvatura de n grados, minutos ó partes proporcionales. Porque si tomamos el arco AB' semejante al arco ab , el arco AB' será al arco ab , como la circunferencia ABD es á la circunferencia abd , ó como el radio AC al radio ac ; esto es, como m á n . Luego ya que ab es igual á AB , será tambien AB' á AB como m á n . Por consiguiente, si AB' , semejante á ab , fuere un arco de m grados, ó partes, AB será un arco de n grados ó partes. Luego la curvatura de ab será á la de AB como m á n . Se echa, pues, de ver que en una misma estension ab , AB , los círculos abd , ABD tienen curvaturas que están una con otra como m á n , ó como AC á ac , esto es en razon recíproca de sus radios ó diámetros.

Es pues facil comparar la curvatura de diferentes círculos, comparando sus radios ó diámetros. Y por lo mismo para comparar la curvatura de diferentes curvas ó la de una misma curva en sus diferentes puntos, se buscará el círculo que tenga la misma curvatura que una curva dada en un punto dado; esto es, el círculo que tocando la curva en el punto dado, se aplique tan exactamente á la curva, que entre ella y el círculo sea imposible que pase otro círculo. Porque como con aumentar ó disminuir el radio de un círculo mengua ó crece su curvatura por todos los grados posibles, si no hubiese círculo alguno que se arrime mas á la curva que el círculo hallado, se podrá inferir que tiene el

el círculo la misma curvatura que la curva en dicho punto. Fig.

446 Imaginemos un círculo $MmIH$ que toca en el punto M la curva Mmm' , quiero decir su tangente MO , y que pasa por el punto m' . Si el círculo pasáre por entre la tangente y la curva, se apartará de la tangente menos que la curva, será menos curvo que ella en el punto M . Al contrario, si pasáre la curva entre el círculo y la tangente, el círculo se apartará de la tangente mas que la curva, será mas curvo que ella en el punto M . Pero en ambos casos quanto mas inmediato estuviere el punto m' , donde el círculo corta la curva, al punto M donde la toca, tanto mas se aproximará el círculo á tener la misma curvatura que la curva. Se la arrimará infinitamente, se confundirá con ella, y tendrá con efecto la misma curvatura, quando el punto m se confundiere con el punto M .

Conoceremos por consiguiente el círculo MIH de igual curvatura que la curva en el punto M , si determinamos la cantidad del diámetro MH de un círculo, que tocando la curva Mmm' en M , la corte en un punto m infinitamente inmediato á M , ó coincidente con M . El diámetro MH y el radio MK del espresado círculo se llaman tambien *el Diámetro y el Radio de la Curvatura* en el punto M ; el centro K se llama *el Centro de la Curvatura*. Se averigua la curvatura de los diferentes puntos de una curva, ó de curvas diferentes por medio de la razon inversa de los radios de curvatura en dichos puntos diferentes.

El círculo que tiene en un punto dado la misma cur-

va-

Fig. vatura que una curva, se llama tambien *Círculo osculador*, y su radio el *Radio del Círculo osculador*.

193. 447 Para hallar la espresion del radio de curvatura, suponen los Matemáticos que una linea curva qualquiera BDF cóncava ácia un mismo lado esté envuelta con un hilo $ABDF$, estando el uno de sus extremos fijo en F , y el otro tendido á lo largo de la tangente BA , y que el extremo A se mueva, teniéndole siempre tirante, y desembolviendo continuamente la curva BDF ; en virtud de cuyo movimiento es constante que el extremo A del hilo trazará una linea curva AHK . A la linea curva BDF la llaman la *Evoluta* de la curva AHK . Las partes rectas AB , HD , KF del hilo $ABDF$, se llaman *Radios de la evoluta*, y son los radios de curvatura ó los radios de los círculos osculadores, conforme manifestaremos muy en breve.

448 Como el hilo $ABDF$ es siempre de una misma longitud, se infiere que la porcion de curva BD es igual á la diferencia que hay entre los radios DH , y BA que nacen desde sus extremos; la porcion DF será tambien igual á la diferencia que hay entre los radios FK , DH , y la curva entera BDF será igual á la diferencia entre los radios FK , BA . Por donde se echa de vér que si el radio BA de la curva fuese nulo, quiero decir que si el extremo A del hilo se confundiere con el origen B de la curva BDF , en este caso los radios de la evoluta DH , FK serian iguales á las porciones BD , BDF de la curva BDF .

194. 449 Si consideramos la curva BDF como un polý-
go-

gono $BCDEF$ de una infinidad de lados , es constante que el extremo A del hilo $ABCDEF$ traza el arco pequeño AG , cuyo centro está en C , hasta que el radio CG no forme mas que una linea recta con el lado pequeño CD inmediato á CB ; y que el mismo extremo A del expresado hilo traza tambien el arco pequeño GH cuyo centro está en D , hasta que el radio DH no forma mas que una recta con el pequeño lado DE ; y así prosiguiendo hasta que la curva $BCDEF$ esté enteramente desembuelta. Podemos , pues, considerar la curva AHK como el conjunto de una infinidad de arcos pequeños de círculo AG , GH , HI , IK &c. cuyos centros están respectivamente en los puntos C, D, E, F &c. De todo esto se infiere

450 1.º Que los radios de la evoluta la tocan continuamente como DH en D , KF en F &c. y que son todos perpendiculares á la curva AHK que ván trazando, como DH en H , FK en K &c. Porque DH , por egemplo, es perpendicular al pequeño arco GH , y al pequeño arco HI , pues pasa por sus centros D , E . Por cuyo motivo 1.º la evoluta BDF termina el espacio donde estan todas las perpendiculares á la curva AHK . 2.º si prolongáramos un radio qualquiera HD que corta el radio AB en R , hasta que encuentre otro radio qualquiera KF en S , podríamos siempre tirar desde todos los puntos de la parte RS dos perpendiculares á la curva AHK , excepto desde el punto de contacto D , desde el qual no se puede tirar mas que una ; es á saber DH . Porque se viene á los ojos que

Fig.

193.

194.

193.

Fig. que la interseccion R de los radios AB , DH corre todos los puntos de la parte RS ; mientras el radio AB traza con su extremo A la linea AHK , á la qual se mantiene constantemente perpendicular, y que los radios AB , HD no llegan á confundirse sino quando la interseccion R coincide con el punto de contacto D .

451 2.º Que si se prolongan los arcos pequeños HG hasta l ; IH hasta m ; KI hasta n &c, ácia el punto A por donde se empieza á desembolver la curva; cada arco pequeño como IH tocará esteriormente su inmediato HG , porque los radios CA , DG , EH , FI ván siempre creciendo á medida que los arcos pequeños que componen la curva AHK , se apartan del punto A . Por la misma razon si se prolongan los pequeños arcos AG hasta o ; GH hasta p ; HI hasta q , ácia el lado opuesto á A ; cada arco pequeño como HI tocará interiormente su inmediato IK . Y como podemos considerar los puntos H y I , D y E como coincidentes por razon de la infinita pequeñez del arco HI y del lado DE ; se sigue que si desde un punto qualquiera medio D de la evoluta BDF como centro, y con el radio DH trazamos un círculo mHp , tocará esteriormente la parte AH que estará toda entera dentro del espresado círculo, y tocará interiormente la otra parte HK que estará toda entera fuera del espresado círculo; quiero decir que tocará, y cortará la curva AHK en el mismo punto H , del mismo modo que la tangente toca, y corta la curva en el punto de inflexion.

452 3.º El radio HD del arco pequeño HG no dis- Fig.
crepa de los radios CG , EH de los arcos inmediatos GA , 194.
 HI sino de una cantidad infinitamente pequeña CD ó DE ;
de donde resulta que por poco que se acorte el radio DH
será menor que CG , y que por consiguiente su círculo to-
cará interiormente la parte HA ; y que por poco que se
le alargue será mayor que HE ; por cuyo motivo su cír-
culo tocará exteriormente la parte HK ; por manera que
el círculo mHp es el menor de todos los que tocan este-
riormente la parte HA , y el mayor de quantos tocan in-
teriormente la parte HK ; quiero decir, que entre este cír-
culo y la curva no es posible que pase otro alguno.

453 4.º Como la curvatura de los círculos crece
á medida que menguan sus radios (445), se sigue
que la curvatura del arco pequeño HI será respecto de la
curvatura del pequeño arco AG recíprocamente como el
radio BA ó CA de este último es á su radio DH ó EH ;
quiero decir que la curvatura en H de la curva AHK se-
rá á su curvatura en A , como el radio BA al radio DH ;
y que la curvatura en K es á la curvatura en H , como el
radio DH es al radio FK . Por donde se echa de ver que
la curvatura de la línea AHK vá menguando continua-
mente al paso que la línea BDF se desembuelve; por ma-
nera que en el punto A por donde empieza á desembol-
verse es la mayor posible, y la menor en el punto K don-
de suponemos que acaba de desembolverse la curva.

454 5.º Que los puntos de la evoluta no son mas
que

Fig. que el concurso de las perpendiculares tiradas por los estremos de los pequeños arcos que componen la curva AHK . Pongo por caso, el punto D ó E es el concurso de las perpendiculares HD , IE del arco pequeño HI ; de suerte que si la curva AHK fuese dada con la posición de una de sus perpendiculares HD , se hallará el punto D ó E donde toca la evoluta, con buscar el punto de concurso de las perpendiculares infinitamente próximas HD , IE por el método que vamos á declarar.

195. 455 Supongamos primero que queramos averiguar el valor del radio de curvatura CM de una curva AMD , cuyas ordenadas PM son perpendiculares al eje AB , correspondiente al punto M , para trazar un círculo GM de igual curvatura en el punto M que la curva propuesta. Tiraremos las CG , MR paralelas, y la AE perpendicular al eje AB ; prolongaremos la MP hasta F , y tiraremos la mpf paralela é infinitamente próxima á la MF ; llamaremos la abscisa AP , x ; PM , y ; AM , u ; MC , r ; GE , b ; AE ó PF , c ; será $Mr = dx$, $mR = dy$, $Mm = du = \sqrt{dx^2 + dy^2}$; $CF = r - b - x$, y $GF = b + x$.

Sentado esto, de la naturaleza del círculo sacamos $GF \times (2GC - GF) = (FM)^2$; esto es, $2br - bb - 2bx + 2rx - xx = cc + 2cy + yy$, de cuya equacion la diferencial es $2r dx - 2b dx - 2x dx = 2c dy + 2y dy$, ó $r dx - b dx - x dx = c dy + y dy$; y la diferencial de esta es $r dd x - b dd x - dx^2 - x dd x = c dd y + dy^2 + y dd y$; de donde sacaremos $(r - b - x) dd x - dd y (c + y) =$

$\equiv dx^2 + dy^2 \equiv du^2$. Pero de los triángulos rectángulos semejantes MRm , MFC sacaremos $Mm : mR :: MC : CF$; esto es, $du : dy :: r : CF \equiv \frac{r dy}{du} \equiv r - b - x$; y $Mm : MR :: MC : MF$; esto es, $du : dx :: r : MF \equiv \frac{r dx}{du} \equiv c + y$. Si substituímos estos valores de $r - b - x$, y $c + y$ en la equacion $(r - b - x) ddx - ddy (c + y) \equiv dx^2 + dy^2 \equiv du^2$ sacaremos $\frac{r dy ddx}{du} - \frac{r dx ddy}{du} \equiv du^2$, que dá $r \equiv \frac{du^3}{dy ddx - dx ddy}$, valor del radio de curvatura en el punto M de la curva propuesta.

Esta espresion del radio de curvatura la podremos simplificar suponiendo constante alguna de las diferenciales dx , dy , du , la que quisiésemos, dx por egemplo, en cuyo supuesto $ddx \equiv 0$, y la espresion $\frac{du^3}{dy ddx - dx ddy}$ se reduce á $\frac{du^3}{-dx ddy} = \frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{-dx ddy}$ con substituir en lugar de du su valor $(dx^2 + dy^2)^{\frac{1}{2}}$.

De los triángulos semejantes MRM , MFC , sacaremos tambien $Mm : MR :: MC : MF$, ó $(dx^2 + dy^2)^{\frac{1}{2}} : dx :: \frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{-dx ddy} : MF \equiv \frac{dx(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{-dx ddy(dx^2 + dy^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{dx^2 + dy^2}{-ddy}$.

456 Para determinar el radio de curvatura MC en el caso de concurrir todas las ordenadas en un punto común B ; imaginaremos dos ordenadas infinitamente próximas BM , Bm ; dos radios CM , Cm tambien infinitamente próximos; y las BF , Bf respectivamente perpendiculares á estos radios, y llamaremos BM , y ; Mm , dx ; será, pues,

Tom.III.

Y

Rm

Fig. $Rm = dy$, y $Mm = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$. Los triángulos semejantes MmR , BMF darán MF ó $MH = \frac{ydx}{\sqrt{(dx^2 + dy^2)}}$, y $BF = \frac{ydy}{\sqrt{(dx^2 + dy^2)}}$, de cuya cantidad la diferencial $Bf - BF$, suponiendo dx constante, será $\frac{dx^2 dy^2 + dy^4 + ydx^2 ddy}{(dx^2 + dy^2) \sqrt{(dx^2 + dy^2)}}$. Pero de los sectores semejantes CMm , CHf sacaremos esta proporcion $Mm - Hf : Mm :: MH : MC$; luego

$$MC = \frac{(ydx^2 + ydy^2) \sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{dx^3 + dx dy^2 - y dx ddy} = \frac{y(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{dx^3 + dx dy^2 - y dx ddy}.$$
















Si y fuese infinita, ó lo que es lo propio, si las ordenadas fuesen paralelas, la espresion que acabamos de sacar del radio osculador, se reduciría á $\frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{-dx ddy}$, conforme hallamos antes.

457 Una vez que no hemos sacado mas que un valor de MC , hemos de inferir que una linea curva no tiene mas que una evoluta.

197. 458 Cuestion I. Hallar el radio de la evoluta de la parábola vulgar, cuya equacion es $yy = ax$.

Diferencio esta equacion, y saco $dy = \frac{adx}{2y} = \frac{adx}{2\sqrt{ax}}$; diferencio la equacion $dy = \frac{adx}{2\sqrt{ax}}$, suponiendo dx constante, y saco $ddy = -\frac{adx^2}{4x\sqrt{ax}}$. Si substituimos estos valores en la fórmula $\frac{dx^2 + dy^2}{-ddy}$, sacaremos $ME = \frac{(a + 4x)\sqrt{ax}}{a} = \sqrt{ax} + \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$. De donde sacaremos la construccion siguiente.

Por el punto T donde la tangente MT encuentra el ege, tiraremos la TE paralela á MC , que encontrará á la
MP





MP prolongada en el punto *E*. Porque de los ángulos rectos *MPT*, *MTE* sacaremos $MP : PT :: PT : PE$; esto es $\sqrt{ax} : 2x :: 2x : PE = \frac{4xx}{\sqrt{ax}} = \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$, despues de multiplicado el numerador y el denominador por $\sqrt{ax}$, y hecha la reduccion correspondiente; por consiguiente $MP + PE = \sqrt{ax} + \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$.

De los triángulos rectángulos *MPQ*, *MEC* sacaremos $PM : PQ :: ME : EC$; esto es, $\sqrt{ax} : \frac{1}{2}a :: \sqrt{ax} + \frac{4x\sqrt{ax}}{a} : EC = PK = \frac{1}{2}a + 2x$, y $QK = 2x$; de donde inferiremos la construccion siguiente.

Tomaremos *QK* dupla de *AP*, ó lo que es lo mismo, tomaremos *PK* igual á *TQ*, y tiraremos *KC* paralela á *PM*, que encontrará la perpendicular *MC* en un punto *C*, que será de la evoluta *BCG*.

Para hallar el punto *B* donde el ege *AB* toca la evoluta *BCG*; consideraremos que $PQ = \frac{1}{2}a = \frac{ydy}{dx}$. Y como esta cantidad es constante, será siempre una misma, esté donde estoviese el punto *M*. Y por consiguiente, quando estoviese en *A*, será tambien *PQ* que entonces es $AB = \frac{1}{2}A$.

459 Cuestion II. Hallar la naturaleza de la evoluta *BCG* de la parábola vulgar. 197.

Llamarémos la abscisa *BK*, *u*; la ordenada *KC* ó *PE*, *t*, y será $t = \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$, y $AP + PK = AB$ ó $u = 3x$; si substituimos en lugar de *x* su valor $\frac{1}{3}u$ en la equation $t = \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$, sacaremos $27att = 16u^3$, que espresará la relacion entre *BK* y *KC*; cuya equation está diciendo que la evoluta *BCG* de la parábola vulgar es una segunda

Fig. parábola cúbica, cuyo parámetro es igual á $\frac{27}{16}$ del parámetro de la parábola dada.

460 Cuestion III. Hallar la espresion general del radio de curvatura para las tres secciones cónicas.

De la equacion $yy = px \mp \frac{p^2xx}{a} = \frac{apx \mp p^2xx}{a}$, que por lo dicho (216) representa las tres secciones cónicas, sacaremos $y = \frac{\sqrt{(apx \mp p^2xx)}}{\sqrt{a}}$, cuya diferencial es $dy =$

$$\frac{apdx \mp 2pxdx}{2(apx \mp ap^2xx)^{\frac{1}{2}}}, \text{ y } ddy = \frac{-a^3ppdx^2}{(4aapx \mp 4ap^2xx) \times (apx \mp ap^2xx)^{\frac{1}{2}}}$$

Si substituímos estos valores en $\frac{dx^2 + dy^2}{dx ddy} \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$, espresion general de MC (455), sacaremos $MC =$

$$\frac{(aapp \mp 4appx + 4ppxx + 4aapx \mp 4ap^2xx)(aapp \mp 4appx + 4ppxx + 4a^2px \mp 4ap^2x^2)^{\frac{3}{2}}}{2a^3pp}$$

$$= \frac{4(MQ)^3}{PP}, \text{ pues } MQ = \frac{y\sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{dx} = \frac{\sqrt{(aapp \mp 4appx + 4ppxx + 4aapx \mp 4ap^2xx)}}{2a}$$

De donde sacaremos la construccion siguiente.

198. Tomarémos MC quadrupla de la quarta proporcional

199. continua al parámetro AF , y á la perpendicular MQ que remata en el ege; el punto C será uno de los de la evoluta.

199. Si hiciéramos $x = 0$, sería $AB = \frac{1}{2}p$. Y si en la elipse hiciéramos $x = \frac{1}{2}a$, sacaríamos $DG = \frac{a\sqrt{ap}}{2p}$; esto es, igual á la mitad del parámetro del ege menor. Por donde se echa de ver que en la elipse la evoluta BCG remata en un punto G del ege menor DO .

Si $a = p$ en la elipse, saldrá $MC = \frac{1}{2}a$, en cuyo caso todos los radios de la evoluta serán iguales unos con otros, y la evoluta no será mas que un punto; quiero decir

cir que entonces se transformará la elipse en un círculo, Fig. cuya evoluta es el centro mismo.

461 Cuestion IV. Hallar el radio de la evoluta de 200. una semicicloide vulgar AMD, cuya base BD es igual á la semicircunferencia BEA del círculo generador.

Llamaremos AP, x ; PM, y ; el arco AZE, u ; y el diámetro $AB, 2a$. De la propiedad del círculo inferiremos $PE = \sqrt{(2ax - xx)}$, y de la propiedad de la curva $y = u + \sqrt{(2ax - xx)}$, cuya diferencial es $dy = du + \frac{adx - xdx}{\sqrt{(2ax - xx)}}$ $= \frac{2adx - xdx}{\sqrt{(2ax - xx)}}$, ó $dx\sqrt{\left(\frac{2a-x}{x}\right)}$, con substituir en lugar de du la cantidad $\frac{adx}{\sqrt{(2ax - xx)}}$, que segun veremos mas adelante, es el valor de du . Si diferenciamos en el supuesto de ser dx constante, sacaremos $ddy = \frac{-adx^2}{x\sqrt{(2ax - xx)}}$, cuyos valores substituidos en $\frac{(dx^2 + dy^2)\sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{-dxddy}$ dan $MC = 2\sqrt{(4a^2 - 2ax)}$; esto es $2BE$ ó $2MG$.

Si hiciéramos $x = 0$, sería $AN = 4a$ el radio de la evoluta en el vértice A . Pero si suponemos $x = 2a$, hallaremos que el radio de la evoluta en el punto D es nulo ó cero; de lo que se infiere que la evoluta tiene su origen en D , y remata en N , por manera que $BN = BA$.

462 Cuestion V. Hallar la naturaleza de la evo- 200. luta de la trocoide.

Concluiremos el rectángulo BS , trazaremos el semicírculo DIS , cuyo diámetro es DS , y tiraremos DI paralela á MC ó BE . En virtud de esto, el ángulo BDI será igual al ángulo EBD , y por consiguiente serán iguales los arcos DnI, BeE ; luego las cuerdas DI, BE ó CG

Fig. serán tambien iguales. Si tiramos IC será igual , y paralela á DG , que por la generacion de la cicloide es igual al arco BeE ó DnI , y por lo mismo la evoluta DCN es una semicicloide , cuya base es la recta NS igual á la semicircunferencia DIS de su círculo generador ; quiero decir, que es la misma semicicloide $AMBD$ puesta al revés.

De los Puntos de Inflexion.

463 Los puntos de inflexion , segun digimos antes (432) , son aquellos como M donde la concavidad de una curva se muda en convexidad. Para determinar estos puntos , podemos considerar que la tangente en M es á un tiempo tangente de las dos porciones MA , MO ; en cuyo supuesto podemos investigar al uno y al otro lado del punto M dos elementos Mm , Mm' en linea recta , y por consiguiente el radio de la evoluta en el punto de inflexion M será infinito , pues los dos radios de curvatura correspondientes á los puntos M y m' serán ambos perpendiculares á la recta mm' , serán paralelos , y no concurrirán sino á una distancia infinita. Pero como podemos suponer los espresados elementos tan pequeños que se desaparezcan ambos , en este caso el radio de la evoluta será cero.

Porque en el supuesto que hemos hecho de estar en linea recta los dos elementos de la curva inmediatos al punto de inflexion , nada determina de qué longitud son los dos espresados elementos consecutivos. Y como aunque se redugeran ambos á un punto , no por esto dejarían de es-

tar en una misma línea recta , las dos perpendiculares caerían entonces una sobre otra , y se encontrarían en el punto mismo de donde salen. Esto es cabalmente lo que pasa en las curvas, cuyo radio de la evoluta es cero en el punto de inflexion. Porque siendo entonces infinita la curvatura , cada uno de los dos elementos consecutivos se confunde con la tangente infinitamente menos que en otro caso qualquiera , y por lo mismo los hemos de considerar como dos puntos que se confunden uno con otro. Pueden, pues, los dos elementos estar en línea recta , sin que por esto el radio de la evoluta sea infinito ; pero esto manifiesta que en el punto de inflexion , el radio de la evoluta es siempre infinito ó nulo.

464 Luego en el punto de inflexion el radio de la evoluta es siempre , ó nulo , ó infinito. Luego la fórmula

la $\frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{-dxddy}$, que sacamos antes para hallar el radio

de curvatura , podrá tambien guiarnos para saber sobre qué supuestos habremos de caminar quando quisiésemos hallar el punto ó los puntos de inflexion de alguna curva dada. A fin de determinar con mas claridad estos supuestos, hemos de recordar que $(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}} = \sqrt{(dx^2 + dy^2)^3}$; que por consiguiente hemos de considerar que están elevadas al cubo las cantidades que el paréntesis encierra; que el cubo de dx^2 es dx^6 , y que la raíz quadrada de $(dx^2)^3$ ó de dx^6 es dx^3 . Por consiguiente si hubiéramos de divi-

Fig. ... dir por dx^2 el numerador de la fracción $\frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{-dxddy}$ sin alterar su valor, sería preciso dividir al mismo tiempo su denominador por dx^3 para hacer la compensacion correspondiente. Luego si dividimos el numerador de $\frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{-dxddy}$ por dx^2 , y el denominador por dx^3 , será $\frac{dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{-dxddy} = \frac{\left(1 + \frac{dy^2}{dx^2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{-ddy}{dx^2}} = 0 \text{ ó } \infty$ en el punto de inflexion. Y como

una fraccion es cero quando su denominador es infinito, y es infinita quando su denominador es cero, se sigue que en el punto de inflexion ha de ser $= 0 \text{ ó } \infty \frac{-ddy}{dx^2}$ que es el denominador de la fracción $\frac{\left(1 + \frac{dy^2}{dx^2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{-ddy}{dx^2}}$.

La espresion $\frac{-ddy}{dx^2} = 0 \text{ ó } \infty$ está diciendo que para hallar el punto de inflexion de una curva, se ha de diferenciar dos veces su equacion, tratando dx como constante, para sacar en cantidades finitas el valor de $\frac{-ddy}{dx^2}$, é igualarle con cero ó con el infinito. De esta equacion, y de la de la curva se inferirán los valores de x é y correspondientes al punto de inflexion, ó á los puntos de inflexion, si hubiere muchos.

202. 465 Cuestion I. Hallar el punto de inflexion de una curva AFK, cuyo diámetro sea la linea recta AB; tal que
la

la relacion entre su abscisa AE que llamaremos x , y su ordenada EF que llamaremos y , esté cifrada en la equacion $axx = xxy + aay$.

La equacion de la curva es $y = \frac{axx}{xx+aa}$ que dá $dy = \frac{2a^3 x dx}{(xx+aa)^2}$; y diferenciando esta cantidad, tratando dx como constante, sacaremos $ddy = \frac{2a^3 dx^2 (xx+aa)^2 - 8a^3 xx dx^2 (x^2+a^2)}{(xx+aa)^4}$ que dividiéndolo todo por $(xx+aa)$, egecutando las operaciones indicadas, y partiéndolo todo por dx^2 , se reduce á $\frac{ddy}{dx^2} = \frac{2a^3 xx + 2a^5 - 8a^3 xx}{(xx+aa)^3} = \frac{-6a^3 xx + 2a^5}{(xx+aa)^3}$; si suponemos esta cantidad igual á cero, será cero su numerador, y dará $3xx = a^2$, y $x = a\sqrt{\frac{1}{3}}$.

Si substituyéramos en lugar de xx su valor $\frac{1}{3}aa$ en la equacion $y = \frac{axx}{xx+aa}$, sacaríamos EF ó $y = \frac{1}{4}a$.

466 Cuestion II. Hallar el punto de inflexion de la curva, cuya equacion es $y - a = (x - a)^{\frac{3}{2}}$. 202

Diferenciando esta equacion saco $dy = \frac{3}{2}(x-a)^{-\frac{1}{2}}dx$,

$$y ddy = -\frac{6}{25}(x-a)^{-\frac{7}{2}}dx^2; \text{ luego } \frac{ddy}{dx^2} = \frac{-6}{25\sqrt{(x-a)^7}},$$

tratando dx como constante. Suponiendo este valor igual á cero, sacaríamos $-6 = 0$, que nada dice; suponiéndole infinito será el denominador $25\sqrt{(x-a)^7} = 0$, que dá $x = a = AE$; porque qualquiera potencia ó raiz de cero es cero.

467 Cuestion III. Hallar el punto de inflexion de la semicicloide prolongada AFK, cuya base BK es mayor que la semicircunferencia ADB del círculo generador, cuyo centro está en C. 203

Es-

Fig. Esta cuestion se reduce á hallar en el diámetro AB el punto E , tal que la aplicada EF encuentre la cicloide en el punto de inflexión F . Para conseguirlo, llamaremos ADB , a ; BK , b ; AB , $2c$; AE , x ; ED , z ; AD , u ; EF , y . La propiedad de la cicloide dá $y = z + \frac{bu}{a}$, y por consiguiente $dy = dz + \frac{bdu}{a}$. Como el círculo dá $z = \sqrt{(2cx - xx)}$, será $dz = \frac{cdx - xdx}{\sqrt{(2cx - xx)}}$, y $du = \frac{cdx}{a\sqrt{(2cx - xx)}}$ (461); substituyendo pues estos valores de dz y du en el valor de dy , sacaeémos $dy = \frac{acdx - axdx + bcdx}{a\sqrt{(2cx - xx)}}$, cuya equacion diferenciada, tratando dx como constante, dará $ddy = \frac{(bcx - acc - bcc)dx^2}{(2cx - xx)a\sqrt{(2cx - xx)}}$, y $\frac{ddy}{dx^2} = \frac{bcx - acc - bcc}{(2cx - xx)a(2cx - xx)^{\frac{3}{2}}}$, cuyo denominador igualado con cero no nos enseñaría nada; será por consiguiente $bcx - acc - bcc = 0$, que dá $x = c + \frac{ac}{b}$, y $CE = \frac{ac}{b}$.

Se viene á los ojos que si b no fuese mayor que a , no habria ningun punto de inflexión, pues si fuese menor, sería CE mayor que CB .

204 468 Cuestion IV. Hallar el punto de inflexión de la conchoide AFK de Nicomedes, cuya equacion será $y = \frac{(b+x)\sqrt{(aa-xx)}}{x}$, en el supuesto de ser AB ó FD , a ; BP , b ; BE , x ; y EF , y .

Diferenciaremos la equacion de la curva, y sacarémos $dy = \frac{-x^2 dx - aabdx}{x^2 \sqrt{(aa-xx)}}$. Si diferenciamos esta, saldrá $ddy = \frac{(2a^4b - aax^3 - 3aahxx)dx^2}{(aax^3 - x^5)\sqrt{(aa-xx)}}$, y $\frac{ddy}{dx^2} = \frac{2a^4b - aax^3 - 3aahxx}{(aax^3 - x^5)x\sqrt{(aa-xx)}}$, cuyo numerador igualado con cero dá $x^3 + 3bxx - 2a^2b = 0$, de cuya equacion se hallará una raiz que será el valor de BE que se pide.

DEL CÁLCULO INTEGRAL.

Fig.

469 Es el cálculo integral, según hemos insinuado (303), el inverso del cálculo diferencial, un modo de calcular que restituye la cantidad que el cálculo diferencial resolvió en sus elementos. Su objeto es por consiguiente hallar las razones que hay entre las cantidades, una vez averiguadas por medio del cálculo diferencial las razones que hay entre sus elementos. Está muy lejos este cálculo de hallarse tan adelantado como el cálculo diferencial; este no tiene ya más que adelantar, pues no hay cantidad alguna variable expresada algebráicamente, sea la que fuere, cuya diferencial no se pueda conseguir. Pero hay una infinidad de diferenciales que no es posible integrar, ya porque no pueden provenir algunas de ellas de ninguna diferenciación, tales serían estas xdy , $xdy - ydx$; ya porque no se ha hallado todavía respecto de muchas un método para integrarlas; y entre estas hay algunas cuya integral no hay esperanzas de encontrarla jamás.

470 Una vez que el cálculo integral es el inverso del cálculo diferencial, las reglas para integrar las cantidades se han de sacar de los mismos métodos que hemos declarado para diferenciarlas. Seguiremos, pues, este camino, declarando primero como se integran las cantidades incomplexas, y después manifestaremos por qué métodos se han de integrar las diferenciales complexas.

Pero antes de todo hemos de prevenir que hay también

Fig. bien un signo particular para representar la integral de una diferencial cualquiera, del mismo modo que le hay para representar la diferencial de una cantidad propuesta. La señal de esta integral es la letra S , que significa *suma* puesta antes de la diferencial cuya integral se quiere representar; así $S.dx$, $S(adx + bdy)$ representan respectivamente las integrales de las cantidades diferenciales dx , $adx + bdy$.

471 Hecha esta prevención, bien se echa de ver que $S.dx = x$, pues si diferenciamos x , sacaremos dx .

De donde se infiere que para hallar la integral de una diferencial multiplicada ó dividida por una constante cualquiera, basta tomar la integral de dicha diferencial sin contar con la constante, y despues multiplicar ó dividir la integral hallada, por dicha constante. $S\frac{dx}{a} = \frac{x}{a}$; $S.adx = ax$. Porque si diferenciamos $\frac{x}{a}$ resultará $\frac{dx}{a}$, y ax diferenciada es adx .

472 Veamos ahora cómo se ha de integrar una diferencial incomplexa que no lleva mas que una variable x multiplicada ó dividida por constantes cualesquiera. Se logra este intento 1.º borrando dx en la diferencial propuesta. 2.º añadiéndole una unidad al esponente de la variable. 3.º dividiendo lo que resultáre por dicho esponente aumentado de la unidad; el resultado será la integral de la diferencial propuesta.

Supongamos que se haya de integrar $ax^m dx$, siendo a una constante cualquiera, y m un esponente tambien qual-

qualquiera ; borraremos dx ; añadiremos una unidad al es- Fig.
ponente m , y resultará ax^{m+1} ; dividiremos este resul-
tado por $m+1$, y sacaremos $\frac{ax^{m+1}}{m+1}$; luego $S.ax^m dx =$
 $\frac{ax^{m+1}}{m+1}$.

Porque si diferenciamos la cantidad $\frac{ax^{m+1}}{m+1}$, sacare-
mos $\frac{(m+1)ax^{m+1-1} dx}{m+1} = ax^m dx$; luego &c.

Por el mismo camino hallaríamos que $S.mx^{m-1} dx =$
 $\frac{mx^{m-1+1}}{m+1-1} = x^m$.

473 Hay sin embargo un caso muy comun al
qual parece que no se puede aplicar esta regla fundamen-
tal. Si la diferencial cuya integral se ha de sacar fuese
 $x^{-1} dx$, ó $\frac{dx}{x}$, hallaríamos en virtud de la regla dada,
que $S.\frac{dx}{x} = \frac{x^0}{0} = \infty$ que de nada sirve.

Nos sería sumamente facil apear con muy pocas pala-
bras esta dificultad, pues hemos sentado en el cálculo di-
ferencial (343) quanto es menester para conseguirlo.
No obstante seguiremos otro rumbo por las razones que no
se le escaparán á ningun lector atento á medida que se fue-
re internando en lo que llevamos ánimo de declarar en este
tratado.

474 Entre muchas cuestiones cuya resolucion pen-
de á un tiempo del cálculo diferencial é integral , hay una

Fig. cuyo asunto es *quadrar* las líneas curvas, ó hallar el valor del espacio comprendido entre algunas de sus coordenadas, y una porción de las mismas curvas; por egeemplo, ha-
 205. llar el valor del espacio $BAPM$ es *quadrar* la curva CBM . Aunque trataremos estensamente mas adelante esta materia, nos hace al caso tocarla desde ahora para poder tratar con mas desembarazo algunos de los puntos que llamarán muy, en breve nuestra atencion.

Para valuar el espacio $ABMP$, buscaremos primero su diferencial, ó la espresion de uno de los infinitos elementos infinitamente pequeños, de que podemos suponer que se compone; y hallando despues la suma de todos estos elementos, ó la integral de la diferencial que hubiésemos hallado del espacio propuesto, tendremos averiguado el valor del espresado espacio.

Busquemos, pues, la diferencial del espacio $ABMP$, en el supuesto (que por ahora nos basta) de ser las ordenadas PM , pm , que llamaremos y , perpendiculares á las abscisas AP , Ap que llamaremos x . Probaremos con gran facilidad que la diferencial que buscamos de la area finita $ABMP$ es igual al rectángulo $PMnp$, quando llega á ser menor que qualquiera cantidad asignable, la diferencia Pp de las dos abscisas, ó la diferencia mn de las dos ordenadas; por manera que siendo Pp , dx ; y mn , dy , la diferencial de la area $ABMP = ydx$, y $\int ydx = ABMP$; esto es probar otra vez, pero por otro método que en el cálculo diferencial (307), que el espacio $ABMP$ se compo-



ne de la suma de todos los paralelogramos $MPpn$ que ca- Fig.
ben en él.

Porque si tiramos la Mn perpendicular á pm , y concluimos el rectángulo $pmNP$, el trapecio $PMmp$ será la diferencia que vá de la area $ABPM$ á la area $ABmp$; pero quando Pp llega á ser menor que qualquiera cantidad assignable, el rectángulo $PNmp = PN \times Pp = (y + dy)dx$, y el rectángulo $PMnp = PM \times Pp = y \times dx$; luego yá que $(y + dy)dx : y \times dx :: y + dy : dy$, y $y + dy = y$ (324), tambien será $(y + dy)dx = y \times dx$, ó $PNmp = PMnp$; luego tambien el trapecio $PMmp$ será igual al rectángulo $PMnp$ ó $= ydx$; y por consiguiente el valor del espacio $ABMP$ será $\int ydx$ ó la suma de una infinidad de rectángulos como ydx , de los quales podemos suponer que se compone.

475 Hemos demostrado (339) que si la curva AM fuese una logarítmica, su subtangente PT será siempre de un mismo valor; quieró decir, que la subtangente de la logarítmica es constante. Por consiguiente, si llamamos dicha subtangente a ; la abscisa AP , x ; la ordenada PM , y ; tendremos en la logarítmica $\frac{ydx}{dy} = a$, pues $\frac{ydx}{dy}$ es la expresion general de la subtangente (372). Luego será $\frac{ydx}{dy} = a$ la equacion diferencial de la logarítmica, de la qual sacaremos $\frac{dx}{a} = \frac{dy}{y}$, é integrando $\frac{x}{a} = \int \frac{dy}{y}$. Por consiguiente ya que por la naturaleza ó generacion de la logarítmica, es x el logaritmo de y , tomado en la logarítmica cuya subtangente es a , podremos inferir que

La

Fig. 476 La integral $S.\frac{dy}{y}$, ó la integral de una fracción $\frac{dy}{y}$, cuyo numerador dy es la diferencial del denominador y , es el logaritmo x del denominador, dividido por la subtangente a de la logarítmica, en la qual se toma dicho logaritmo. Por consiguiente, $S.\frac{dx}{x} = Lx$, y queda aclarado el caso (473) que no alcanza la regla fundamental de integracion.*

477 Si supusiéramos que z es el logaritmo de una ordenada qualquiera u , en otra logarítmica cuya subtangente es b , tendríamos $\frac{z}{b} = S.\frac{du}{u}$; y si supusiéramos tambien que las ordenadas y , u , tomadas respectivamente en las dos logarítmicas cuyas subtangentes respectivas son a y b , sean unas mismas, ó que son unos mismos números con hacer $u = y$, tendríamos $\frac{z}{b} = S.\frac{dy}{y} = \frac{x}{a}$, y $az = bx$, y finalmente $x : z :: a : b$, de donde resulta

478 Que los logaritmos de un mismo número tomados en distintas logarítmicas tienen unos con otros la misma razon que las subtangentes de dichas logarítmicas. Esto mismo hallamos ya antes (342) por un camino algo diferente del que nos ha guiado ahora.

479 Si tomáramos los logaritmos en una logarítmica cuya subtangente es la unidad, siempre será $Ly = S.\frac{dy}{y}$; quieró decir que la integral $S.\frac{dy}{y}$ de una fracción cuyo numerador es la diferencial del denominador, es siempre igual al logaritmo del denominador tomando este logaritmo en la logarítmica cuya subtangente es la unidad. A estos logaritmos los llamamos logaritmos hyperbólicos por la razon que

que prometimos (II. 350), y vamos á dar en un instan- Fig.
te ; con esto se distinguen de los logaritmos ordinarios cu-
ya subtangente ó módulo no es la unidad , sí la fraccion
decimal 0,43429448. Porque en las tablas ordinarias
el logaritmo de la unidad es 0 , y el de 10 es 1 ; siendo
así que en los logaritmos hyperbólicos el logaritmo de la
unidad es 0 , y el logaritmo de 10 es 2,30258509,
que llamaremos N . Luego el logaritmo hyperbólico de 10,
ó N , es al logaritmo vulgar del mismo número 10 , que
es 1 , como la subtangente de la logarítmica hyperbóli-
ca es á la subtangente de la logarítmica de las tablas, que
llamaremos M , de cuya proporcion se saca que el valor de
esta subtangente es $M = \frac{1}{N} = 0,43429448$.

480 En virtud de esto es facil hallar por medio de
las tablas ordinarias el logaritmo hyperbólico de un núme-
ro dado , que llamaremos B . Se buscará en las tablas el lo-
garitmo A del número dado B , se le multiplicará por N
 $= 2,30258509$, el producto AN será el logaritmo hy-
perbólico de B . Porque la subtangente M de la logarítmica
de las tablas es á la subtangente 1 de la logarítmica hy-
perbólica , como A logaritmo de B tomado en las tablas
es al logaritmo hyperbólico de B , que por lo mismo será
 $\frac{A}{M} = AN$, por ser $M = \frac{1}{N}$. Por medio de la misma pro-
porcion tambien se puede hallar qué número B corres-
ponde á un logaritmo hyperbólico dado. Porque si lla-
mamos C el logaritmo hyperbólico dado del número B ,
tendremos $1 : M :: C : A$, logaritmo tabular de B , que

Fig. será por consiguiente MC , á cuyo lado se hallará en las tablas el número correspondiente B .

481 Digamos por fin la razon por que se llaman hyperbólicos los logaritmos tomados en el systema cuyo módulo $= 1$, ó en la logarítmica cuya subtangente $= 1$.

207. Si en la hypérbola equilátera $ECMm$ comparada con sus asýmtotas AD , AP , suponemos $AB = BC = 1$, y llamamos la abscisa AP , x ; la ordenada PM , y ; la equacion de la espresada hypérbola será $xy = 1$ (171); luego $y = \frac{1}{x}$. Si substituimos este valor de y en la espresion ydx , que será la diferencial de la area hyperbólica (474) $CBPM$, será $ydx = \frac{dx}{x}$, y por consiguiente dicha area $CBPM = \int ydx = Lx$, con tal que este logaritmo de x se tome en la logarítmica cuya subtangente es la unidad, ó que el logaritmo hyperbólico de AP , x , es igual al espacio hyperbólico $BCMP$. Y como esto manifiesta que la invencion de los logaritmos pende de la quadratura de la hypérbola, este es el motivo de llamarse hyperbólicos los logaritmos sacados en el systema cuyo módulo $= 1$. Mas adelante diremos qué logaritmos hyperbólicos salen quando no es equilátera la hypérbola.

482 Pero como entre las dos asýmtotas AP , AD se pueden trazar diferentes hypérbolas equiláteras, pueden corresponderle á la misma abscisa AP distintos espacios hyperbólicos, y por lo mismo diferentes logaritmos. Porque
208. si entre las asýmtotas AC , AG trazamos dos hypérbolas equiláteras Dpc , $bp'c'$, y tiramos las ordenadas BDb , Ppp' ,
po-

podrá espresar cada uno de los dos espacios $BDpP$, ó $Bbp'P$ Fig. el logaritmo de AP . Pero como vamos á demostrar que estos espacios guardarian unos con otros la misma razon que las potencias de las hypérbolas DC , $b'c'$, quedará probado que habrá la misma razon entre los logaritmos que representan.

Porque si por un punto qualquiera E de la porcion BP tiramos á las dos rectas BD , Pp una paralela que encuentra la hypérbola $bp'c'$ en F , y la hypérbola Dpc en L ; y llamamos AE , x ; aa , la potencia de la hypérbola Dpc ; y bb , la de la hypérbola $bp'c'$, tendremos (171) $EL = \frac{aa}{x}$, y $EF = \frac{bb}{x}$, y por lo mismo $EL : EF :: aa : bb$. Y como esto se verifica cayga donde cayere en la porcion BP el punto E ; se sigue (309) que el espacio hyperbólico $BDpP : Bbp'P :: aa : bb$. Por consiguiente para determinar la verdadera cantidad de los logaritmos hyperbólicos en los diferentes casos que puedan ocurrir, es preciso que la potencia de la hypérbola haga officios de módulo, ó saber el valor de dicha potencia.















483 Así como hay integrales que, segun acabamos de ver, se reducen á los logaritmos, las hay tambien que se sacan por medio de arcos de círculo. Y del mismo modo que los espacios hyperbólicos que pueden representar el logaritmo de un mismo número, pueden variar segun variaren las potencias de las hypérbolas á que se refieren, tambien puede variar la medida de un ángulo ó un arco que espresare una integral, segun variare el radio del círculo á que pertenciere. Vamos, pues, á proponer un método

Fig. do fijo que pueda dirigirnos con seguridad.

484 Los Geómetras de todos los siglos han mirado constantemente la circunferencia del círculo como la mas acomodada entre todas las líneas rectas ó curvas para medir los ángulos ; porque una vez dado el círculo , los arcos de esta curva son siempre como la cantidad de los ángulos: esta analogía subministra un método facil para hallar el arco ú el ángulo , quando es dado el uno de los dos. Pero una vez que los ángulos se hallan muy facilmente por las tablas de los senos y tangentes , quando son conocidos sus senos y tangentes , se logrará con suma brevedad el conocimiento de la cantidad absoluta de los arcos que midieren dichos ángulos.

485 A fin de que sea mas perceptible este método, recordaremos que por lo probado (356) consta que si llamamos r el radio CA del círculo ABD &c. y x su tangente AE , el elemento del arco AB será $= \frac{r dx}{rr + xx}$, de donde resulta que $S. \frac{r dx}{rr + xx}$ será el valor del arco AB , que mide el ángulo ACB .

486 Bien se echa de ver que la cantidad del arco AB que mide el ángulo ACB es arbitraria , y que con tomar radios de diferente longitud se pueden trazar infinitas circunferencias , cuyos arcos comprendidos entre las rectas CA , CB podrian ser cada uno la medida del ángulo ACB . Por esta razon es indispensable valerse de algun módulo que determine qual es entre todos los arcos posibles que se pueden trazar dentro de un mismo ángulo , el que corresponde al





al punto de que se trata , porque sin este cuidado saldrian Fig. indeterminadas las integrales que los arcos han de espresar, pues son las longitudes de los arcos , y no las cantidades de los ángulos , las que determinan el valor de las integrales. Como los arcos semejantes están unos con otros en la misma razon que los radios , es el radio la línea mas conocida en el círculo , hallándose esta línea en todos los cálculos donde esta curva hace algun papel ; es , pues , muy del caso tomarle por el módulo , al qual se han de referir todas las medidas de los ángulos.

De donde hemos de inferir que el arco AB es la medida del ángulo ACB , cuyo módulo ó radio es r , cuyo arco es la integral de la diferencial $\frac{r dx}{r + x^2}$.

487 Una vez que segun probamos (424) el radio del círculo se há á la semicircunferencia como π á $3,1415926535 \&c.$ si llamamos al radio R , tendremos esta proporcion $3,1415926535 \&c. : 1 :: 180^\circ : R = 57,29577951 \&c.$ grados ó $57^\circ 17' 44''$ con muy corta diferencia ; por donde se echa de ver que en qualquiera círculo el radio es igual á un arco de $57^\circ 17' 44''$. En virtud de esto , una vez que conociésemos un ángulo , podremos averiguar la longitud del arco que le mide, con tal que esté dado el radio ; porque es evidente que el arco de $57^\circ 17' 44''$ es á la longitud del radio , ó al número de las partes de que suponemos que consta el radio, como el número de los grados de otro ángulo qualquiera es á la longitud del arco que le mide ; hagamos $57^\circ 17' 44''$

Fig. ó 57,295779 &c. $\equiv m$; sea N el número de grados de un ángulo conocido qualquiera; Z , la longitud del arco que le mide; R , el radio con que se ha trazado dicho arco; la proporcion que hemos hecho será $m : N :: R : Z \equiv \frac{N \times R}{m} \equiv N \times R \times r$, en el supuesto de ser $\frac{1}{m} \equiv \frac{1}{57,295779 \text{ \&c.}}$. $\equiv 0,0174532925 \text{ \&c.} \equiv r$.

488 Concluida esta digresion, volvamos al asunto. De lo dicho (476) inferiremos que $S. - \frac{dx}{x} \equiv -Lx$, ó lo que es lo propio $L \frac{1}{x}$, como es facil comprobarlo diferenciando $L \frac{1}{x}$. Porque su diferencial es $d\left(\frac{1}{x}\right)$ dividida por $\frac{1}{x}$ (343), esto es $-\frac{dx}{xx}$ dividida por $\frac{1}{x} \equiv -\frac{dx}{x}$.

489 Por consiguiente es facil sacar la integral de una diferencial que no lleva mas que un término, y de una diferencial que lleva muchos términos, con tal que en cada uno de estos no haya mas que una sola variable elevada en dicho término á una potencia qualquiera. Si la diferencial propuesta fuese, por egemplo, $3bx^2dx + cx^3dx + 2c^3ydy - ffpdz$, cada uno de sus términos se integraria separadamente por la regla fundamental, como sino hubiese otros. La integral sería, pues, $bx^3 + \frac{cx^4}{4} + c^3yy - ffpz$. Es facil comprobarlo, porque si diferenciamos esta integral, sacaremos la diferencial propuesta.

490 Por la misma regla se integran tambien las diferenciales fraccionarias, en cuyo denominador no hay mas que constantes. La integral de $\frac{(ax^m + px^{p-1})dx}{aa + bb}$ es . . .

Fig.

$$\frac{ax^{m+1}}{m+1} + x \cdot \frac{bx^2 + 2c^4 y dy}{a} = \frac{b^3 x^3}{2a} + \frac{2c^4 y^3}{3a}. \text{ Fúndase}$$

esta regla en que las constantes se han de hallar en la integral del mismo modo que en la diferencial, porque quando se diferencia una cantidad, no se hace operacion ni mudanza alguna en las constantes (327).

491 Tambien se aplica la regla fundamental para integrar algunas diferenciales fraccionarias que llevan una variable en el denominador, qual sería esta $\frac{dx}{x^2} = -x^{-2} dx$, cuya integral es en virtud de dicha regla $\frac{1}{x}$. La integral de $\frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2x^2}$. En general, si hubiéramos de integrar $\frac{dx}{x^m} = x^{-m} dx$, borraríamos dx , añadiríamos una unidad al esponente m , y dividiéndolo todo por $-m+1$, sacaríamos que $\int x^{-m} dx = \frac{1}{-(m-1) \cdot x^{m-1}}$.

492 La misma regla sirve igualmente para integrar una diferencial que sea el producto de una funcion de x y dx multiplicada por una cantidad que está debajo de un signo qualquiera, con tal que la cantidad que está fuera del signo sea el producto de una constante qualquiera por la diferencial de la cantidad que está debajo del signo radical.

Supongamos que hayamos de integrar $\frac{1}{2}(a^2 dx + 2bxdx) \times (a^2 x + bx^2)^{\frac{1}{2}}$, en cuya cantidad la que está fuera del signo radical, es á saber $\frac{1}{2}(a^2 dx + 2bxdx)$ es el producto

Fig. del coeficiente constante $\frac{1}{2}$ por $a^2dx + 2bxdx$, que es la diferencial de la cantidad $a^2x + bx^2$ que está debajo del radical. La integral de esta diferencial será en virtud de la regla fundamental $\frac{1}{3}(a^2x + bx^2)^{\frac{3}{2}}$. Porque para poner en práctica la regla añado una unidad al esponente $\frac{1}{2}$, que con esto es $\frac{3}{2}$, divido la diferencial por $\frac{3}{2}$ multiplicado por la diferencial $a^2dx + 2bxdx$ de $a^2x + bx^2$, el cociente $\frac{1}{3}(a^2x + bx^2)^{\frac{3}{2}}$ será la integral de la diferencial propuesta.

493 La razon es muy facil de percibir, porque si hacemos $aax + bxx = y$, tendremos $\frac{1}{2}(a^2dx + 2bxdx) \times (a^2x + bx^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}dy \times y^{\frac{1}{2}}$. Por consiguiente, hemos de hacer con la cantidad propuesta las mismas operaciones que haríamos con $\frac{1}{2}dy \times y^{\frac{1}{2}}$ para sacar su integral.

A muchos podrá parecer dificultosa la aplicacion de la regla que acabamos de dar, porque no alcanzarán cómo se podrán conocer las diferenciales que comprehende el caso propuesto (492); pero se les hará muy facil esta aplicacion valiéndose de las substituciones de que hablaremos mas adelante.

494 Quando una diferencial dx está multiplicada por alguna potencia de una cantidad complexa racional, ó en cuyo denominador no hay mas que constantes; si fuese el esponente de la potencia un número entero positivo, y no hubiese mas que una variable x , se sacará la integral por la regla que acabamos de dar, elevando la cantidad complexa á la potencia que señalare su esponente, multipli-

plicando despues cada término por dx , y sacando finalmente la integral de cada uno. Si aplicáramos esta regla para sacar la integral de $dx.(a+bx)^2$, formaríamos el cuadrado $a^2 + 2abx + b^2x^2$, le multiplicaríamos por dx ; de esta multiplicacion resultaría $a^2dx + 2abxdx + b^2x^2dx$; é integrando cada término por la regla fundamental, quedaría integrada la cantidad propuesta.

495 En general, siempre que la diferencial propuesta fuese $bx^kdx.(e+cx^q)^m$, en el supuesto de ser m un número entero positivo, y q, k números cualesquiera, enteros ó quebrados, positivos ó negativos, se podrá hallar su integral finita y cabal por la primera regla. Para conseguirlo, se elevará $e+cx^q$ á la potencia, cuyo exponente es m , valiéndose de la fórmula dada (II. 99); se multiplicará cada término de dicha potencia que siempre será finita, por bx^kdx , y se tomará la integral de cada uno. Egecutando estas operaciones en el caso actual, sacarémos

$$\text{que } \int bx^kdx(e+cx^q)^m = \frac{be^m x^{k+1}}{k+1} + \frac{mbe^{m-1}}{k+1+q} \\ \times cx^{k+1+q} + \frac{m \cdot \frac{(m-1)}{2}}{k+1+2q} \times be^{m-2} ccx^{k+1+2q} + \&c.$$

Si la cantidad $(e+cx^q)^m$ fuese multiplicada por un multinomio diferencial, como si hubiésemos de integrar $(x^pdx + x^rdx)(e+cx^q)^m$, sacaríamos la integral por par-

Fig. partes integrando primero $x^p dx (e + cx^q)^m$, despues $x^r dx (e + cx^q)^m$, y la suma de estas dos integrales sería la integral de la diferencial propuesta.

496 Esta regla padece una excepcion quando despues de formada la potencia m del binomio, y egecutada su multiplicacion por $bx^k dx$ se halla en algun término la cantidad $\frac{dx}{x}$; porque éntonces será preciso acudir á los logaritmos para integrar el expresado término (476).

497 Hay fórmulas que se integran facilmente dividiéndolas primero en dos partes, para reducirlas á la expresion general $xdy + ydx$, que es la diferencial de xy (326).

Propongámonos integrar, por egeemplo, la diferencial $\frac{-a^2 dx}{xx\sqrt{(aa-xx)}}$. La darémos esta forma $\frac{(-aa+xx-xx)dx}{xx\sqrt{(aa-xx)}}$, que dividirémos en estas dos partes $\frac{-dx\sqrt{(aa-xx)}}{x^2} - \frac{xx dx}{x\sqrt{(aa-xx)}}$, ó $\sqrt{(aa-xx)} \times d\frac{1}{x} + \frac{1}{x} \times d\sqrt{(aa-xx)}$; luego su integral será $\frac{\sqrt{(aa-xx)}}{x}$.

498 Lo propio sucederá con la diferencial $\frac{-a^2 dx}{(xx-aa)^{\frac{3}{2}}}$; á la qual darémos esta forma $\frac{xx dx - a^2 dx - x^2 dx}{(xx-aa)^{\frac{3}{2}}}$, la partirémos despues en las dos partes $\frac{dx}{(xx-aa)^{\frac{3}{2}}} - \frac{x^2 dx}{(xx-aa)^{\frac{3}{2}}}$, ó $\frac{1}{(xx-aa)^{\frac{1}{2}}} \cdot dx - x \cdot d \cdot \frac{1}{(xx-aa)^{\frac{1}{2}}}$. La integral de esta última cantidad es $= \frac{x}{(xx-aa)^{\frac{1}{2}}}$.

499 También se integra por la regla fundamental Fig. la diferencial $z^m u^n dx$, sean las que fueren las variables z, u, x , y los esponentes m y n , con tal que su factor diferencial $u dx$ tenga con la diferencial $z^p dz$ una razón dada, sea el que fuere el esponente p de z^p .

Porque con hacer $a : b :: z^p dz : u^n dx$, sacaremos $u^n dx = \frac{bz^p dz}{a}$; luego $z^m u^n dx = \frac{bz^{p+m} dz}{a}$, cuya integral es $\frac{bz^{p+m+1}}{a(p+m+1)}$.

Cómo se completan las integrales que dá el cálculo.

500 Hemos visto (325) que después de diferenciada una cantidad complexa que lleva algunos términos constantes, estos se desaparecen después de ejecutada la diferenciación. Por consiguiente, puede suceder en muchos casos que después de sacada la integral de una cantidad sea preciso añadirla, para completarla, alguna cantidad constante que la diferenciación pudo haber eliminado. El valor de esta constante, que llamaremos C , le determina siempre indefectiblemente la naturaleza misma de la cuestión que resuelve el calculador; vamos á declarar qué método le dirige en esta determinación.

Supongamos que sea AMN una parábola cuyas ordenadas tengan su origen en el punto B . Llamaremos AB , 210. a ; BP , x ; PN , y ; y supondremos el parámetro $= 1$. Será, pues, la equación de esta curva $yy = x + a$, ó $y =$
(x

Fig. $(x+a)^{\frac{1}{2}}$. Por lo dicho (474) sabemos que la expresión del espacio elemental $PNpn$ es $dx\sqrt{x+a}$; será, pues, $\int dx(x+a)^{\frac{1}{2}}$ el valor del espacio total $BPNM$; y como $\frac{2}{3}(x+a)^{\frac{3}{2}}$ es (492) la integral de $dx\sqrt{x+a}$, podría inferirse que ha de ser también $\frac{2}{3}(x+a)^{\frac{3}{2}}$ el valor del espacio $BPNM$. Pero como $dx(x+a)^{\frac{1}{2}}$ es la diferencial de $\frac{2}{3}(x+a)^{\frac{3}{2}} \pm C$ igualmente que de $\frac{2}{3}(x+a)^{\frac{3}{2}}$, la integral completa de dicha diferencial será $\frac{2}{3}(x+a)^{\frac{3}{2}} \pm C$, siendo C la cantidad constante que se le ha de añadir ó quitar á la integral que dá el cálculo, para completarla; cuya constante es nula en algunos casos, y real en otros.

501 Sentado esto, la constante C se determina por la regla siguiente. *Hágase igual á cero la variable x de la integral, y si de este supuesto resultase ser la integral $= 0$, será señal de que salió cabal; si despues de supuesta $x=0$, quedare en la integral alguna constante, se la añadirá á la integral hallada dicha constante con un signo opuesto al que llevare, y estará completa la integral.*

Porque supongamos, por egemplo, que sea Q el valor completo de una integral, quando x tiene cierto valor determinado que llamaremos a , y que siendo X la integral que dá el cálculo, se le haya de añadir, para completarla, la constante C cuyo valor ignoramos; por manera que sea $Q = X + C$.

Supongamos que con substituir en X a en lugar de x , X se transforme en A ; será $A + C$ el valor completo de la

la integral , quando $x = a$; y como suponemos que esta Fig.
integral completa $= Q$, será $A + C = Q$, y $C = Q - A$.

Pero las mas veces no es dado , ni puede serlo , el valor completo Q de la integral , y es preciso indagar en qué parte es cero el valor Q de la integral ; porque quando $Q = 0$, $A + C = 0$, y $C = -A$.

En vez de hacer $x = a$, es mas comun suponer $x = 0$, cuyo supuesto es mas natural , porque la area de una curva empieza donde empiezan las abscisas ; y por lo mismo $Q = 0$ quando $x = 0$. Estos son los fundamentos de la regla ; apliquémosla á algunos egemplos.

502 Si fuese $y = \sqrt{px}$, será $ydx = dx\sqrt{px}$, cuya integral (472) $\int ydx = \frac{2}{3}\sqrt{p} \times x^{\frac{3}{2}}$. Como el supuesto de $x = 0$, hace que toda la integral sea $= 0$, es prueba de que está completa la integral hallada.

503 Si suponemos $x = 0$ en $\frac{2}{3}(x + a)^{\frac{3}{2}} = X$ que es la integral de $dx(x + a)^{\frac{1}{2}}$, resultará $\frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}} = A$; luego $\frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}} + C = Q$. Haremos , pues , $Q = 0$, y por lo mismo será $\frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}} + C = 0$, y $C = -\frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}}$, cuya equation manifiesta que hemos de añadir la constante con un signo opuesto al que lleva en la integral.

504 Hay sin embargo algunos casos en que no se puede suponer $x = 0$. Supongamos , por egemplo , que estando el origen de las abscisas en A , representemos por el espacio parabólico BPC la integral de $dx\sqrt{(px - pa)}$. En este caso la ordenada es imaginaria , y por la regla sacaremos tambien que el espacio BPC es imaginario.

Por-

Fig. Porque $S.dx(px - pa)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{p} \cdot \frac{2}{3}(x - a)^{\frac{3}{2}}$; el supuesto de $x = 0$ reduce esta integral á $\sqrt{p} \frac{2}{3} \times -a^{\frac{3}{2}}$; es, pues, imaginaria la constante. Y así ha de ser, porque como son imaginarias todas las ordenadas desde A hasta B , es tambien imaginaria la area parabólica comprendida entre dichos dos puntos.

Verdad es que el espacio BPC es real; pero tambien es verdad (II, 189) que la suma de un espacio imaginario y un espacio real, es imaginaria.

Pero si de toda la area de la curva no quisiéramos mas que la porcion BPC , deberíamos considerar la ordenada donde es cero, hacer x igual al valor que la abscisa tuviere en dicho punto, y no igual á cero, y será nula la constante. Si en el egeemplo propuesto contamos la area de la curva desde el punto B , y hacemos $BP = a$, sería preciso hacer $x = a$; substituyendo este valor de x en su lugar en la integral $\sqrt{p} \cdot \frac{2}{3}(x - a)^{\frac{3}{2}}$ sacaremos $\sqrt{p} \cdot \frac{2}{3}(a - a)^{\frac{3}{2}} = 0$. Luego $Q = 0$, y tambien $C = 0$.

505 De aquí inferiremos, que si la integral es cero no quando $x = 0$, sino quando x tiene algun valor determinado, y es por egeemplo a ; la constante es la misma integral que dá el cálculo, substituyendo a en lugar de x .

Por egeemplo $S.x^2 dx = \frac{x^3}{3}$, que quando $x = a$ es $\frac{a^3}{3}$. Luego será $Q = \frac{a^3}{3} + C$; y como en este caso $Q = 0$, será $\frac{a^3}{3} + C = 0$, y $C = -\frac{a^3}{3}$. Luego la integral cabal ó $Q = \frac{x^3 - a^3}{3}$.

Sí

Si $S. -x^n dx = -\frac{x^{n+1}}{n+1}$ es cero quando $x = a$; será $-\frac{a^{n+1}}{n+1} + C = 0$, y $C = \frac{a^{n+1}}{n+1}$. Luego la integral completa ó $Q = \frac{a^{n+1} - x^{n+1}}{n+1}$.

Fig.

Finalmente si $S. x dx (c^3 + bx^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{(c^3 + bx^2)^{\frac{3}{2}}}{3b}$ fuese cero quando $x = a$; sería $\frac{(c^3 + ba^2)^{\frac{3}{2}}}{3b} + C = 0$; luego $C = -\frac{(c^3 + ba^2)^{\frac{3}{2}}}{3b}$, y $Q = \frac{(c^3 + bx^2)^{\frac{3}{2}} - (c^3 + ba^2)^{\frac{3}{2}}}{3b}$.

5 o 6 Despues de todo lo dicho se viene á los ojos

1.º que como $S. ax dx = \frac{ax^2}{2}$ es cero quando $x = 0$, es cabal la integral.

2.º que por ser $S. dx(a+x)^3 = \frac{(a+x)^4}{4} = \frac{a^4}{4}$, quando $x = 0$, será $S. dx(a+x)^3 = \frac{(a+x)^4 - a^4}{4}$.

3.º que $S. x^{m-1} dx (a^m + x^m)^n = \frac{(a^m + x^m)^{n+1}}{m(n+1)}$ se re-

duce á $\frac{(a^m)^{n+1}}{m(n+1)} = \frac{a^{mn+m}}{m(n+1)}$ quando $x = 0$, y por lo

mismo que $\frac{(a^m + x^m)^{n+1} - a^{mn+m}}{m(n+1)}$ es la integral comple-

ta de $S. x^{m-1} dx (a^m + x^m)^n$.

4.º que como $S. (mbx^{m-1} dx + ncx^{n-1} dx) (a + bx^m$

+

Fig. $+ cx^n)^p = \frac{(a + bx^m + cx^n)^{p+1}}{p+1}$ se reduce á $\frac{(a)^{p+1}}{p+1}$
 quando $x = 0$, será $\frac{(a + bx + cx^n)^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}$ la in-
 tegral completa de $(mbx^{m-1} dx + ncx^{n-1} dx)(a + bx^m + cx^n)^p$.

De la integracion de las diferenciales binomias que admiten una integral algebraica.

507 Todo el cálculo integral está fundado en la primera regla que hemos sentado para integrar $x^m dx$. Pero como no se aplica esta regla con igual facilidad á qualesquiera diferenciales, y hay muchas con las quales no se ha podido practicar, habiendo también entre las que por ella se pueden integrar algunas sumamente complicadas; el mayor empeño del cálculo integral consiste en preparar las integrales de modo que se las dé la espresion mas sencilla que sea posible. Para cuyo fin se valen los Analystas de varias transformaciones, de las quales daremos á conocer algunas, aplicándolas á la integracion de las diferenciales binomias que admiten una integral algebraica.

508 Llamamos *Diferencial binomia* toda diferencial en que la cantidad complexa la mas compuesta, es una potencia qualquiera de un binomio; $gx^m dx(a + bx^n)^p$ puede representar una diferencial binomia qualquiera, porque pueden representar g, a, b, m, n, p todos los números imaginables, positivos ó negativos.

509 No todas las diferenciales binomias se pueden Fig. integrar ; pero de lo dicho hasta aquí en este asunto inferiremos que se podrá integrar una diferencial binomia $gx^m dx(a+bx^n)^p$ en los dos casos siguientes.

1.º Quando fuere p un número entero positivo qualquiera , sean por otra parte los que fueren los esponentes m y n (494), excepto el caso especificado (473).

2.º Quando el esponente m de x fuera del binomio, fuere una unidad menor que el esponente n que lleva x en el binomio ; quieró decir que en general se puede integrar $gx^{n-1} dx(a+bx^n)^p$, sean n y p lo que se quisiere , excepto quando fuere $p = -1$. Con efecto $gx^{n-1} dx$ es la diferencial de $a+bx^n$, multiplicada por $\frac{g}{nb}$, esto es , por una constante ; estará , pues , esta diferencial en el caso expresado (492), y se integrará por lo que allí digimos , esto es , por la regla fundamental , considerando $a+bx^n$ como una sola cantidad.

Fuera de los dos casos que acabamos de individualizar , hay otros dos que se pueden comprehender solo en uno , y que incluyen al precedente.

510 1.º Se puede integrar qualquiera diferencial binomia , quando el esponente de x fuera del binomio es tal , que añadiéndole una unidad , puede ser dividido cabalmente por el esponente que lleva x en el binomio , y sale al cociente un número entero positivo. Las transformaciones son el recurso que sirve para integrar las dife-

Fig. renciales que este caso incluye , y demostrar que el método es general.

Propongámonos integrar $gx^3dx \times (a + bx^2)^{\frac{4}{5}}$. Será integrable esta diferencial , porque si al esponente de x fuera del binomio que es 3 , le añado una unidad , la suma será 4 , cuyo número dividido por el esponente 2 de x en el binomio , dá el cociente 2 , que es un número entero positivo.

Haremos , pues , $a + bx^2 = z$, y sacaremos $x^2 = \frac{z-a}{b}$. Repararemos que x^3dx que está antes de la cantidad binomia , es la diferencial de x^4 quadrado de x^2 , sin mas diferencia que la de estar dicha diferencial multiplicada por una cantidad constante. Elevemos , pues , al quadrado la equacion $x^2 = \frac{z-a}{b}$, y tendremos $x^4 = \frac{(z-a)^2}{b^2}$; luego diferenciando sacaremos $4x^3dx = 2\left(\frac{z-a}{b}\right)\frac{dz}{b}$; y por consiguiente $x^3dx = \left(\frac{z-a}{b}\right) \cdot \frac{dz}{2b} = \frac{(z-a)dz}{2b^2}$. Si en lugar de x^3dx y $(a + bx^2)$ substituimos sus valores en z , sacaremos

$$\frac{z(z-a)dz}{2b^2} \times z^{\frac{4}{5}}, \text{ ó } \frac{gz^{\frac{4}{5}+1}dz}{2b^2} - \frac{gaz^{\frac{4}{5}}dz}{2b^2}. \text{ Luego } S. gx^3dx(a + bx^2)^{\frac{4}{5}}$$

$$= S. \frac{gz^{\frac{4}{5}+1}dz}{2b^2} - S. \frac{gaz^{\frac{4}{5}}dz}{2b^2} = \frac{gz^{\frac{4}{5}+2}}{(\frac{4}{5}+2)2b^2} - \frac{gaz^{\frac{4}{5}+1}}{(\frac{4}{5}+1)2b} + C;$$

$$\text{ó (por ser } \frac{gz^{\frac{4}{5}+1}}{2b^2} \text{ multiplicador comun)} = \frac{gz^{\frac{4}{5}+1}}{2b^2} \left(\frac{z}{(\frac{4}{5}+2)} \right.$$

$$\left. - \frac{a}{(\frac{4}{5}+1)} \right) + C = \frac{gz^{\frac{4}{5}+1}}{2b^2} \left(\frac{5}{14}z - \frac{5}{9}a \right) + C; \text{ subs-}$$

tituyendo finalmente en lugar de z su valor $a + bx^2$, tendremos-

ñaremos $\frac{g}{2b^2} (a + bx^2)^{\frac{4}{3}} + C$. $\left[\frac{5}{14} (a + bx^2) - \frac{5}{9} a \right] + C$. Fig.

511 Lo propio practicaríamos con otra diferencial en que concurririen las mismas condiciones, pongo por caso con $gx^8 dx (a + bx^3)^{-\frac{2}{3}}$, que ha de ser integrable, pues el cociente del esponente 8, añadiéndole una unidad, ó el cociente de 9 dividido por 3 esponente de x en el binomio, es un número entero positivo. Haremos, pues, $a + bx^3 = z$, y será $x^3 = \sqrt[3]{z-a}$; y como $x^8 dx$ es la diferencial de x^9 sin mas diferencia que la de estar multiplicada por una cantidad constante; para sacar x^9 cubaré la equacion $x^3 = \sqrt[3]{z-a}$, y sacaré $x^9 = \left(\sqrt[3]{z-a}\right)^3$, diferenciando para sacar $x^8 dx$, resultará $9x^8 dx = 3 \cdot \left(\sqrt[3]{z-a}\right)^2 \frac{dz}{3b}$, y por lo mismo $x^8 dx = \left(\sqrt[3]{z-a}\right)^2 \frac{dz}{3b}$. Por consiguiente la diferencial $gx^8 dx (a + bx^3)^{-\frac{2}{3}}$ se transformará en $g \cdot \left(\sqrt[3]{z-a}\right)^2 \frac{dz}{3b} \cdot z^{-\frac{2}{3}}$, que, despues de elevado $\left(\sqrt[3]{z-a}\right)$ al quadrado, y hecha la multiplicacion por $z^{-\frac{2}{3}}$, es $\frac{gz^{2-\frac{2}{3}} dz}{3b^3} = \frac{2gaz^{1-\frac{2}{3}} dz}{3b^3} + \frac{ga^2z^{-\frac{2}{3}} dz}{3b^3}$, cuya integral es $\frac{gz^{3-\frac{2}{3}}}{3b^3(3-\frac{2}{3})} = \frac{2gaz^{2-\frac{2}{3}}}{3b^3(2-\frac{2}{3})} + \frac{ga^2z^{1-\frac{2}{3}}}{3b^3(1-\frac{2}{3})} + C$; que por razon del multiplicador comun $\frac{g}{3b^3} z^{1-\frac{2}{3}}$ se reduce á $\frac{g}{3b^3} z^{1-\frac{2}{3}} \times \left(\frac{z^2}{3-\frac{2}{3}} - \frac{2az}{2-\frac{2}{3}} + \frac{a^2}{1-\frac{2}{3}} \right) + C$, ó $\frac{g}{3b^3} z^{1-\frac{2}{3}} \left(\frac{3z^2}{7} - \frac{6az}{4} + 3a^2 \right) + C$, y finalmente substituyendo en lugar de z su valor $a + bx^3$,

Fig. la integral será $\frac{x}{3b^3} \times (a + bx^3)^{1-\frac{2}{3}} \left[\frac{3}{7}(a + bx^3)^2 - \frac{6a}{4}(a + bx^3) + 3a^2 \right] + C.$

Este es el método que se deberá practicar siempre que el esponente de x fuera del binomio aumentado de una unidad, y dividido por el esponente que lleva x en el binomio, diere al cociente un número entero positivo.

512 2.º Aunque no concurra en una diferencial binomia la espresada circunstancia, en muchas ocasiones se consigue facilmente comprehenderla en el caso que acabamos de considerar, mediante una preparacion muy sencilla, que consiste en hacer que sea negativo el esponente de x en el binomio, quando fuere positivo, ó positivo si fuese negativo. Para conseguirlo, se han de dividir ambos términos del binomio por la potencia de x que está en el binomio, y multiplicar la parte de afuera del binomio, por la misma potencia elevada á la potencia que espresa el esponente total del binomio. Por egemplo, para hacer que sea negativo el esponente 2 de x en el binomio $gx^4dx(a + bx^2)^5$, divido $a + bx^2$ por x^2 , y saco $gx^4dx\left(\frac{a}{x^2} + b\right)^5$ ó $gx^4dx(ax^{-2} + b)^5$; pero como la cantidad x^2 , por la qual hemos dividido, se ha de considerar como elevada á la quinta potencia, pues está debajo del esponente total 5 del binomio, es preciso á fin de hacer una compensacion, multiplicar la parte de afuera por $(x^2)^5$, esto es, por x^{10} , y sale $gx^{14}dx(ax^{-2} + b)^5$.

Haciendo uso de esta preparacion, se hallarán comprehendidas en el caso antecedente muchas mas diferenciales:

bi-

Fig.

binomías. Por egemplo , si hubiera de integrar $\frac{aadx}{(aa+xx)^{\frac{3}{2}}}$ ó $aadx(aa+xx)^{-\frac{3}{2}}$, repararía que el esponente de x fuera del binomio , esto es , o aumentado de una unidad , ó no se puede dividir cabalmente por el esponente 2 que lleva x en el binomio. Pero si hacemos que sea negativa la potencia de x en el binomio , con escribir $aa(x^2)^{-\frac{3}{2}} dx$ $(aax^{-2}+1)^{-\frac{3}{2}}$, que se reduce á $aax^{-3}dx(aax^{-2}+1)^{-\frac{3}{2}}$, hallaremos que añadiendo 1 á -3 , la suma 2 dividida por el esponente -2 que lleva x en el binomio , es un número entero positivo ; por consiguiente haciendo $aax^{-2}+1=z$, sacaremos $x^{-2}=\frac{z-1}{aa}$; y como $x^{-3}dx$ es la diferencial de x^{-2} , sin mas diferencia que la de estar multiplicada por una cantidad constante , diferenciaremos , y saldrá $-2x^{-3}dx=\frac{dz}{aa}$; luego $x^{-3}dx=-\frac{dz}{2aa}$. Por consiguiente la diferencial $aax^{-3}dx(aax^{-2}+1)^{-\frac{3}{2}}$ se transforma en $\frac{-aa \cdot dz}{2aa} \cdot z^{-\frac{3}{2}}$, ó $\frac{-z^{-\frac{3}{2}}dz}{2}$, cuya inte-

gral es $\frac{-z^{1-\frac{3}{2}}}{2(1-\frac{3}{2})}+C$, ó $z^{-\frac{1}{2}}+C$, ó (con substituir en

lugar de z su valor), $(aax^{-2}+1)^{-\frac{1}{2}}+C$, ó $\frac{1}{\sqrt{(aax^{-2}+1)}}+C$, que se reduce á $\frac{x}{\sqrt{(aa+xx)}}+C$.

513 Aun quando en ambos términos del binomio hubiera alguna potencia de x , prepararíamos la cantidad de modo que no la hubiera sino en uno de los dos , divi-

Fig. diendo el binomio por una de las potencias de x que se hallare en el uno de sus términos, y multiplicando la parte de afuera por la misma potencia elevada á la potencia que espresare el esponente del binomio (512).

Así, si hubiera de integrar $\frac{adx}{x\sqrt{(ax+xx)}}$, ó $axx^{-1}dx (ax+xx)^{-\frac{1}{2}}$, la transformaria en $axx^{-1}(x)^{-\frac{1}{2}}dx (a+x)^{-\frac{1}{2}}$, dividiendo el binomio por x , y multiplicando la parte de afuera por x elevada á la potencia $-\frac{1}{2}$ que es la del binomio. La propuesta quedará reducida á $axx^{-\frac{3}{2}}dx(a+x)^{-\frac{1}{2}}$. Si la aplicamos la regla del primer caso (510) no se podrá integrar; pero si hacemos que sea negativo el esponente de x en el binomio, tendremos $axx^{-\frac{3}{2}} \cdot (x)^{-\frac{1}{2}}dx(ax^{-1}+1)^{-\frac{1}{2}}$, ó $axx^{-2}dx \times (ax^{-1}+1)^{-\frac{1}{2}}$ que es integrable (512). Haremos, pues, $ax^{-1}+1=z$, y será $x^{-1}=\frac{z-1}{a}$, cuya diferencial es $-x^{-2}dx=\frac{dz}{a}$, ó $x^{-2}dx=-\frac{dz}{a}$; luego $axx^{-2}dx (ax^{-1}+1)^{-\frac{1}{2}}$ se transforma en $-adz \cdot z^{-\frac{1}{2}}$, ó $-az^{-\frac{1}{2}}dz$, cuya integral es $-\frac{az^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}}+C$, ó $-2az^{\frac{1}{2}}+C$, ó con substituir en lugar de z su valor, $-2a(ax^{-1}+1)^{\frac{1}{2}}+C$, ó finalmente $-2a\sqrt{\left(\frac{a}{x}+1\right)}+C$.

514 Las diferenciales binomias que no estuvieren comprendidas en ninguno de los dos casos que hemos especificado, no tienen integral alguna puramente algebraica.

Usos de las Series para integrar las cantidades.

515 Hay diferenciales cuya integral no es posible ha-

hallar por ninguno de los métodos que ván declarados, pero Fig.
se pueden integrar despues de transformadas en una serie de
términos que vayan menguando continuamente; hecha esta
transformacion, se integran separadamente unos quantos
de dichos términos, y con pocos suele bastar para sacar la
integral que se necesita. Bien se echa de ver que este re-
curso no es necesario, ni para las diferenciales monomias,
cuyas integrales se hallan facilmente, ni tampoco para las
binomias de que hemos hecho mencion; solo se hace in-
dispensable respecto de las que no ván comprendidas en
ninguno de los casos espresados.

516 Se hace, pues, uso de las series para integrar
estas diferenciales, que es lo propio que integrarlas por
aproximacion. Toda la dificultad consiste en reducir á se-
ries las diferenciales propuestas, cuya operacion se egecuta
del mismo modo que si fuesen cantidades de la misma na-
turaleza que las que consideramos en otro lugar (II. 286.
y sig.). Pero como en la aplicacion de las series al cálcu-
lo integral suele ser preciso elevar á una potencia, ó sa-
car una raiz de un *infinitomio*, hemos de dar ahora la fór-
mula que prometimos (II. 449) para conseguirlo.

517 Primero hemos de dar una fórmula general que
represente el producto de dos series. Para cuyo fin supon-
dremos que el primer término de cada una de las dos se-
ries sea una cantidad constante, y que el segundo no lleve
mas que la primera potencia de x . Porque una vez que
los esponentes de x han de formar una progresion arismé-

Fig. tica , es facil reducir á esta forma una serie qualquiera. Porque si el primer término llevare x , se borrará en todos los términos , pues será factor de todos , y será en virtud de esto una cantidad constante el primer término de la serie. Si el esponente de x en el segundo término fuese fraccionario ó negativo , supondremos x con su esponente igual á z , y practicando la substitucion correspondiente , serán enteros todos los términos de la serie.

Sentado esto , multiplico una por otra , segun las reglas dadas (II. 2 2 y sig.) , las dos series generales $A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 + \&c.$ y $a + bx + cx^2 + ex^3 + fx^4 + \&c.$ Llamando la primera M , y la segunda N , y egecutando la multiplicacion , sale el producto

$$aA + aBx + aCx^2 + aDx^3 + aEx^4 + aFx^5 + \&c.$$

$$bAx + bBx^2 + bCx^3 + bDx^4 + bEx^5 + \&c.$$

$$+ cAx^2 + cBx^3 + cCx^4 + cDx^5 + \&c.$$

$$+ eAx^3 + eBx^4 + eCx^5 + \&c.$$

$$+ fAx^4 + fBx^5 + \&c.$$

$$+ gAx^5 + \&c.$$

En cuyo resultado es de reparar que el primer término es el producto de los dos primeros términos de las series propuestas ; el segundo se saca multiplicando el primer término de la serie N por el segundo término de la serie M , el primer término de la serie M por el segundo de la serie N , y sumando los productos ; el tercer término es la suma de los tres productos que se sacan multiplicando el primer término de la serie N por el tercero de la serie M , el se-

gun-

gundo término de la serie N por el segundo de la serie M , Fig. y el tercer término de la serie N por el primero de la serie M ; y así de los demás.

Si las dos series que se han de multiplicar fuesen $a + x + \frac{x^2}{a} + \frac{x^3}{aa} + \frac{x^4}{a^3} + \frac{x^5}{a^4} \&c.$ y $a - 2x + \frac{3x^2}{a} - \frac{4x^3}{a^2} + \frac{5x^4}{a^3} - \frac{6x^5}{a^4} \&c.$ sería $A = a$, $B = 1$, $C = \frac{1}{a}$, $D = \frac{1}{a^2}$, $E = \frac{1}{a^3} \&c.$ $a = a$, $b = -2$, $c = \frac{3}{a}$, $e = -\frac{4}{a^2}$, $f = \frac{5}{a^3} \&c.$ y ejecutando las substituciones correspondientes saldria el producto $aa - ax + 2x^2 - \frac{2x^3}{a} + \frac{3x^4}{aa} - \frac{3x^5}{a^3} \&c.$

5 18 Para sacar el valor de $\frac{1}{a+bx+cx^2+cx^3+fx^4+gx^5+\&c.}$ supondríamos en virtud de lo dicho (II. 286 y sig.)

esta fraccion igual á la serie $A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 + Fx^5 \&c.$ que multiplicada por el denominador de la espresada fraccion daria

$$\begin{aligned} 1 &= aA + aBx + aCx^2 + aDx^3 + aEx^4 + aFx^5 + \&c. \\ &+ bAx + bBx^2 + bCx^3 + bDx^4 + bEx^5 + \&c. \\ &+ cAx^2 + cBx^3 + cCx^4 + cDx^5 + \&c. \\ &+ eAx^3 + eBx^4 + eCx^5 + \&c. \\ &+ fAx^4 + fBx^5 + \&c. \\ &+ gAx^5 + \&c. \end{aligned}$$

con suponer igual á la unidad el primer término de este producto, y cada uno de los demás igual á cero, sacaremos $A = \frac{1}{a}$, $B = \frac{-bA}{a}$, $C = \frac{-bB - cA}{a}$, $D = \frac{-bC - cB - eA}{a}$, $E = \frac{-bD - cC - eB - fA}{a}$, $F = \frac{-bE - cD - eC - fB - gA}{a} \&c.$

Si hubiéramos de hallar la serie igual al cociente de la unidad dividida por la serie $1 - \frac{2x}{a} + \frac{3x^2}{a^2} - \frac{4x^3}{a^3} + \frac{5x^4}{a^4} \&c.$ substituiríamos en los valores que acabamos de

Fig. sacar de A, B, C &c. los valores de a, b, c &c. sacados de la serie propuesta, y hallaríamos $A=1, B=\frac{2}{a}, C=\frac{1}{a^2}, D=0, E=0, F=0$ &c. Por consiguiente el cociente no es serie ninguna infinita, sino el trinomio $1 + \frac{2x}{a} + \frac{xx}{a^2}$ ó $(1 + \frac{x}{a})^2$.

519 Veamos ahora cómo se puede elevar una serie infinita ó un infinitomio á una potencia qualquiera. Supongamos que hayamos de elevar á la potencia m la serie $a + bx + cx^2 + ex^3 + fx^4 + gx^5 + hx^6 + \&c. = M$. Supondremos que la potencia m de la espresada serie es igual á $A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 + Fx^5 + Gx^6 + \&c. = N$, por manera que será $M^m = N$. Esta equacion se verifica sea el que fuere el valor de x , y por consiguiente aun quando $x=0$; pero quando $x=0$, sale $A=a^m$; luego queda determinado el valor del primer coeficiente A . Si diferenciamos la equacion $M^m = N$, tendremos $mM^{m-1}dM = dN$; y si substituimos en lugar de dM la diferencial de la serie propuesta, y en lugar de dN la diferencial de la otra á la qual suponemos igual la potencia m de la primera, sacaremos

(A)

$$mM^{m-1} \cdot (bdx + 2cxdx + 3ex^2dx + 4fx^3dx + 5gx^4dx + 6hx^5dx + \&c.) = Bdx + 2Cxdx + 3Dx^2dx + 4Ex^3dx + 5Fx^4dx + 6Gx^5dx + \&c.$$

Si consideramos que siendo por el supuesto $M^m = N$, será tambien $M^m dx = Ndx$, y que $M^{-1} = \frac{1}{M}$, ó la unidad dividida por la serie propuesta; inferiremos que si di-

vidimos el primer miembro de la equacion (*A*) por $M^m dx$,

y el segundo por Ndx , se transformará en

$$\frac{m(b+2cx+3ex^2+4fx^3+5gx^4+6hx^5+8cc.}{a+bx+cx^2+ex^3+fx^4+gx^5+hx^6+8cc.} = \frac{B+2Cx+3Dx^2+4Ex^3+5Fx^4+6Gx^5+8cc.}{A+Bx+Cx^2+Dx^3+Ex^4+Fx^5+Gx^6+8cc.}$$

520 Para determinar los coeficientes *A*, *B*, *C* &c.

eliminaremos los denominadores de la última equacion, multiplicando el numerador del primer miembro por el denominador del segundo, y el numerador del segundo miembro por el denominador del primero, y sacaremos dos productos iguales, esto es

$$\begin{aligned} m x \left\{ \begin{aligned} &bA + bBx + bCx^2 + bDx^3 + bEx^4 + bFx^5 + bGx^6 + 8cc. \\ &+ 2cAx + 2cBx^2 + 2cCx^3 + 2cDx^4 + 2cEx^5 + 2cFx^6 + 8cc. \\ &+ 3eAx^2 + 3eBx^3 + 3eCx^4 + 3eDx^5 + 3eEx^6 + 8cc. \\ &+ 4fAx^3 + 4fBx^4 + 4fCx^5 + 4fDx^6 + 8cc. \\ &+ 5gAx^4 + 5gBx^5 + 5gCx^6 + 8cc. \\ &+ 6hAx^5 + 6hBx^6 + 8cc. \\ &+ 7iAx^6 + 8cc. \end{aligned} \right. \\ = aB + bBx + cBx^2 + eBx^3 + fBx^4 + gBx^5 + hBx^6 + 8cc. \\ + 2aCx + 2bCx^2 + 2cCx^3 + 2eCx^4 + 2fCx^5 + 2gCx^6 + 8cc. \\ + 3aDx^2 + 3bDx^3 + 3cDx^4 + 3eDx^5 + 3fDx^6 + 8cc. \\ + 4aEx^3 + 4bEx^4 + 4cEx^5 + 4eEx^6 + 8cc. \\ + 4aFx^4 + 5bFx^5 + 5cFx^6 + 8cc. \\ + 6aGx^5 + 6bGx^6 + 8cc. \\ + 7aHx^6 + 8cc. \end{aligned}$$

La ley de los términos así orizontales como verticales de ambos miembros de esta equacion es tan patente que solo con echarles una mirada se percibe.

521 Si comparamos los términos homólogos, forma-

Fig. maremos tantas ecuaciones quantas son las indeterminadas B, C &c. de las quales inferiremos los valores de B, C, D &c. pues el de A ya le sacamos antes. Hallaremos siguiendo este camino

$$A = a^m.$$

$$B = \frac{mbA}{a}$$

$$C = \frac{(m-1)bB + 2mcA}{2a}$$

$$D = \frac{(m-2)bC + (2m-1)cB + 3mcA}{3a}$$

$$E = \frac{(m-3)bD + (2m-2)cC + (3m-1)eB + 4mfA}{4a}$$

$$F = \frac{(m-4)bE + (2m-3)cD + (3m-2)eC + (4m-1)fB + 5mgA}{5a}$$

$$G = \frac{(m-5)bF + (2m-4)cE + (3m-3)eD + (4m-2)fC + (5m-1)gB + 6mhA}{6a}$$

&c.

§ 2 2 Bien se echa de ver que la misma fórmula puede servir igualmente para elevar á la potencia m un finitomio qualquiera, ó un polynomio compuesto de un número limitado de términos. Porque bastará suponer iguales á cero los coeficientes de los términos que no llevare el binomio propuesto, en cuyo caso si fuese m un número entero, la serie rematará, y la potencia ó fórmula se compondrá de un número limitado de términos.

§ 2 3 Todavía podemos darla otra espresion á la fórmula que representa la potencia m de la serie $a + bx + cx^2 + ex^3 + fx^4 + \&c.$ Porque una vez que $A = a^m$, y $B = \frac{mbA}{a}$, será $B = mba^{m-1}$, $C = \frac{mcA}{a} + \frac{(m-1)}{2a} \cdot bB = mca^{m-1} + \frac{m-1}{2} \times mbba^{m-2}$, con substituir en lugar de A y B sus valores hallados.

$$D = \frac{meA}{a} + \frac{(2m-1)cB}{3a} + \frac{(m-2)bC}{3a} = me a^{m-1} + \frac{2m-1}{3} \times \text{Fig.}$$

$$mcb a^{m-2} + \frac{(m-2)}{3} b \times (mca^{m-2} + \frac{m-1}{2} \cdot mbba^{m-3}) =$$

$$me a^{m-1} + \left(\frac{2m-1}{3} + \frac{m-2}{3} \right) mbca^{m-2} + m \cdot \frac{(m-1)}{2} \cdot \frac{(m-2)}{3}$$

$$b^2 a^{m-3} = me a^{m-1} + m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot 2bca^{m-2} + m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot$$

$$\frac{m-2}{3} b^2 a^{m-3}.$$

Seguendo este camino hallaremos para expresar la potencia m del infinitesimo propuesto la siguiente fórmula general $(a + bx + cx^2 + ex^3 + fx^4 + \&c.)^m$

$$= a^m + mba^{m-1}x + m \cdot \frac{m-1}{2} a^{m-2}bb \left\{ \begin{array}{l} + ma^{m-1}c \end{array} \right\} x^2$$

$$+ m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-2}{3} a^{m-3}b^3 \left\{ \begin{array}{l} + m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot 2a^{m-2}bc \\ + ma^{m-1}e \end{array} \right\} x^3$$

$$+ m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-2}{3} \cdot \frac{m-3}{4} a^{m-4}b^4 \left\{ \begin{array}{l} + m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-2}{3} \cdot 3a^{m-3}bbc \\ + m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot a^{m-2} \times \left\{ \begin{array}{l} 2be \\ + cc \end{array} \right\} \\ + ma^{m-1}f \end{array} \right\} x^4$$

$$+ m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-2}{3} \cdot \frac{m-3}{4} \cdot \frac{m-4}{5} a^{m-5}b^5 \left\{ \begin{array}{l} + m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-2}{3} \cdot \frac{m-3}{4} \cdot 4a^{m-4}b^3c \\ + m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-2}{3} \cdot 3a^{m-3} \left\{ \begin{array}{l} bcc \\ + bbz \end{array} \right\} \\ + m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot 2a^{m-2} \left\{ \begin{array}{l} ce \\ bf \end{array} \right\} \\ + ma^{m-1}g \end{array} \right\} x^5$$

524 Apliquemos esta fórmula á algunos egemplos.

I. Si hubiéramos de elevar á la quarta potencia la serie $1 + x + x^2 + x^3 + \&c$; sería $a = 1, b = 1, c = 1, d = 1, \&c. m = 4$, y egecutando las substituciones correspondientes en la fórmula general, sacaremos que $1 +$

Fig. $4x + 10x^2 + 20x^3 + 35x^4 \&c.$ es la quarta potencia de la serie propuesta.

525 II. Para quadrar $\frac{1}{x} + \frac{1}{xx} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4} \&c.$ consideraremos que la propuesta es $\frac{1}{x} \times (1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3})$, y por consiguiente quadraremos el factor multinomio, y multiplicando despues su quadrado por $\frac{1}{x^2}$, estará formada la segunda potencia que buscamos.

Para quadrar, pues, $1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \&c.$ reparo que $x = \frac{1}{x}$, $a = 1$, $b = 1$, $c = 1$, $e = 1$, $\&c.$, $m = 2$; y egecutando en la fórmula general las substituciones correspondientes hallaremos que $(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \&c.)^2 = 1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^3} + \frac{5}{x^4} \&c.$ Cuya cantidad multiplicada por $\frac{1}{x^2}$ dará el producto $\frac{1}{xx} + \frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^4} + \frac{4}{x^5} + \frac{5}{x^6} \&c.$ que es el quadrado de la serie propuesta.

526 Si la serie cuyo quadrado se ha de sacar tuviese esta forma $y - y^3 + y^5 - y^7 \&c.$ que es lo propio que $(1 - y^2 + y^4 - y^6 \&c.) \times y$, buscaríamos primero el quadrado del factor multinomio para multiplicarle despues por yy ; sería, pues, $a = 1$, $b = 0$, $c = -1$, $e = 0$, $f = 1$, $g = 0$, $h = -1$, y $m = 2$; y haciendo las substituciones correspondientes en la fórmula, sacaríamos que $(1 - y^2 + y^4 - y^6 \&c.)^2 = 1 - 2y^2 + 3y^4 - 4y^6 \&c.$ y multiplicando por yy será finalmente $(y - y^3 + y^5 - y^7 \&c.)^2 = y^2 - 2y^4 + 3y^6 - 4y^8 \&c.$

527 Si se me preguntára qual es la raiz quadrada de $rr - zz + \frac{r^4}{3r^2} - \frac{2r^6}{45r^4} + \frac{r^8}{315r^6} \&c.$ consideraria que

$x = zz$, $a = rr$, $b = -1$, $c = \frac{1}{3r^2}$, $e = \frac{-2}{45r^4}$, $f = \frac{1}{315r^6}$ &c. y $m = \frac{1}{2}$, $\frac{m-1}{2} = -\frac{1}{4}$, $\frac{m-2}{3} = -\frac{1}{2}$, $\frac{m-3}{4} = -\frac{5}{8}$; luego $V(rr - zz + \frac{z^4}{3rr} \&c.) = r + \frac{1}{2} \times \frac{-1}{r} x - \frac{1}{8r^3} x^2 + \frac{1}{6r^3} x^2 \&c. = r - \frac{1}{2r} + \frac{1}{24r^3} \&c.$

528 Finalmente, si hubiéramos de sacar la raíz qua-

drada de $\frac{1}{rr - \frac{1}{2} + \frac{1^4}{4rr} - \frac{1^6}{6r^4} + \frac{1^8}{8r^6} \&c.}$ consideraría-
mos que la propuesta es lo mismo que

$\frac{1}{rr} \times \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2r} + \frac{1^4}{4r^4} - \frac{1^6}{6r^6} \&c.} \right)$, en cuyo supues-
to sacaríamos primero la raíz quadrada del factor que in-
cluye el paréntesis, y le multiplicaríamos despues por la
raíz quadrada del factor $\frac{1}{rr}$ ó por $\frac{1}{r}$. Pero para sacar la
raíz quadrada del factor que el paréntesis encierra, hemos
de suponer $x = zz$, $a = 1$, $b = -\frac{1}{2rr}$, $c = \frac{1}{4r^4}$, $e = \frac{-1}{6r^6}$ &c. y $m = -\frac{1}{2}$, $\frac{m-1}{2} = -\frac{3}{4}$, $\frac{m-2}{3} = -\frac{5}{6}$,
 $\frac{m-3}{4} = -\frac{7}{8}$ &c. Egecutando las substituciones corres-
pondientes, sacaríamos que la raíz quadrada de la canti-
dad propuesta es

$$\left. \begin{aligned} 1 + \frac{x}{4rr} + \frac{3x^2}{32r^4} + \frac{5x^4}{128r^6} \&c. \\ - \frac{1}{8r^4} - \frac{3}{32r^6} \\ + \frac{1}{12r^6} \end{aligned} \right\} \times \frac{1}{r}$$

$$= \frac{1}{r} + \frac{x}{4r^4} - \frac{x^2}{32r^5} + \frac{11x^3}{384r^7} - \&c.$$

529 La fórmula general (523) sirve tambien
para hallar el radical que representa una serie dada. Quando
se aplica á esta investigacion 1.º se han de dividir primero
todos los términos de la serie propuesta por el primer térmi-

Fig. no, y será en virtud de esta division su primer término $= 1$. 2.º se compararán los tres primeros términos de la serie dada con los tres primeros de la fórmula, cada uno con el suyo, suponiendo $a = 1$, y $c, e \&c. = 0$. 3.º De la comparacion de los dos segundos, y de los dos terceros resultarán dos equaciones, que darán el valor del esponente, y el segundo término del radical que se busca. Si de esta operacion no se sacare nada, se compararán quatro términos de la serie con quatro de la fórmula, para hallar el radical trinomio; ó cinco términos de la serie con cinco de la fórmula, para hallar un radical quadrinomio. Suponiendo $e = 0$, ó $f = 0$.

530 Si la serie propuesta fuese $1 - \frac{y}{a} + \frac{yy}{aa} - \frac{y^3}{a^3} + \frac{y^4}{a^4} \&c.$ suponiendo $a = 1$, y $c = 0$, los tres primeros términos de la fórmula serian $1 + mbx + m \cdot \frac{m-1}{2} b b x x$; comparando respectivamente con los tres primeros de la serie dada, sacaremos $mbx = -\frac{y}{a}$, y $m \cdot \frac{m-1}{2} b b x x = \frac{yy}{aa}$; dividiendo la última de estas dos equaciones por la primera sale $\frac{m-1}{2} bx = -\frac{y}{a}$, y como $-\frac{y}{a} = mbx$, será tambien $\frac{m-1}{2} bx = mbx$, luego $m - 1 = 2m$, y $m = -1$. Por consiguiente $mbx = -bx = -\frac{y}{a}$, ó $bx = \frac{y}{a}$. De donde resulta que el esponente del radical es -1 , y que su segundo término es $\frac{y}{a}$. Será, pues, el radical cifrado en la serie $= (1 + \frac{y}{a})^{-1}$ ó $\frac{1}{1 + \frac{y}{a}}$, ó $\frac{a}{a+y}$ la cantidad que la serie representa.

531 Si la serie dada fuese $a + \frac{xx}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} \&c.$ des-

despues de divididos todos sus términos por a , sería $1 +$ Fig.

$\frac{xx}{2aa} - \frac{xx^2}{8a^3} \&c.$ Los tres primeros términos de la fórmula (523) en el supuesto de $a = 1$, y $c = 0$ serian $1 + mbx + m \cdot \frac{m-1}{2} bbxx$. Sacaremos, pues, las dos ecuaciones siguientes $mbx = \frac{xx}{2aa}$, $m \cdot \frac{m-1}{2} bbxx = -\frac{xx^2}{8a^3}$; dividiendo la segunda por la primera, sale $\frac{m-1}{2} bx = -\frac{xx}{4aa}$; luego $xx = mbx \times 2aa = -4aa \times \frac{m-1}{2} bx$; de donde sale $-m = m - 1$, y $2m = 1$, ó $m = \frac{1}{2}$, que será el esponente del radical. Será por consiguiente $mbx = \frac{1}{2} bx = \frac{xx}{2aa}$ ó $bx = \frac{xx}{aa}$ el segundo término del radical. Luego el radical será $a \times \left(1 + \frac{xx}{aa}\right)^{\frac{1}{2}} = (aa + xx)^{\frac{1}{2}}$.

532 Finalmente, supongamos que se me ofrezca averiguar de qué espresion radical proviene la serie $x\sqrt[4]{8} - \frac{5aa}{8x}\sqrt[4]{8} - \frac{5aa}{8x}\sqrt[4]{8} - \frac{75a^4}{512x^3}\sqrt[4]{8} - \&c.$ que es lo mismo que $x\sqrt[4]{8}\left(1 - \frac{5aa}{8xx} - \frac{75a^4}{512x^4} \&c.\right)$. Si en la fórmula suponemos $bx = y$, y sus tres primeros términos $1 + my + m \cdot \frac{m-1}{2} yy$; en este supuesto será $my = -\frac{5aa}{8xx}$, $m \cdot \frac{m-1}{2} yy = -\frac{75a^4}{512x^4}$; egecutando la division sacaremos $\frac{m-1}{2} y = \frac{15aa}{64xx}$, luego $y = -\frac{5aa}{8xxm} = \frac{15aa}{32xx(m-1)}$, y $-\frac{1}{m} = \frac{3}{4(m-1)}$, ó $-4m + 4 = 3m$, y $7m = 4$; luego $m = \frac{4}{7}$; este será el esponente del radical. De $y = -\frac{5aa}{8mxx}$ sacaremos $-\frac{5aa}{7xx} = -\frac{35aa}{32xx}$, que será el segundo término del radical. Luego el radical cifrado en la serie será $x\sqrt[4]{8}\left(1 - \frac{35aa}{32xx}\right)^{\frac{4}{7}}$.

533 Para aplicar las series á la integracion de una

Fig. diferencial, se transforma la diferencial propuesta en una serie cuyos términos se integran todos separadamente. Supongamos que hayamos de integrar la diferencial $\frac{a^3 dx}{a^3 - x^3}$, que no admite una integracion cabal. Reduciremos la fraccion á serie infinita, por manera que tengamos $\frac{a^3}{a^3 - x^3} = 1 + \frac{x^3}{a^3} + \frac{x^6}{a^6} + \frac{x^9}{a^9} \&c.$ Luego $\frac{a^3 dx}{a^3 - x^3} = dx + \frac{x^3 dx}{a^3} + \frac{x^6 dx}{a^6} + \frac{x^9 dx}{a^9} \&c.$ y por consiguiente $\int \frac{a^3 dx}{a^3 - x^3} = x + \frac{x^4}{4a^3} + \frac{x^7}{7a^6} + \frac{x^{10}}{10a^9} \&c.$ Si a fuere mayor que x será convergente esta serie; y será divergente si fuere x mayor que a . En este último caso convendrá darla á la diferencial esta forma $\frac{-a^3 dx}{x^3 - a^3}$, y transformar en serie la fraccion $\frac{a^3}{x^3 - a^3}$, de cuya operacion sacaremos $\frac{a^3}{x^3 - a^3} = \frac{a^3}{x^3} + \frac{a^6}{x^6} + \frac{a^9}{x^9} + \frac{a^{12}}{x^{12}} + \&c.$ y multiplicando ambos miembros por $-dx$, será $\frac{-a^3 dx}{x^3 - a^3} = \frac{-a^3 dx}{x^3} - \frac{a^6 dx}{x^6} - \frac{a^9 dx}{x^9} - \frac{a^{12} dx}{x^{12}} \&c.$ y $\int \frac{-a^3 dx}{x^3 - a^3} = \frac{a^3}{2x^2} + \frac{a^6}{5x^5} + \frac{a^{12}}{11x^{11}} \&c.$ que es convergente, y convergerá tanto mas quanto mayor fuere x respecto de a .

534 Supongamos que convenga integrar la diferencial $x dx (a + x)^m$, que por lo dicho (510) es integrable. Sea m el número que se quisiere, positivo ó negativo, entero ó quebrado, con tal que no sea $m = -1$. Reduciremos á serie la potencia m del binomio $a + x$, y supondremos que a es mayor que x . Tendremos, pues, $(a + x)^m = a^m + ma^{m-1}x + \frac{m.m-1}{2} a^{m-2}x^2 + \frac{m.m-1.m-2}{2.3} a^{m-3}x^3 + \&c.$ Multiplicando ambos miembros por $x dx$, sacaremos $x dx (a+x)^m = a^m x dx + ma^{m-1} x^2 dx + \frac{m.m-1}{2} \times a^{m-2} x^3 dx + \frac{m.m-1.m-2}{2.3} a^{m-3} x^4 dx + \&c.$ Luego

S.

$$\begin{aligned}
 \int x dx (a+x)^m &= \frac{a^m x^2}{2} + \frac{m a^{m-1} x^3}{3} + \frac{m(m-1) a^{m-2} x^4}{2 \cdot 4} \\
 &+ \frac{m(m-1)(m-2) a^{m-3} x^5}{2 \cdot 3 \cdot 5} \&c.
 \end{aligned}
 \quad \text{Fig.}$$

Es tal esta integral que se desvanecerá si x fuese $= 0$. Si fuese m un número entero, y positivo, la serie rematará, y se compondrá de un número limitado de términos; porque como en los términos se halla sucesivamente $m-2$, $m-3$, $m-4$ &c. llegará el caso de ser 0 alguna de las cantidades que llevan los coeficientes respectivos de los términos de la serie; en el caso de ser por ejemplo $m=3$, será $m-3=0$, y serán cero todos los términos que $m-3$ multiplicare. Pero quando m fuese un número quebrado, ó negativo, la serie no rematará, y será infinita. Esto manifiesta que no se puede decidir que dexa de ser integrable algebraicamente una diferencial, porque sea su expresion una serie infinita, pues hay series diferenciales, qual es la propuesta quando $m=3$, por exemplo, cuya integral se puede sacar cabal. Conviene, pues, irse á la mano en formar juicio de la *integrabilidad* de los diferenciales por medio de las series. Porque si la serie rematare, la diferencial de donde proviniera será integrable algebraicamente; podrá serlo tambien, aunque no remate la serie, con tal que se pueda sumar, ó en general, ó continuada al infinito.

535 Aplicarémos el método de integrar por apro-

Fig. 343. Estimacion buscando por medio del cálculo infinitesimal los logaritmos hiperbólicos. Supondrémos que el número cuyo logaritmo hemos de sacar, se compone de dos partes a y x , de manera que sea $a + x$, siendo a la parte mayor. De lo dicho (343) inferirémos $d \log(a + x) = \frac{dx}{a+x}$, cuya diferencial no admite una integracion algebráica. La hemos, pues, de reducir á serie, dándola primero esta forma $dx(a+x)^{-1}$. Pero hemos visto (II. 101) que $(a+x)^{-1} = a^{-1} \left(1 - \frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^3}{a^3} \&c. \right) = \frac{1}{a} - \frac{x}{a^2} + \frac{x^2}{a^3} - \frac{x^3}{a^4} \&c.$ Luego $d \log(a+x) = dx(a+x)^{-1} = \left(\frac{dx}{a} - \frac{x dx}{a^2} + \frac{x^2 dx}{a^3} - \frac{x^3 dx}{a^4} \&c. \right)$; luego integrando $L(a+x) = \left(\frac{x}{a} - \frac{x^2}{2a^2} + \frac{x^3}{3a^3} - \frac{x^4}{4a^4} \&c. \right) + C$. Para determinar la constante C , repararémos que la equation que acabamos de sacar, siempre se ha de verificar, sea x la que fuere; luego tambien se verificará quando $x = 0$, pero como en este último supuesto queda reducida á $La = C$, se infiere que $C = La$; luego $L(a+x) = La + \left(\frac{x}{a} - \frac{x^2}{2a^2} + \frac{x^3}{3a^3} - \frac{x^4}{4a^4} \&c. \right)$. Servirá esta serie para calcular el logaritmo de un número qualquiera, con tal que se conozca el de otro número. Si suponemos, por egemplo, $a = 10$, y $a+x = 11$, será $x = 1$. y por lo mismo $\frac{x}{a} = \frac{1}{10}$; de donde resulta que $L11 = L10 + \left(0,1 - \frac{(0,1)^2}{2} + \frac{(0,1)^3}{3} \&c. \right)$ que manifiesta lo que se le ha de añadir al logaritmo de 10 para sacar el de 11.

536 Como la serie general que acabamos de sacar no converge bastante en algunas ocasiones, buscarémos por otro camino una serie que no tenga este incon-

ve-

veniente. Nos propondremos buscar el logaritmo de una fracción cuyo numerador sea mayor que el denominador; dentro de poco manifestaremos cómo se puede reducir á esto la investigacion de todo logaritmo.

Sea a la suma, y x la diferencia del numerador y del denominador de la fracción propuesta; será (I. 673), pues, $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}x$ el numerador, y $\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}x$ el denomina-

dor, y por consiguiente la fracción propuesta será $\frac{\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}x}{\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}x}$

$= \frac{a+x}{a-x}$ con suprimir el factor comun $\frac{1}{2}$, de cuya fracción representaremos el logaritmo por $L\left(\frac{a+x}{a-x}\right) = L(a+x) -$

$L(a-x)$. Si diferenciamos considerando a como constante,

y x sola como variable *, sacaremos (343) $\frac{dx}{a+x} + \frac{dx}{a-x}$

que se reduce á $\frac{2adx}{aa-xx}$ ó $2adx(aa-xx)^{-1}$; reduciendo $(aa-xx)^{-1}$ á serie, hallaremos (II. 101) $(aa-xx)^{-1} = a^{-2}$

$\left(1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^4}{a^4} + \frac{x^6}{a^6} + \frac{x^8}{a^8} + \&c.\right)$; luego $2adx(aa-xx)^{-1}$

$= 2a^{-1}dx \left(1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^4}{a^4} + \frac{x^6}{a^6} + \frac{x^8}{a^8} + \&c.\right) = 2\left(\frac{dx}{a} +$

Tom. III.

Bb 3

x

* Aunque esta fracción ha de representar toda fracción propuesta, esto no impide que podamos considerar como constante la suma a del numerador y del denominador; porque no hay fracción alguna que no podamos preparar de modo que la suma del numerador y del denominador llegue á ser igual á qualquiera número, el que quisiésemos. Si quisiéramos reducir, por egemplo, la fracción $\frac{3}{5}$ á que fuese 12 la suma del numerador y del denominador, bastaria suponer, despues de multiplicados ambos términos por un mismo número n , de donde resultaría $\frac{3n}{5n}$, bastaría, digo, suponer $3n + 5n$ ó $8n = 12$; de donde sacaríamos $n = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$; luego $\frac{3}{5} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}}$, de cuyo numerador y denominador la suma es con efecto 12.

$\frac{x^2 dx}{a^3} + \frac{x^4 dx}{a^5} + \frac{x^6 dx}{a^7} + \frac{x^8 dx}{a^9} + \&c.$). Luego $S. \frac{2adx}{aa-xx}$ ó $L\left(\frac{a+x}{a-x}\right) = 2\left(\frac{x}{a} + \frac{x^3}{3a^3} + \frac{x^5}{5a^5} + \frac{x^7}{7a^7} + \frac{x^9}{9a^9} + \&c.\right)$, $+ C$. Por lo que mira á la constante C , determinaremos su valor como antes, considerando que quando $x = 0$, la equacion para en $L\frac{a}{a} = C$; luego $C = L\frac{a}{a} = L1 = 0$; por consiguiente $L\left(\frac{a+x}{a-x}\right)$ es $2\left(\frac{x}{a} + \frac{x^3}{3a^3} + \frac{x^5}{5a^5} + \frac{x^7}{7a^7} + \&c.\right)$, en cuya serie cada término es el antecedente multiplicado por el quadrado de $\frac{x}{a}$ ó del primer término; y se toma despues el primero, el tercio del segundo, el quinto del tercero &c. y el duplo de la suma.

Busquemos por este camino el logaritmo de $2 = \frac{2}{1}$; será, pues, $a = 3$, $x = 1$; luego $\frac{x}{a} = \frac{1}{3}$, y $\frac{x^2}{a^2} = \frac{1}{9}$. Será por consiguiente facil hallar cada término, pues bastará para lograrlo tomar la $\frac{1}{9}$ parte del término antecedente, y sacaremos la serie $\frac{x}{a}, \frac{x^3}{a^3}, \frac{x^5}{a^5} \&c.$ y será

$\frac{x}{a} = 0,333333333$	luego $\frac{x}{a} = 0,333333333$
$\frac{x^3}{a^3} = 0,037037037$	$\frac{x^3}{3a^3} = 0,012345679$
$\frac{x^5}{a^5} = 0,004115226$	$\frac{x^5}{5a^5} = 0,000823045$
$\frac{x^7}{a^7} = 0,000457247$	$\frac{x^7}{7a^7} = 0,000065321$
$\frac{x^9}{a^9} = 0,000050805$	$\frac{x^9}{9a^9} = 0,000005645$
$\frac{x^{11}}{a^{11}} = 0,000005645$	$\frac{x^{11}}{11a^{11}} = 0,000000513$
$\frac{x^{13}}{a^{13}} = 0,000000627$	$\frac{x^{13}}{13a^{13}} = 0,000000048$
$\frac{x^{15}}{a^{15}} = 0,000000069$	$\frac{x^{15}}{15a^{15}} = 0,000000004$

Luego la suma es 0,346573588
y el duplo que ha de ser el log. de 2 es 0,693147176
que ciñéndonos á ocho decimales es 0,69314718.

Por ser 4 el quadrado de 2, y 8 su cubo, el duplo

plo del logaritmo que hemos sacado será el logaritmo de 4 ; y su triplo será el logaritmo de 8.

El logaritmo de 3 le sacaremos calculando el de $\frac{4}{3}$, y restándole del logaritmo de 4 , la resta será el logaritmo de 3 , por ser 3 lo mismo que 4 dividido por $\frac{4}{3}$; luego $L3 = L4 - \frac{L4}{3}$. Pero le hallaremos mas facilmente calculando el logaritmo de la fraccion $\frac{8}{9}$, y restándole del logaritmo de 8 que ya conocemos ; la diferencia será el logaritmo de 9 , cuya mitad será el logaritmo de 3 . La suma del log. de 3 , y del log. de 2 será el log. de 6 ; para hallar el de 5 calcularemos primero el de 10 , calculando el de $\frac{10}{8}$; y añadiéndole al logaritmo de 8 , la suma será el log. de 10 . Y restando de este el log. de 2 , la resta será el log. de 5 .

537 Al paso que es mayor el número , cuyo logaritmo se busca , es mas breve el cálculo ; por manera que una vez sacados los logaritmos no mas que hasta el del número 10 , bastan para calcular los demas los tres primeros términos de la serie , quando no se piden mas que ocho decimales ; y para sacar los logaritmos de los números que están entre 100 y 1000 bastan los dos primeros términos de la serie , y despues de 1000 basta con el primero.

En quanto al modo de reducir estos logaritmos hyperbólicos á los tabulares , ya lo hemos declarado (II. 354).

Algunos usos del método de integrar por aproximacion.

538 La integral de muchas diferenciales que se in-

Fig. tegran por aproximacion se puede sacar sin reducirlas primero á serie, y en esta clase están comprehendidas todas las diferenciales que pueden reducirse al círculo ó á los logaritmos. Porque como en las tablas de los logaritmos, senos, tangentes &c. se hallan los valores de los logaritmos, y de las diferentes partes del círculo, son de muchísimo socorro para concluir con mas brevedad la integracion de las espresadas diferenciales. Es, pues, muy importante dar señas seguras para conocerlas, aquellas por lo menos que ocurren con mas frecuencia.

212. 539 Si llamamos a el diámetro del círculo cuyo arco es AM ; AP, x ; PM, y ; y si despues de tiradas la pm infinitamente próxima á PM , y la Mr paralela á AC , llamamos el arco AM, u ; será $Pp = Mr = dx$, $Mm = du$, y los triángulos semejantes CPM , Mrm darán $PM : CM :: Mr :$

Mm , esto es $ax - xx : \frac{1}{2}a :: dx : du = \frac{\frac{1}{2}adx}{\sqrt{(ax-xx)}}$. Será,

pues, $S. \frac{\frac{1}{2}adx}{\sqrt{(ax-xx)}}$ el valor del arco AM . Por consiguiente, si se nos pidiera qual es el valor de esta integral, quando x tiene un valor determinado, restaríamos de CA ó $\frac{1}{2}a$ el valor conocido de x ó AP , y resultaría CP . Luego en el triángulo rectángulo CPM conoceríamos el ángulo recto, la hypotenusa $CM = \frac{1}{2}a$, y el lado CP ; luego podríamos valuar el ángulo ACM . Y como dado el radio CM , y el ángulo ACM , ó sabiendo quantos grados coge el arco AM , es facil hallar (I. 5 o 5) su valor, ó

quan-

quanto coge de largo , sacariámos facilmente la integral de Fig. la diferencial propuesta.

540 Si en el supuesto de ser b, g, p y k cantidades conocidas , hubiéramos de integrar la diferencial $\frac{h dx}{\sqrt{(gkx - pxx)}}$, la reduciríamos á la antecedente , dividiendo primero el numerador y el denominador por $\sqrt{p}$, y resultaría

$$\frac{\frac{h}{\sqrt{p}} dx}{\sqrt{\left(\frac{gk}{p}x - xx\right)}}, \text{ ó } \frac{h}{\sqrt{p}} \times \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{gk}{p}x - xx\right)}}; \text{ y si } dx \text{ estuviese mul-}$$

tiplicada por la mitad de $\frac{gk}{p}$ que multiplica x en el radical, se parecería esta diferencial á la de antes (539). Hagamos, pues , que concurra en ella esta circunstancia , multiplicando y dividiendo á un tiempo por $\frac{1}{2} \frac{gk}{p}$ ó $\frac{gk}{2p}$, de cuya

operacion sacaremos $\frac{\frac{h}{\sqrt{p}}}{\frac{gk}{2p}} \times \frac{\frac{gk}{2p} dx}{\sqrt{\left(\frac{gk}{p}x - xx\right)}} \text{ ó } \frac{2pb}{gk\sqrt{p}} \times$

$$\frac{\frac{gk}{2p} dx}{\sqrt{\left(\frac{gk}{p}x - xx\right)}}.$$

Puesta la diferencial en esta forma , se echa

de ver que su integral es un arco de círculo cuyo diámetro $= \frac{gk}{p}$, y la abscisa $= x$, multiplicado por $\frac{2ph}{gk\sqrt{p}}$; será, pues , facil determinarla por lo dicho poco há.

541 Si en vez de contar las abscisas desde el punto A , las hubiéramos contado desde el centro C , llamando b el radio CA , y x la abscisa CP , hubiera sido $\frac{h dx}{\sqrt{(bb - xx)}}$ el elemento del arco AM . Esto lo sacariámos comparando los triángulos semejantes CPM, Mrm , teniendo presente que $PM = \sqrt{(bb - xx)}$, y que pues AM mengua al paso

que

Fig. que $CP = x$ crece, su diferencial ha de ser negativa. Por consiguiente quando ocurriese integrar una diferencial como $\frac{kdx}{\sqrt{(gh-pxx)}}$, se deberá transformar como antes en $\frac{k}{\sqrt{p}} \times \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{gh}{p} - xx\right)}}$, y como $\frac{gh}{p}$ representa en este caso bb , la cantidad $-b$, que ha de llevar el numerador, es $-\sqrt{\frac{gh}{p}}$; multiplicaremos, pues, y dividiremos á un tiempo por $-\sqrt{\frac{gh}{p}}$, y saldrá $\frac{\frac{k}{\sqrt{p}}}{-\sqrt{\frac{gh}{p}}} \times \frac{-\sqrt{\frac{gh}{p}} dx}{\sqrt{\left(\frac{gh}{p} - xx\right)}}$. Luego con suponer $CA = \sqrt{\frac{gh}{p}}$, y $CP = x$, resultará la integral $\frac{\frac{k}{\sqrt{p}}}{-\sqrt{\frac{gh}{p}}} \times AM$, ó mas generalmente $\frac{\frac{k}{\sqrt{p}}}{-\sqrt{\frac{gh}{p}}} \times AM + C$, ó $\frac{-k}{\sqrt{gh}} \times AM + C$.

Por lo que mira á la constante C , se determinará por las circunstancias de la cuestion de que proviniere la diferencial propuesta, y el arco AM se determinará conforme hemos dicho (540); quiero decir, calculando el triángulo CPM .

542 De lo probado (356) consta que $\frac{adx}{a\sqrt{a-t-xx}}$ representa un arco de círculo cuyo radio $= a$, y la tangente $= x$; cuyo arco se valuará facilmente quando tuviere x un valor determinado, calculando el ángulo ACN , 212. y el arco M' por medio de los grados que cogiere el ángulo ACN , y del radio a (1505).

Luego si la diferencial propuesta fuese $\frac{kdx}{gb^2+hx}$, dividiríamos el numerador y el denominador por b ; y resul-

ta-

Fig.

taria $\frac{k}{h} \times \frac{dx}{\frac{gb^2}{h} + xx}$, multiplicando despues ambos térmi-

nos por $\frac{gb^2}{h}$, sacaríamos $\frac{\frac{k}{h}}{\frac{gb^2}{h}} \times \frac{\frac{gb^2}{h} dx}{\frac{gb^2}{h} + xx}$ ó $\frac{k}{gb^2} \times$

$\frac{\frac{gb^2}{h} dx}{\frac{gb^2}{h} + xx}$; por consiguiente la integral sería el producto

del arco cuya tangente fuese $= x$, y el radio $= \sqrt{\frac{gb^2}{h}}$, multiplicado por $\frac{k}{gb^2}$.

543 Las cantidades que se refieren inmediatamente á los logaritmos son todas aquellas, en las cuales la diferencial propuesta es ó puede ser una fraccion cuyo numerador sea la diferencial del denominador, ó esta diferencial multiplicada ó dividida por un número constante.

Quando el numerador es la diferencial cabal del denominador, la integral es el logaritmo del denominador; por egeemplo, $S. \frac{dx}{x} = Lx + C$; $S. \frac{dx}{a+x} = L(a+x) + C$; $S. \frac{2x dx}{aa+xx} = L(aa+xx) + C$.

Pero quando el numerador es la diferencial cabal del denominador multiplicada ó dividida por un número constante, es preciso resolver la diferencial propuesta en dos factores, tales que el uno sea una fraccion cuyo numerador sea la diferencial cabal del denominador, y el otro factor sea un número constante. La integral será el logaritmo del numerador variable, multiplicado por el factor constante. Así para integrar $\frac{ax^2 dx}{a^3+xx^3}$ reparo que la diferencial de a^3+xx^3 es $3x^2 dx$, y que por lo mismo he de pre-

Fig. preparar la diferencial de modo que $3x^2dx$ esté en el numerador ; con esta mira la doy esta forma $\frac{a}{3} \times \frac{3x^2dx}{a^3+x^3}$, cuya integral es $\frac{a}{3} L(a^3+x^3) + C$.

$$\begin{aligned} \text{Por lo mismo } S. \frac{dx}{a-x} &= S. \frac{1}{a-x} \times \frac{-1dx}{a-x} = -L(a-x) \\ + C &= 0 - L(a-x) + C = L1 - L(a-x) + C \\ &= L\left(\frac{1}{a-x}\right) + C. \end{aligned}$$

$$S. \frac{xdx}{aa+xx} = \frac{1}{2} \times \frac{2xdx}{aa+xx} = \frac{1}{2} L(aa+xx) + C = L[\sqrt{(aa+xx)}] + C.$$

$$\begin{aligned} S. \frac{ax^{n-1}dx}{k+bx^n} &= S. \frac{a}{\frac{b}{n}} \times \frac{nbx^{n-1}dx}{k+bx^n} = \frac{a}{\frac{b}{n}} \times L(k+bx^n) \\ + C &= L(k+bx^n)^{\frac{a}{b}} + C. \end{aligned}$$

544 Hay muchas diferenciales que tambien se integran directamente por logaritmos, aunque no se las pueda preparar como las antecedentes ; tal es la diferencial $\frac{dx}{\sqrt{(xx-1)}}$. A las de esta clase se consigue muchas veces darlas la forma diferencial logarítmica multiplicándolas por una funcion de x , tal que el producto sea la diferencial de dicha funcion, ó la misma diferencial multiplicada ó dividida por un número constante. Si despues de esto se divide el resultado por la misma funcion, la diferencial será patentemente una diferencial logarítmica. Para aplicar esto á $\frac{dx}{\sqrt{(xx-1)}}$ la multiplicaremos por $x + \sqrt{(xx-1)}$, y sacaremos $\frac{xdx}{\sqrt{(xx-1)}} + dx$, que es con efecto la diferencial de $x + \sqrt{(xx-1)}$, por manera que $S. \frac{dx}{\sqrt{(xx-1)}} = S. \frac{dx + \frac{xdx}{\sqrt{(xx-1)}}}{x + \sqrt{(xx-1)}} = L[x + \sqrt{(xx-1)}] + C$.

Tambien sacaremos la integral de $\frac{dx}{\sqrt{1-xx}}$ multipli- Fig.
candó ambos términos por $\sqrt{1-xx}$, de donde resultará
 $\frac{dx\sqrt{1-xx}}{\sqrt{(xx-1)}}$, cuya integral, segun acabamos de manifestar, es
 $\sqrt{1-xx} \times L(x + \sqrt{xx-1}) + C$.

545 De todo esto resulta 1.º que la integral de
 $\frac{dx}{\sqrt{(x^2 \pm a^2)}} = L[x + \sqrt{(x^2 \pm a^2)}]$. Porque si diferenciamos
 $x + \sqrt{(x^2 \pm a^2)}$ sacaremos $dx + \frac{xdx}{\sqrt{(x^2 \pm a^2)}} = \dots$
 $\frac{dx\sqrt{(x^2 \pm a^2)} + xdx}{\sqrt{(x^2 \pm a^2)}} = \frac{dx}{\sqrt{(x^2 \pm a^2)}} \times (\sqrt{(x^2 \pm a^2)} + x)$, di-
vidiendo esta cantidad por $x + \sqrt{(x^2 \pm a^2)}$, resultará
 $\frac{dx}{\sqrt{(x^2 \pm a^2)}}$, que es la misma diferencial propuesta.

2.º Que la integral de $\frac{dx}{\sqrt{(2ax+xx)}} = L[a+x+\sqrt{(2ax+xx)}]$. Porque la diferencial de $a+x+\sqrt{(2ax+xx)}$
 $+ a+x$ es $dx + \frac{adx+xdx}{\sqrt{(2ax+xx)}} = \frac{dx}{\sqrt{(2ax+xx)}} \times [\sqrt{(2ax+xx)} + a+x]$, cuya diferencial dividida por el número dá
 $\frac{dx}{\sqrt{(2ax+xx)}}$.

3.º Que la integral de $\frac{2adx}{a^2-xx}$ es $L\left(\frac{a+x}{a-x}\right)$. Porque
si diferenciamos $\frac{a+x}{a-x}$ sacaremos $\frac{dx(a-x)+dx(a+x)}{(a-x)^2} = \frac{2adx}{(a-x)^2}$,
cuya cantidad dividida por $\frac{a+x}{a-x}$ dá $\frac{2adx}{(a-x)^2} \times \frac{a-x}{a+x} =$
 $\frac{2adx}{(a+x)(a-x)} = \frac{2adx}{a^2-xx}$.

Finalmente $S. \frac{2adx}{x\sqrt{(a^2 \pm x^2)}} = L\left(\frac{a-\sqrt{(a^2 \pm x^2)}}{a+\sqrt{(a^2 \pm x^2)}}\right)$. Porque
la diferencial de $\frac{a-\sqrt{(a^2 \pm x^2)}}{a+\sqrt{(a^2 \pm x^2)}}$ es $\frac{\mp xdx}{\sqrt{(a^2 \pm x^2)}} \times \left[\frac{a+\sqrt{(a^2 \pm x^2)}}{(a+\sqrt{(a^2 \pm x^2)})^2}\right]$

$\mp \frac{xdx}{\sqrt{(a^2 \pm x^2)}} \times \left[\frac{a-\sqrt{(a^2 \pm x^2)}}{(a+\sqrt{(a^2 \pm x^2)})^2}\right] = \frac{\mp 2axdx}{\sqrt{(a^2 \pm x^2)} \times (a+\sqrt{(a^2 \pm x^2)})^2}$

cuya cantidad dividida por $\frac{a-\sqrt{(a^2 \pm x^2)}}{a+\sqrt{(a^2 \pm x^2)}}$ dá

$$\frac{\mp 2axdx}{\sqrt{(a^2 \pm x^2)} \times [a+\sqrt{(a^2 \pm x^2)}]^2} \times \frac{a+\sqrt{(a^2 \pm x^2)}}{a-\sqrt{(a^2 \pm x^2)}} =$$

$$\frac{\mp 2axdx}{\sqrt{(a^2 \pm x^2)} \times [a+\sqrt{(a^2 \pm x^2)}] \times (a-\sqrt{(a^2 \pm x^2)})} = \frac{\mp 2axdx}{\sqrt{(a^2 \pm x^2)} \times \mp x^2}$$

Fig. $\equiv \frac{2adx}{x\sqrt{(a^2-x^2)}}$, que es la diferencial propuesta.

546 Es muy facil señalar el valor numérico de todas estas integrales. Supongamos, por egeemplo, que nos importe averiguar el valor de $L(a+x)$, siendo $a \equiv 5$, en el supuesto de ser $x \equiv 2$. Habremos, pues, de señalar el valor de $L.7$. Buscaremos en las tablas ordinarias el logaritmo de 7, que es 0,8450980; le multiplicaremos (II.354) por 2,30258509 ó 2,3025811, y sacaremos 1,9459100 ó 1,94591, que será el valor de $L(a+x)$, ó de la integral de $\frac{dx}{a+x}$, quando $a \equiv 5$, y $x \equiv 2$.

Integracion de las diferenciales que llevan senos y cosenos.

547 Una vez que segun hemos visto (352) $d(\text{sen } z) \equiv dz \cos z$, y $d(\cos z) \equiv -dz \text{sen } z$; podemos inferir que la integral de $dz \cos z$ será $\text{sen } z$, ó mas generalmente $\text{sen } z + C$, que tiene la misma diferencial. La integral de $-dz \text{sen } z$ será $\cos z + C$.

548 Si hubiéramos de integrar $dz \cos 3z$, la daríamos esta forma $\frac{3d\gamma \cos 3\gamma}{3}$, y sería su integral $\frac{\text{sen } 3\gamma}{3} + C$. Para hallar la integral de $dz \text{sen } 3z$, escribiríamos $\frac{-3d\gamma \text{sen } 3\gamma}{-3}$, y sacaríamos que su integral es $\frac{\cos 3\gamma}{-3} + C$. En general $\int dz \text{sen } mz$ se transforma en $\int \frac{-md\gamma \text{sen } m\gamma}{-m} = \frac{\cos m\gamma}{m} + C$, con tal que sea m un número constante.

549 Quando ocurriere integrar $(\text{sen } z)^n dz \cos z$, convendrá reparar que la diferencial propuesta es la misma que estorra $(\text{sen } z)^n d(\text{sen } z)$; y si miramos $\text{sen } z$ como una

una variable , podremos integrar por la regla fundamental, Fig.

$$\text{y sacaremos que } \int (\text{sen } z)^n dz \cos z = \frac{(\text{sen } z)^{n+1}}{n+1} + C.$$

Si la diferencial que se ha de integrar fuese $(\text{sen } mz)^n dz \cos mz$, la daríamos esta forma $\frac{(\text{sen } mz)^n m dz \cos mz}{m}$,

que viene á ser $\frac{(\text{sen } mz)^n d(\text{sen } mz)}{m}$, cuya integral es...

$$\frac{(\text{sen } mz)^{n+1}}{m(n+1)}.$$

550 Para hallar la integral de $(\cos mz)^n dz (\text{sen } mz)$; la escribiremos de este modo $\frac{(\cos mz)^n \times -mdz \text{sen } mz}{-m}$, cu-

ya integral es $\frac{(\cos mz)^{n+1}}{-m(n+1)} + C.$

551 Si hubiéramos de integrar $dz \text{sen } pz \cos qz$; en virtud de lo dicho (II. 378) transformaríamos $\text{sen } pz \cos qz$ en $\frac{1}{2} \text{sen } (pz+qz) + \frac{1}{2} \text{sen } (pz-qz)$, ó $\frac{1}{2} \text{sen } (p+q)z + \frac{1}{2} \text{sen } (p-q)z$; y tendríamos que integrar $\frac{1}{2} dz \text{sen } (p+q)z + \frac{1}{2} dz \text{sen } (p-q)z$, cuya cantidad si la escribimos de este modo $\frac{1}{2} \frac{(p+q) d\chi \text{sen } (p+q)\chi}{p+q} + \frac{1}{2} \frac{(p-q) d\chi \text{sen } (p-q)\chi}{p-q}$, tiene por integral $\frac{1}{2} \frac{\cos (p+q)z}{p+q} - \frac{1}{2} \frac{\cos (p-q)z}{p-q} + C.$

Por el mismo camino hallaríamos la integral de dz

Fig. $dz \sin pz \cos qz \sin rz \&c$, transformando estos productos en senos ó cosenos de la suma, ó de la diferencia de los arcos $pz, qz, rz \&c$. por lo dicho (II. 578).

552 Supongamos que hayamos de integrar $dz(\sin z)^3$; la transformaremos en $dz \sin z (\sin z)^2$; pero (II. 578) $(\sin z)^2$ ó $\sin z \times \sin z = \frac{1}{2} \cos (z-z) - \frac{1}{2} \cos (z+z) = \frac{1}{2} \cos 0 - \frac{1}{2} \cos 2z = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2z$, porque $\cos 0 = 1$; luego $\sin z (\sin z)^2 = \frac{1}{2} \sin z - \frac{1}{2} \sin z \times \cos 2z$. Luego $dz(\sin z)^3 = \frac{1}{2} dz \sin z - \frac{1}{2} dz \sin z \cos 2z$. Reduciremos, pues, $\sin z \cos 2z$ del mismo modo que hemos reducido (551) $\sin pz \cos qz$, y será facil la integracion. Esto manifiesta como haríamos para integrar $dz (\sin z)^n$, siendo n un número entero positivo. El mismo rumbo seguiríamos para integrar $dz(\cos z)^n$. Por consiguiente los principios que hemos sentado pueden servir para integrar las cantidades de esta forma $(\sin pz)^m (\cos qz)^n (\sin rz)^s \&c$. en el supuesto de ser m, n, s números enteros positivos.

553 Finalmente, sirven estos mismos principios, juntamente con lo que llevamos dicho hasta aquí acerca del modo de integrar las cantidades, para hallar las integrales de las diferenciales afectas de senos y cosenos, quando tienen una integral algebraica; y quando llevaren tangentes será facil reducirlas á diferenciales de senos, y cosenos teniendo presente que $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ (II. 367).

Fig.

Integracion de las diferenciales logarítmicas y esponenciales.

554 Supongamos que se nos ofrezca integrar $\frac{dx}{xLx}$, haremos $Lx = y$, que dará $\frac{dx}{x} = dy$; por consiguiente la propuesta se transformará en $\frac{dy}{y}$, cuya integral es Ly (476); y poniendo en lugar de y su valor Lx , será $S. \frac{dx}{xLx} = L. Lx$.

555 Para integrar $m(Lx)^{m-1} \frac{dx}{x}$, haremos tambien $Lx = y$, de cuyo supuesto sacaremos $\frac{dx}{x} = dy$, $(Lx)^{m-1} = y^{m-1}$; luego $m(Lx)^{m-1} \frac{dx}{x} = my^{m-1} dy$; y como la integral de esta última diferencial es y^m , se infiere que $S. m(Lx)^{m-1} \frac{dx}{x} = (Lx)^m$ despues de substituido en lugar de y su igual Lx .

556 Si se me pidiera la integral de $m(L.Lx)^{m-1} \frac{dx}{xLx}$, haría $Lx = y$, de donde inferiría $\frac{dx}{x} = dy$; $L.Lx = Ly$; luego se transformaría la diferencial propuesta en esta $m(Ly)^{m-1} \frac{dy}{y}$, cuya integral es (555) $(Ly)^m$, y substituyendo en lugar de Ly su valor $L.Lx$, será $S. m(L.Lx)^{m-1} \frac{dx}{xLx} = (L.Lx)^m$.

557 En el caso de ser la diferencial propuesta $nm(Lx^m)^{n-1} \frac{dx}{x}$, haríamos $x^m = y$, de donde inferiríamos $dx = \frac{dy}{mx^{m-1}}$; $Lx^m = Ly$, y egecutando las substituciones

correspondientes sacaríamos la transformada $nm(Ly)^{n-1} \frac{dy}{mx^m} = n(Ly)^{n-1} \frac{dy}{y}$, cuya integral (555) es $(Ly)^n$. Substituyendo, pues, en lugar de y su igual x^m , será $S. nm(Lx^m)^{n-1} \frac{dx}{x} = (Lx^m)^n$.

Fig. 558 Supongamos finalmente que la diferencial propuesta sea $nm \left[L(Lx)^m \right]^{n-1} \frac{dx}{xLx}$; haremos $Lx = y$; luego $\frac{dx}{x} = dy$; $(Lx)^m = y^m$; y ejecutando las substitutiones correspondientes sacaremos la siguiente transformada $nm (Ly^m)^{n-1} \frac{dy}{y}$, cuya integral es (557) $(Ly^m)^n$. Luego $S. nm \left[L.(Lx)^m \right]^{n-1} \frac{dx}{xLx} = \left[L(Lx)^m \right]^n$.

559 Por lo que mira á las diferenciales esponenciales, seguiremos para integrarlas un camino opuesto al que nos guió para diferenciarlas. Por consiguiente *la integral de una diferencial esponencial es la misma diferencial dividida por la diferencia de su logaritmo*.

Porque una vez que (349) la diferencial de c^x es $c^x dx$, se sigue que $S.c^x dx = c^x$. La misma regla nos enseña que la integral de $x^y dy Lx + x^{y-1} y dx$ es x^y ; Porque la diferencia del logaritmo de x^y es $dy Lx + \frac{y dx}{x}$.

Dividiendo $x^y dy Lx + x^{y-1} y dx = x^y dy Lx + \frac{x^y y dx}{x}$ por $dy Lx + \frac{y dx}{x}$, sale el cociente x^y .

560 Si hubiéramos de integrar $x^{y^z} y^z x^{y^z-1} dx + x^{y^z} y^z dz Lx Ly + x^{y^z} y^{z-1} z dy Lx$, hallaríamos que la integral es x^{y^z} . Porque el logaritmo de x^{y^z} es $y^z Lx$, cuya diferencia es $y^z \frac{dx}{x} + y^z dz Lx. Ly + y^{z-1} z dy Lx$. Dividiendo la propuesta por esta cantidad, el cociente de la division será x^{y^z} .

561 Tambien podemos hacer uso de las substituciones

ciones para integrar las diferenciales esponenciales. Supon- Fig.
gamos que se nos pida la integral de $c^x dx$, haremos
 $c^x = y$; luego $x Lc = Ly$, ó por ser $Lc = 1$, $x = Ly$.
Luego $dx = \frac{dy}{y}$. Substituyendo, sacaremos $\frac{y dy}{y} = dy$, cuya
integral es y , que hemos hecho igual á c^x . Por consi-
guiente $\int c^x dx = c^x$.

562 Si buscamos la integral de $x^y dy Lx + \frac{x^y y dx}{x}$,
haríamos $x = z$, de donde inferiríamos $y Lx = Lz$, y
diferenciando $\frac{y dx}{x} + dy Lx = \frac{dz}{z}$. Egecutando en la pro-
puesta las substituciones correspondientes, sacaremos la
transformada dz , cuya integral es $z = x^y$, la misma que
sacamos antes (559) por la regla general.

563 Para sacar la integral de $x^{y^i} \times (y^i x^{-i} dx +$
 $y^i dz Lx . Ly + y^{i-1} z dy Lx)$, haremos como antes $x^{y^i} = u$;
de donde inferiremos $y^i Lx = Lu$, y $y^i x^{-i} dx + y^i dz Lx Ly$
 $+ y^{i-1} z dy Lx = \frac{du}{u}$. Si despues de egecutadas las substi-
tuciones correspondientes en la propuesta, integramos, sale
por fin $\int du = u$; y por consiguiente la integral de la pro-
puesta será x^{y^i} .

Usos del cálculo integral para quadrar las curvas.

564 Como la unidad con la qual suelen compa-
rarse las areas de las figuras es un quadrado (I.494),
lo mismo es quadrar una figura que medir el espacio que
su perímetro encierra. Para esta quadratura de los espacios

Fig. es de un uso generalísimo, según hemos insinuado (474), el cálculo integral, por aplicarse á la medida de cualesquiera espacios, sea la que fuere la especie ó naturaleza de las líneas que los terminan. Verdad es que hay muchos espacios que ni aun con este socorro es posible quadrar absolutamente; pero facilita quadraturas muy aproximadas, quando no se pueden sacar cabales, y abrevia muchísimo el modo de hallarlas.

565 Para valuar la superficie, ó, lo que es lo propio, para sacar la quadratura de las líneas curvas, las ^{213.} consideramos como polígonos de una infinidad de lados; y desde los extremos M, m de cada lado concebimos tiradas las perpendiculares MP, mp al eje de las abscisas, con lo que está dividida la superficie en una infinidad de trapezios infinitamente pequeños. Cada trapezio $PpmM$ se considera como la diferencial del espacio finito APM ; porque $PpmM = Apm - APM = d(APM)$ (322). Solo falta espresar algebraicamente el trapezio $PpmM$, é integrar despues su espresion, por medio de las reglas de integracion que hemos declarado.

Pero es de reparar que el trapezio $PpmM$ que consideramos como la diferencial de la superficie contándola desde el origen A de las abscisas, puede ser tambien la diferencial de otro espacio qualquiera $KPML$, contándole desde un punto fijo, y determinado K , porque tambien $PpmM = KpmL - KPML = d(KPML)$. Por consiguiente la integral que resultare podrá espresar el espacio APM ,

APM , y el espacio $KPLM$ que discrepa del primero de Fig. un espacio KAL determinado y constante. Será, pues, indispensable añadirla á la integral que se hallare, una constante que determine la diferencia que hay entre el espacio que quisiéramos valuar, y el que resulta del cálculo: los egemplos manifiestan el modo de determinar esta constante. Por ahora nos ceñiremos á sacar la espresion del espacio $PpmM$.

566 Para cuyo fin llamaremos AP , x ; PM , y ; y será $Pp = dx$, $rm = dy$. La superficie del trapecio $PpmM$ (I. 500) es $\frac{PM+pm}{2} \times Pp = \frac{2y+dy}{2} \times dx = ydx + \frac{dx dy}{2}$. Pero la cantidad $\frac{dx dy}{2}$ es despreciable respecto de ydx (326); luego la espresion general de la diferencial ó del elemento de la superficie de una curva se reducirá á ydx .

Para aplicar esta fórmula á una superficie propuesta cuya equacion fuese dada, se habrá de sacar de la espresada equacion el valor de y para substituirle en la fórmula ydx ; cuya substitucion transformará la fórmula en una cantidad en que no habrá mas que x y dx , cuya integral, dado caso que se pudiese conseguir, espresará, añadiéndola una constante, la superficie ó area de la curva, contándola desde el punto que quisiéremos. Solo restará determinar la constante, determinando el punto desde el qual se ha de contar la superficie.

567 Quando las ordenadas, bien que paralelas las unas á las otras no forman un ángulo recto con las abscisas, resulta para la quadratura una fórmula algo diferen-

Fig. te de la que acabamos de sacar. Porque el trapecio elemental $PpmM$ que ha de ser igual á $\frac{PM+pm}{2}$ multiplicado por la distancia que hay entre los dos lados paralelos, no será ya $\frac{PM+pm}{2} \times dx$ como antes (566), sino $\frac{PM+pm}{2}$ multiplicada por pn , que no es lo mismo que Pp . Busquemos, pues, el valor de la altura pn del trapecio elemental, y hallaremos que es el seno del ángulo APM ó pPM que forman las ordenadas paralelas con el ege de las abscisas; porque si miramos Pp como el radio será (I.666) pn el seno del ángulo pPM , cuyo seno es el mismo (I.646) que el del ángulo APM . Luego si llamamos r el radio Pp , y ϕ el ángulo pPn , tendremos (I.664) $Pp : pn :: r : \text{sen } \phi$. Luego $pn = \frac{Pp \times \text{sen } \phi}{r} = dx \times \frac{\text{sen } \phi}{r}$. Por consiguiente la espresion del trapecio diferencial $PpmM$ será $\frac{PM+pm}{2} \times dx \cdot \frac{\text{sen } \phi}{r} = \frac{2y+dy}{2} \times dx \cdot \frac{\text{sen } \phi}{r}$, que se reduce á $ydx \times \frac{\text{sen } \phi}{r}$, y los espacios serán $\frac{\text{sen } \phi}{r} S.ydx$. En cuyo caso serán tanto menores los espacios quanto mayor fuere la razon entre el radio r y $\text{sen } \phi$, pues quanto mayor fuere esta razon, tanto menor será la cantidad $\frac{\text{sen } \phi}{r}$. Quando $r = 1$, será $ydx \times \frac{\text{sen } \phi}{r} = ydx \cdot \text{sen } \phi$, y $\frac{\text{sen } \phi}{r} S.ydx = \text{sen } \phi S.ydx$.

568 En lo que acabamos de decir en orden á la quadratura de las curvas hemos supuesto que las ordenadas sean paralelas unas á otras. Pero si las ordenadas salieren todas desde un centro comun, se supondrá dividida la
area

área de la curva en triángulos, y no en trapecios, de cuyo supuesto resultará alguna diferencia en la fórmula general de la quadratura. Por egemplo, para valuar la superficie del segmento CNQ , le concebiremos dividido en una infinidad de triángulos infinitamente pequeños, como CQq . Si desde el punto Q bajáramos á Cq la perpendicular Qt , ó, Fig. 215. lo que es lo propio, si desde el punto C como centro, y con el radio CQ trazamos el arco Qt , la espresion del triángulo CQq será $\frac{Cq \times Qt}{2}$. Por consiguiente si llamamos CQ, y ; y el arco Qt, dx , será $Cq = y + dy$; y por consiguiente el triángulo $CQq = \frac{y+dy}{2} dx = \frac{ydx+dx dy}{2}$, esto es $\frac{ydx}{2}$, despues de desechado (326) el término $\frac{dydx}{2}$. Solo faltará, pues, sacar de la equacion que espresare la relacion entre x é y el valor de y en x para substituirle en la fórmula en lugar de y , y despues integrar.

569 Cuestion I. Hallar la superficie de un triángulo rectángulo ABC . 216.

Llamaremos AB, a ; la perpendicular BC, b , y considerando la porcion AD de la base como una cantidad variable, la llamaremos x ; y á la ordenada ó perpendicular correspondiente DE la llamaremos y . Los triángulos semejantes ABC, ADE darán $a : b :: x : y = \frac{bx}{a}$; luego ydx que espresará la diferencial de la area ADE , será en este caso $= \frac{bx dx}{a}$, cuya integral es $\frac{bx^2}{2a}$ (472). Por consiguiente quando $x = a$, y DE se confunde con $BC, \frac{bx^2}{2a} = \frac{ab}{2} = \frac{AB \times BC}{2}$ que será la area del triángulo propuesto, la misma que hallamos en otro lugar (I.497).

Fig. 570 Cuestion II. *Quadrar la parábola vulgar, cuya equacion es $yy = px$.*

De la equacion de la curva sacaremos $y = \sqrt{px} = p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}$; luego ydx será $p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} dx$; como la integral de esta última cantidad (472) es $\frac{p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}dx} + C$ ó $\frac{p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$, será esta última espresion el valor de la superficie 213. de la parábola; por manera que si conociéramos la abscisa x , y el parámetro p , conoceríamos el valor del espacio APM , ó del espacio $KPML$ contado desde un punto determinado K , si fuese determinada la constante C ; quiero decir, si dicha integral espresára actualmente desde qué punto se cuenta.

Supongamos, pues, que queramos contar los espacios desde el punto A ; será en este caso $APM = \frac{2}{3} p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}} + C$. Para averiguar cuál ha de ser el valor de C , á fin de que se verifique esta equacion, hemos de reparar que quando $x = 0$, el espacio APM es tambien cero, en cuyo supuesto la equacion viene á ser $0 = 0 + C$; luego $C = 0$; luego para que la integral espresé los espacios contados desde el punto A , es preciso que la constante C sea cero; quiero decir que entonces no hay que añadir constante alguna, y en general el espacio indeterminado $APM = \frac{2}{3} p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}}$.

Pero si quisiésemos contar los espacios desde el punto K , de modo que siendo b una cantidad conocida fuera $AK = b$; en este supuesto sería $KPML = \frac{2}{3} p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}} + C$; pero estos espacios llegan á ser cero quando AP ó $x = b$;

lue-

luego entonces $0 = \frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}b^{\frac{3}{2}} + C$, luego $C = -\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}b^{\frac{3}{2}}$, Fig. y por consiguiente $KPML = \frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}b^{\frac{3}{2}}$.

Esto acaba de manifestar para qué sirve la constante que se añade á una integral, y que solo las circunstancias de la cuestion pueden determinarla.

Conviene reparar que $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} \times x$; pero $p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} = y$; luego $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}}$ ó $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} \times x = \frac{2}{3}xy$; luego ya que $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}}$ es la espresion del espacio APM , será tambien $APM = \frac{2}{3}xy = \frac{2}{3}AP \times PM$, ésto es, los $\frac{2}{3}$ del rectángulo $APMO$, sea la que fuere AP .

Tambien $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}b^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} \times b$; pero quando $x = AK = b$, la equation $yy = px$ dá $yy = pb$; y por consiguiente $y = p^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}$, esto es $KL = p^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}$; luego $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}b^{\frac{3}{2}}$ ó $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} \times b = \frac{2}{3}KL \times AK$; luego ya que $\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}b^{\frac{3}{2}}$ es el valor del espacio $KPML$, el mismo espacio será tambien $= \frac{2}{3}AP \times PM - \frac{2}{3}AK \times KL$, esto es $\frac{2}{3}APMO - \frac{2}{3}AKLI$.

571. Cuestion III. *Quadrar las parábolas de todos los géneros, cuya equation es $y^{m+n} = a^m x^n$.*

De esta equation sacaremos que $y = \sqrt[m+n]{a^m x^n} = a^{\frac{m}{m+n}} x^{\frac{n}{m+n}}$; luego $ydx = a^{\frac{m}{m+n}} x^{\frac{n}{m+n}} dx$, cuya inte-

gral es $\frac{a^{\frac{m}{m+n}} x^{\frac{n}{m+n} + 1}}{\frac{n}{m+n} + 1} + C$, que se reduce á

$\frac{m+n}{m+2n} a^{\frac{m}{m+n}} x^{\frac{n}{m+n} + 1} + C$, que es lo mismo que

$\frac{m+n}{m+2n} a^{\frac{m}{m+n}} x^{\frac{n}{m+n}} \times x + C = \frac{m+n}{m+2n} xy + C$, despues de haber

subs-

Fig. substituido y en lugar de su igual $a^{\frac{m}{m+n}} x^{\frac{n}{m+n}}$. Por manera que si queremos contar los espacios APM desde el origen A de las abscisas x , la integral será cero quando APM 217. fuere cero, y por consiguiente quando x es cero, la constante C es cero, y se reduce la integral á $\frac{m+n}{m+2n} xy$. Luego el espacio APM es siempre una porcion determinada del producto xy , ó del rectángulo $APMO$; cuya porcion la determina la fraccion $\frac{m+n}{m+2n}$, cuyo valor pende de los valores m y n , esto es del grado de la parábola.

572 Cuestion IV. *Quadrar las hypérbolas de todos los grados, comparadas con sus asímtotas.*

De la equación general $y = a^{\frac{m+n}{m}} x^{-\frac{n}{m}}$ de estas curvas, sacaremos que $ydx = a^{\frac{m+n}{m}} x^{-\frac{n}{m}} dx$, cuya integral es $\frac{a^{\frac{m+n}{m}} x^{1-\frac{n}{m}}}{1-\frac{n}{m}} + C$, ó $\frac{m}{m-n} a^{\frac{m+n}{m}} x^{1-\frac{n}{m}} + C$,

por medio de cuya espresion se determina facilmente la constante, quando m es mayor que n . Pero quando m es menor que n , sale infinita la constante, si se cuentan los espacios desde el origen de las x , y sale finita contando los espacios desde el otro punto qualquiera. Supongamos, por egemplo, $m = 1$, $n = 2$; en cuyos supuestos la equacion general se transformará en $= a^3 x^{-2}$, y la superficie será $= a^3 x^{-1} + C$, ó $C = \frac{a^3}{x}$. Luego si contamos los espacios desde el origen A de las x , será preciso que

$C - \frac{a^3}{x}$ sea cero, quando $x = 0$; quiero decir que $C - \frac{a^3}{0}$ Fig.
 $= 0$, y por consiguiente $C = \frac{a^3}{0}$, ó es infinita. Pero si con-
 táramos los espacios desde el punto K , de modo que $CK = b$,
 tendríamos $C - \frac{a^3}{b} = 0$, y $C = \frac{a^3}{b}$.

Para averiguar lo que significa esta espresion hemos 218.
 de considerar que la curva cuya equacion es $y = a^3 x^{-2}$
 ó $y = \frac{a^3}{x^2}$, corre al infinito á lo largo de las asýmtotas
 CZ , CT ; pero se acerca mucho mas á la asýmtota CZ
 que á la asýmtota CT , conforme se puede inferir de su
 equacion; por manera que si contamos los espacios desde
 la asýmtota CT son infinitos, porque el espacio compre-
 hendido entre dicha asýmtota y el ramo infinito BS , es
 infinito. Este es el motivo de no poderse apreciar los espa-
 cios $CPMS$ contados desde la asýmtota CT . Al contra-
 rio los espacios comprendidos entre el ramo BM , y la
 asýmtota CZ hasta el infinito, tienen un valor finito, por-
 que á muy corto trecho, el ramo se acerca con mucha
 rapidez á su asýmtota; de modo que la espresion del espa-
 cio infinitamente largo $KLMOZ$ es $\frac{a^3}{b}$, y $PMOZ = \frac{a^3}{x}$, y
 por consiguiente $KLMP = \frac{a^3}{b} - \frac{a^3}{x}$. De donde se infiere
 que aunque no se puedan valuar los espacios contándolos des-
 de CT , se pueden valuar los espacios $KLMP$ contados des-
 de un punto K tan arrimado quanto se quisiere á CT .

573 Ahora declararemos la mudanza que resulta en
 los logaritmos hyperbólicos de no ser recto el ángulo que
 forman las asýmtotas, ó qual es el verdadero valor del
 quadrilátero $AGFf$, por egemplo, quando no fuese equi- 218.

Fig. látera la hypérbola LBO , porque será facil aplicar lo que 218. de este digéremos á otro qualquiera trapecio hyperbólico.

Para esto supondremos primero que sea equilátera la espresada hypérbola, y que $(CG)^2 = aa$, siendo $CG = a$. Hemos probado (481) que si fuese $CF = x$ será el quadrilátero $AGFf$ el logaritmo hyperbólico de la abscisa CF ; por consiguiente, si suponemos $CG = 1$, y $GF = x$, probaríamos por el mismo camino que el quadrilátero $AGFf$ sería el logaritmo hyperbólico de la abscisa $CF = 1 + x$, ó del número CF mayor que la unidad.

Veamos ahora qual es la espresion del logaritmo de $CF = 1 + x$ en el supuesto de ser $CG = a$, y $(CG)^2 = aa =$ la potencia de la hypérbola, cuya investigacion se reduce á hallar en estos supuestos el valor del quadrilátero $AGFf$. Por lo dicho (171) sabemos que $(CG)^2 = CF \times Ff$, ó que $aa = (a + x) \times Ff$; luego $Ff = \frac{aa}{a+x}$, cuya cantidad multiplicada por dx ha de ser (566) el elemento del espresado quadrilátero; por manera que $S. \frac{aadx}{a+x} = AGFf$. Para hallar esta integral reduciremos á serie la cantidad $\frac{dx}{a+x}$, y saldrá $\frac{dx}{a} - \frac{xdx}{aa} + \frac{xxdx}{a^3} - \frac{x^3dx}{a^4} + \&c.$ Será, pues, $S. \frac{aadx}{a+x} = aa S. \left(\frac{dx}{a} - \frac{xdx}{aa} + \frac{xxdx}{a^3} - \frac{x^3dx}{a^4} + \&c. \right) = aa \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{2aa}xx + \frac{1}{3a^3}x^3 - \frac{1}{4a^4}x^4 + \&c. \right) = aaL \left(1 + \frac{x}{a} \right) = aaL \left(\frac{a+x}{a} \right)$ (II. 352). Luego si llamamos CF , z , será $AGFf = aaL \frac{z}{a}$. Si el ángulo que forman las asýntotas no fuese recto, y le llamáramos ϕ , se habria (567) de multiplicar su espresion por $\text{sen } \phi$ para hallar su valor

ca-

cabal, y sería $aa \operatorname{sen} \phi \frac{x}{a}$ el verdadero valor de $aaL \frac{x}{a}$ en el Fig. caso actual.

574 Pero si fuese equilátera la hypérbola, y $a = 1$ sería $AGFf = Lz$, como ha de ser (481), y lo mismo que allí sacamos.

Si formáran las asýmtotas un ángulo de $25^{\circ} 44' 25''$, el quadrilátero $AGFf$ sería el logaritmo tabular de la abscisa CF ; porque si multiplicamos el logaritmo natural Lz de dicha abscisa por el módulo $0,43429448 \&c.$ (II. 354) que llamaremos A , es preciso que $aa \operatorname{sen} \phi L \frac{x}{a} = ALz$, cuya equacion solo puede verificarse quando $a = 1$, y entonces sale $\operatorname{sen} \phi = A = 0,43429448 \&c.$ que en las tablas de los senos naturales corresponde á $25^{\circ} 44' 25''$. Por consiguiente los logaritmos tabulares representan las areas asýmtóticas de una hypérbola cuya potencia es 1, y cuyas asýmtotas forman un ángulo de $25^{\circ} 44' 25''$.

Si hubiéramos de determinar un espacio hyperbólico $AGPM$ que tuviera con el espacio $AGFf$ la misma razon que p con q ; llamaríamos CF, z ; CP, u ; y sería $aa \operatorname{sen} \phi L \frac{x}{a}$: $aa \operatorname{sen} \phi L \frac{u}{a} :: p : q :: L \frac{x}{a} : L \frac{u}{a}$; luego $qL \frac{x}{a} = pL \frac{u}{a}$, ó $L(\frac{u}{a})^p = L(\frac{x}{a})^q$, de cuya equacion se sacará $(\frac{u}{a})^p$

$$= (\frac{x}{a})^q; \frac{u}{a} = (\frac{x}{a})^{\frac{q}{p}}, \frac{u}{a} = \frac{z^{\frac{q}{p}}}{a^{\frac{q}{p}}}, \text{ y } u = z^{\frac{q}{p}} a^{1 - \frac{q}{p}} =$$

$$z^{\frac{q}{p}} a^{\frac{p-q}{p}} = \sqrt[p]{(z^p a^{p-q})}.$$

575. Cuestion V. *Quadrar el sector de círculo ACB.*

Lla-

Fig. Llamemos a el radio $AC = BC$; al arco AB , considerando como variable, le llamaremos x , y será el arco BM , infinitamente pequeño, dx . Será, pues, el triángulo CBM el elemento de la area que buscamos, y su espresion será $\frac{adx}{2}$; por consiguiente la area total será $S. \frac{adx}{2} = \frac{ax}{2} = AC \times \frac{1}{2} AB$. De donde se infiere que la area de qualquiera círculo es igual al producto de la mitad de su circunferencia por la mitad del diámetro.

220. 576 Cuestion VI. *Quadrar el semicírculo AEH.*

Llamaremos el diámetro AH , a ; AB , x ; BR , y ; la propiedad del círculo dará $(BR)^2 = AB \times BH$ ó $yy = ax - xx$, é $y = \sqrt{ax - xx}$, cuyo valor substituido en ydx dará $dx\sqrt{ax - xx} = a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} dx \times (1 - \frac{x}{a})^{\frac{1}{2}}$. Si reducimos á serie (II. 107) el radical que lleva esta espresion, será $ydx = a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} dx (1 - \frac{x}{2a} - \frac{x^2}{8a^2} - \frac{x^3}{16a^3} - \frac{5x^4}{128a^4} \&c) = a^{\frac{1}{2}} (x^{\frac{1}{2}} dx - \frac{x^{\frac{3}{2}} dx}{2a} - \frac{x^{\frac{5}{2}} dx}{8a^2} - \frac{x^{\frac{7}{2}} dx}{16a^3} \&c)$. Sacando la integral de cada término separadamente será $S. ydx = a^{\frac{1}{2}} (\frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{5a} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{28a^2} - \frac{x^{\frac{9}{2}}}{72a^3} - \frac{5x^{\frac{11}{2}}}{704a^4} \&c.) = x\sqrt{ax} \times (\frac{2}{3} - \frac{x}{5a} - \frac{x^2}{28a^2} - \frac{x^3}{72a^3} - \frac{5x^4}{704a^4} \&c.) =$ la area ABR .

Quando $x = \frac{1}{2}a$, la ordenada no se distingue del radio OE ; en cuyo caso la area será $= \frac{1}{2} a\sqrt{\frac{1}{2}aa} (\frac{2}{3} - \frac{1}{10} - \frac{1}{112} - \frac{1}{576} - \frac{5}{11264} \&c.) = \frac{a^2 \sqrt{\frac{1}{2}}}{2} (0,6666 - 0,1$

$-0,0089 - 0,0017 - 0,0004 \&c) = 0,1964a^2$ Fig.
cuyo valor multiplicado por 2 dará $0,3928a^2$, que será
con muy corta diferencia el valor de la area del semicírcu-
lo AEH .

Como la serie que hemos sacado para quadrar el qua-
drante AOE converge muy lentamente, y sería menester
tomar muchos de sus términos para sacar un resultado muy
aproximado, buscaremos por otro camino la quadratura
que pide la cuestion. Quadraremos una porcion como ABR
del quadrante propuesto, suponiendo x muy pequeña en
comparacion de a , y sacaremos una serie tan convergente
que con pocos de sus términos lograremos el intento.

Con esta mira recordaremos, que si el arco AR fuese
 $= \frac{1}{3}AE$, ó de 30° , su seno BR será $= \frac{1}{2}AO(1,642)$; y
por consiguiente AB ó $x = AO - OB = AO - \sqrt{[(OR)^2 - (BR)^2]}$
 $= 0,1339746$ con muy corta diferencia, su-
poniendo para mayor facilidad el radio $AO = 1$. Substi-
tuyendo el valor de a en la serie $\sqrt{ax^3}(\frac{2}{3} - \frac{x}{5a} - \frac{x^2}{28a^2} \&c.)$
se transformará en $(0,0693505) \times (0,6666666 -$
 $0,0133975 - 0,0001603 - 0,0000042 -$
 $\&c) = 0,0693505 \times 0,6531046 = 0,0452931$
 $=$ á la area ABR , que sumada con la area $OBR = OB$
 $\times \frac{1}{2}BR = \sqrt{\frac{3}{4}} \times \frac{1}{4} = 0,2165063$, dá $0,2617994$,
que será el valor del sector AOR , cuyo triplo $=$
 $0,7853982$, por ser $AR = \frac{1}{3}AE$, será el valor de la
area de todo el quadrante AOE .

El mismo resultado sacaremos buscando primero el

Fig. valor del espacio comprendido entre el radio OE , y la ordenada BR , y mirando como variable el coseno OB en lugar del seno verso AB .

Sea, pues, $OB = x$, y $OR = OA = b$; será $BR = \sqrt{(OR)^2 - (OB)^2}$, ó $y = (bb - xx)^{\frac{1}{2}}$, y por consiguiente la diferencial de la area $OBRE$ será $= dx(bb - xx)^{\frac{1}{2}} = bdx - \frac{x^2 dx}{2b} - \frac{x^4 dx}{8b^3} - \frac{x^6 dx}{16b^5} - \frac{5x^8 dx}{128b^7} - \frac{7x^{10} dx}{256b^9} \&c.$ Luego la area será $= bx - \frac{x^3}{6b} - \frac{x^5}{40b^3} - \frac{x^7}{112b^5} - \frac{5x^9}{1252b^7} - \frac{7x^{11}}{2816b^9} \&c.$

Si hiciéramos $x = OB = \frac{1}{2}AO$, en cuyo supuesto sería $ER = \frac{1}{3}AE$, y substituyéramos la unidad en lugar de $b = AO$, sería

$$x^3 = x \times x^2 = , 5 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{4} = 0,125$$

$$x^5 = x^3 \times x^2 = \frac{,125}{4} = 0,03125$$

$$x^7 = x^5 \times x^2 = \frac{,03125}{4} = 0,0078125$$

$$x^9 = x^7 \times x^2 = \frac{x^7}{4} = 0,0019531 +$$

$$x^{11} = x^9 \times x^2 = \frac{x^9}{4} = 0,0004883 -$$

Dividiendo estas potencias de x respectivamente por 6,40, 112, 1152, 2816 &c, sacaremos 0,5000000 — 0,0208333 — 0,0007812 — 0,0000698 — 0,0000085 — 0,0000012 — 0,0000002 &c. $= 0,4783057$ que espresará la area $OBRE$ en el supuesto de ser $OB = \frac{1}{2}OA$; de la qual restando el triángulo $OBR = \sqrt{\frac{3}{4}} \times \frac{1}{4} = 0,2165063$, el residuo, 2617994 será la area del sector EOR , cuyo triplo por ser $ER = \frac{1}{3}AE$, será el valor de la area del quadrante entero $= 0,7853982$ como antes.

Cues-

577 Cuestion VII. *Quadrar la elipse.*

Fig.

221.

Sea la elipse que hemos de quadrar AEB ; su ege mayor $AB = a$, su conjugado $CE = b$; de la propiedad de esta curva sacaremos $DR = y = \frac{b}{a} \sqrt{(ax - xx)}$, y por consiguiente $ydx = \frac{b}{a} dx \sqrt{(ax - xx)}$ que será el elemento de la area ARD , en el supuesto de ser $AD = x$. Pero por lo que acabamos de hallar (576) $dx\sqrt{(ax - xx)}$ es el elemento del segmento correspondiente ADn del círculo AGB trazado sobre el ege mayor de la elipse dada, como diámetro; de cuyo elemento hallamos allí mismo la integral; y si representamos por A dicha integral, la de $\frac{b}{a} dx \sqrt{(ax - xx)}$, será $\frac{b}{a} \times A$. Será, pues, $\frac{b}{a} \times A$ el valor del espacio ARD . De donde inferiremos que la area de un segmento elíptico es á la area del segmento correspondiente del círculo circunscripto á la elipse, como el ege menor de la elipse es al mayor, y que por consiguiente toda la elipse es á todo el círculo en la misma razon.

578 Cuestion VIII. *Quadrar la area hyperbólica ABD, y el sector hyperbólico CAD; suponiendo que sea C el centro, y A el vértice principal de la curva.*

2.

Llamemos el semiege CA , a ; su semiconjugado, b ; CB , x ; de la propiedad de la curva sacaremos $BD = y = \frac{b}{a} \sqrt{(xx - aa)}$; y por consiguiente $ydx = \frac{b}{a} \sqrt{(xx - a^2)}$, que será la espresion del elemento de la area ABD .

Para hallar la diferencial del sector CAD , reparare-

Fig. mos que dicho sector $CAD = CBD - ABD = \frac{\pi y}{2} - \int y dx$, de cuya cantidad la diferencial es $\frac{xdy + ydx}{2} - ydx = \frac{xdy - ydx}{2}$. Si en esta última espresion substituimos en lugar de y y dy sus valores respectivos $\frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$, $\frac{bx dx}{a\sqrt{x^2 - a^2}}$, se reducirá finalmente á $\frac{ab}{2} \times \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$, cuya integral es (545) $\frac{ab}{2} \times L\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right) + C$. Para hallar el valor de la constante C , haremos $a = x$, de cuyo supuesto sacaremos que $C = -\frac{ab}{2} \times La$. Luego la integral completa de $\frac{ab}{2} \times \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{ab}{2} \times L\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right) - \frac{ab}{2} La = \frac{ab}{2} \times L\left(\frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a}\right) =$ al sector ADC . Si restamos el sector de $\frac{bx \sqrt{x^2 - a^2}}{2a} = \frac{BC \times BD}{2} =$ al triángulo CBD , será el residuo $\frac{bx \sqrt{x^2 - a^2}}{2a} - \frac{ab}{2} \times L\left(\frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a}\right)$ el valor del espacio hyperbólico ABD .

579 Cuestion IX. *Quadrar la cisoide de Diocles, ó hallar el valor del espacio cisoidal APM.*

Llamaremos AB , a ; AP , x ; PM , y , y será $y^2 = \frac{x^3}{a-x}$ la ^{223.} equation de la curva, é $y = \frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt{a-x}}$. Luego $y dx = \frac{dx \sqrt{x^3}}{\sqrt{a-x}}$, y multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{x}$, será $y dx = \frac{dx \sqrt{x^4}}{\sqrt{(ax - xx)}} = \frac{x^2 dx}{\sqrt{(ax - xx)}}$, que será la diferencial del espacio APM . Si la integramos de modo que sea nula quando $x = 0$, será la integral el valor cabal del espresado espacio. Para integrar $\frac{x^2 dx}{\sqrt{(ax - xx)}}$, la daremos esta forma $2 \times \frac{-x^2 dx}{2\sqrt{(ax - xx)}}$; y dejando á un lado por ahora el factor -2 , con el qual contaremos á su tiempo, transformo $\frac{-x^2 dx}{\sqrt{(ax - xx)}}$ en otra cantidad de igual valor que ella, añadiéndole, y quitándole á un tiempo la cantidad $\frac{dx \sqrt{(ax - xx)}}{2}$, de

de modo que $\frac{-x^2 dx}{2\sqrt{(ax-xx)}} = \frac{-x^2 dx}{2\sqrt{(ax-xx)}} + \frac{dx\sqrt{(ax-xx)}}{2} - \text{Fig.}$
 $\frac{dx\sqrt{(ax-xx)}}{2}$. Sumando el primero y segundo término del se-
 gundo miembro, sacaremos $\frac{-x^2 dx}{2\sqrt{(ax-xx)}} = \frac{-dx\sqrt{(ax-xx)}}{2} +$
 $\frac{(ax-2xx)dx}{2\sqrt{(ax-xx)}} = \frac{-3}{2} dx\sqrt{(ax-xx)} + dx \times \sqrt{(ax-xx)} +$
 $\frac{(ax-2xx)dx}{2\sqrt{(ax-xx)}}$, porque $-1 = \frac{-3}{2} + 1$.

Luego $S. \frac{-x^2 dx}{2\sqrt{(ax-xx)}} = S. \left[-\frac{3}{2} dx \times \sqrt{(ax-xx)} + \right.$
 $dx\sqrt{(ax-xx)} + \left. \frac{(ax-2xx)dx}{2\sqrt{(ax-xx)}} \right]$, y como los dos últimos
 términos del segundo miembro son la diferencial de $x\sqrt{(ax-xx)}$,
 se sigue que $S. \frac{-x^2 dx}{2\sqrt{(ax-xx)}} = x\sqrt{(ax-xx)} - \frac{3}{2} S. dx\sqrt{(ax-xx)}$.
 Ahora servirá el multiplicador -2 que
 arrinconamos al principio de la operacion, para multipli-
 car los dos miembros de la última equacion, y sacaremos
 $S. \frac{x^2 dx}{\sqrt{(ax-xx)}} = 3 S. dx \sqrt{(ax-xx)} - 2x\sqrt{(ax-xx)}$.

Si prolongamos la ordenada PM hasta que encuentre
 en N el círculo, es evidente que $S. dx\sqrt{(ax-xx)}$ será el
 valor del segmento circular APN , que es cero quando
 $x = 0$, y que $x\sqrt{(ax-xx)}$ es el rectángulo $AP \times PN$.
 Luego la area cisoidal APM es igual á la diferencia que vá
 del triplo del semisegmento APN al duplo del rectángulo
 $AP \times PN$, ó al triplo del semisegmento APN menos dos
 veces el rectángulo $AP \times PN$.

Si fuere $x = a$, el semisegmento APN será igual al se-
 micírculo, y el rectángulo $AP \times PN = 0$. Luego el es-
 pacio cisoidal asytmótico $AMFB$ es triplo del semicírculo
 generator.

580 Cuestion X. *Quadrar la conchoide de Nicome-*
des AR, ó hallar el espacio conchoidal CARS, siendo la 224.

Fig. *equacion de la curva* $x^2y^2 = (a + y)^2 \times (b^2 - y^2)$, *en el supuesto de ser* $BC = a$, $RV = AC = b$, $CS = x$, *y* $SR = y$.

De la equacion de la curva sacaremos $x = \frac{a\sqrt{(b^2 - y^2)}}{y} + \frac{y\sqrt{(b^2 - y^2)}}{y} = \frac{a\sqrt{(b^2 - y^2)}}{y} + \sqrt{(b^2 - y^2)}$. Con la mira de reducir esta expresion á una forma mas sencilla, haremos $SV = \sqrt{(b^2 - y^2)} = z$, y será $zz = b^2 - y^2$, $y = \sqrt{b^2 - zz}$; substituyendo en el valor de x que sacamos antes, resultará $x = \frac{az}{\sqrt{(b^2 - z^2)}} + z$; y $dx = \frac{adz\sqrt{(b^2 - z^2)} + \frac{zdz \times az}{\sqrt{(b^2 - z^2)}}}{b^2 - z^2} + dz = \frac{adz(b^2 - z^2) + az^2dz}{(b^2 - z^2)\sqrt{(b^2 - z^2)}} + dz = \frac{ab^2z}{(b^2 - z^2)\sqrt{(b^2 - z^2)}} + dz$; y por consiguiente $ydx = (b^2 - z^2) \times \left(\frac{ab^2dz}{(b^2 - z^2)\sqrt{(b^2 - z^2)}} + dz \right) = \frac{ab^2dz}{b^2 - z^2} + dz\sqrt{(b^2 - z^2)}$.

















Para integrar esta diferencial, desde el punto C como centro, y con el radio $CA = b$, trazaremos el cuadrante de círculo AED , y prolongaremos RH hasta que encuentre en E su periferia; tiraremos tambien EF paralela á AC , y la linea CE . Esto supuesto, es evidente por ser $CE = CA = VR$, y $EF = RS$, que tambien $CF = VS = z$, y por lo mismo $EF = \sqrt{[(CE)^2 - (CF)^2]} = \sqrt{(b^2 - z^2)}$, y el segundo término $dz\sqrt{(b^2 - z^2)}$ de la diferencial que deseamos integrar, espresará el elemento de la area $AEFC$.


Si al valor de esta area se le añade $S. \frac{ab^2dz}{b^2 - z^2} = L. \frac{b+z}{b-z} \times \frac{1}{2}ab$ (545), la suma será el valor de la area $ARCS$.

225. 581 Cuestion XI. *Quadrar la logarítmica* RD , ó *valuar la area logarítmica* $ABDR$.

Llamaremos AB, x ; BD, y ; AR, b ; y la subtran-

gen-





gente BT , a . Los triángulos semejantes Dmp , DBT darán Fig.
 $ady = ydx$; luego el espacio que buscamos $= S. ydx$
 $= S. ady = ay$; y como en el supuesto de $x = 0$, será
 $y = b$, y ay será $= ab$, resulta que la area $ABDR$ será
 $= ay - ab$.

582 Cuestion XII. *Quadrar la espiral de Arquime-* 226.
des BED, ó hallar, por egemplo, el valor del espacio es-
piral BEDB.

Si llamamos el radio AB , r ; el arco AC , u ; BD , y ;
 y c la circunferencia entera del círculo cuyo radio $= r$,
 tendremos (366) $c : u :: r : y$, y $cy = ru$, de donde
 sacaremos diferenciando, $du = \frac{cdy}{r}$. Es evidente que Cc
 será $= du$, y $DR = dx$, y que los triángulos seme-
 jantes BCC , BDR darán $r : du :: y : dx$, de donde sacare-
 mos $du = \frac{rdx}{y}$; comparando los dos valores hallados de du
 sacaremos $dx = \frac{cydy}{rr}$; cuyo valor substituido en la fórmu-
 la general de la quadratura (568) $\frac{1}{2} ydx$ será $\frac{cyydy}{2rr}$
 el elemento de la area que buscamos, cuya integral es $\frac{cy^3}{6rr}$
 $=$ al espacio $BDEB$.

583 Cuestion XIII. *Quadrar la espiral hyperbólica* 227.
CODM, ó hallar el valor del espacio COMC.

Llamaremos el radio CA , a ; el arco AN , x ; la or-
 denada CM , y ; será $Nn = -dx$, porque quando crece
 CM , mengua AN . De los triángulos semejantes CNn , CMr
 sacaremos $a : -dx :: y : Mr = -\frac{ydx}{a}$; luego $COMC =$
 $\frac{1}{2} S. -\frac{ydx}{a}$. Pero siendo $xy = ab$ por la naturaleza de la
 curva (368), será $x = \frac{ab}{y} = aby^{-1}$; luego $dx =$

Fig. $-y^{-2}ab$; substituyendo en $\frac{-yydx}{a}$ en lugar de dx su valor $-y^{-2}ab$, sacaremos $\frac{-yydx}{a} = bdy$, y el espacio comprendido entre la curva y la ordenada CM será $= \frac{1}{2}by$ igual al sector circular CMQ .

228. 584 Cuestion XIV. *Quadrar la cycloide AD, ó hallar el valor del espacio cycloidal ABDA.*

Llamaremos AB , x ; BD , y ; AE , $2r$; FC , u ; el arco AC , t . Esto supuesto, la propiedad del círculo dará $2ry - yy = uu$, $du = \frac{r dy - y dy}{u}$. Si tiramos las fg , bg infinitamente próximas, y respectivamente paralelas á las FD , BD , será $eg = dy = Cm$, $Cc = dt$, y de los triángulos semejantes COF , Ccm , inferiremos $CF:CO :: Cm:Cc$ ó $u:r :: dy:dt = \frac{r dy}{u}$. Ahora bien, la propiedad de la cycloide dá $x = u + t$, y $dx = dt + du = \frac{r dy}{u} + \frac{r dy - y dy}{u} = \frac{2ry - yy}{\sqrt{(2ry - yy)}}$. Luego $ydx = \frac{2ry - yy}{\sqrt{(2ry - yy)}} \times dy = dy\sqrt{(2ry - yy)}$, y como esta diferencial es el elemento del segmento circular AFC , será tambien la area $ABDA$ igual al espresado segmento.

Si quisiéramos valuar el espacio cycloidal $ADCA$, del rectángulo $ABDF$ restaríamos el espacio $ABDA$, y del residuo $ADFA$ restaríamos el segmento AFC .

De la Rectificacion de las curvas.

585 Rectificar una linea curva es determinar quanto coge de largo, ó hallar una linea recta que sea igual á dicha curva. Para conseguirlo se considera la curva AM como un polígono de una infinidad de lados, y podemos con-

229.

considerar el pequeño lado Mm , como la diferencial del Fig. arco AM , porque $AM = Am - AM = d(AM)$. 229. Después tiraremos Mr paralela á AP , y será $Mm = \sqrt{[(Mr)^2 + (rm)^2]} = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$, y la integral de esta cantidad será el valor del arco AM . Para hallar dicha integral, diferenciaremos la equacion de la curva, y después de hallado por su medio el valor de dx en y y dy , ó el de dy en x y dx , se substituirá en $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ en cuya espresion no habrá mas que x y dx^2 , ó y y dy^2 ; se pasará dx^2 ó dy^2 fuera del radical (II. 62), é integraremos. Luego $\int \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ es la fórmula general para la rectificacion de las curvas, y sirve igualmente para las que tienen paralelas sus ordenadas, y para las demás cuyas ordenadas ván todas á parar á un centro comun.

586 Pero si las ordenadas $BC = y$ no formasen con 230. las abscisas $AB = x$ un ángulo recto, será algo diferente la fórmula. Porque si tiramos IE paralela é infinitamente próxima á BC , y CV paralela á BI , será $BI = CV = dx$, $VE = dy$. Tiremos desde el punto C la CF perpendicular á IE , y llamemos ϕ el ángulo constante CVF . Si tomamos CV por el radio r del círculo cuyo centro esté en V , será CF el seno, y FV el coseno del ángulo CVF . Luego tendremos $r : \cos \phi :: CV : VF$, ó $r : \cos \phi :: dx : VF = \frac{\cos \phi}{r} dx$.

Sentado esto, $(CE)^2 = (CF)^2 + (FE)^2 = (CF)^2 + (FV + VE)^2 = (CF)^2 + (FV)^2 + 2FV \times VE + (VE)^2 = (CV)^2 + (VE)^2 \pm 2EV \times VF$, después de substitui-

Dd 4 do

Fig. do en el último miembro de la penúltima equacion en lugar de $(CF)^2$ su valor $(CV)^2 - (VF)^2$ sacado del triángulo rectángulo CFV . Será $+ 2EV \times VF$ quando el ángulo CVE fuese obtuso, y será $- 2EV \times VF$ si dicho ángulo fuese agudo. Substituyendo en lugar de las líneas sus expresiones literales, sacaremos para la rectificacion de las curvas que abraza el supuesto en que caminamos; $\sqrt{(dx^2 + dy^2 \pm \frac{2 \cos \varphi}{r} dx dy)}$, cuyo último término será positivo quando el ángulo CVE fuere obtuso, y será negativo quando fuere agudo el espresado ángulo.

231. 587 Cuestion I. Rectificar la parábola vulgar, cuya equacion es $2ax = yy$.

La diferencial de esta equacion es $adx = ydy$, que dá $dx^2 = \frac{y^2 dy^2}{a^2}$; substituyendo este valor en lugar de dx^2 en la fórmula $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$, sacaremos $\frac{dy}{a} \sqrt{(yy + aa)} = ds$, llamando s el arco de la curva que hemos de rectificar. Luego $dy \sqrt{(yy + aa)} = ads$, y $S.ads = as = S.dy \sqrt{(yy + aa)}$, cuya equacion nos está diciendo que la rectificacion de la parábola pende de la quadratura de la hypérbola.

Supongamos que la parábola propuesta sea NAM , en cuyo vértice sea tangente la AQ ; si llamamos AP, y , será $as = S.dy \sqrt{(y^2 + a^2)}$. Tiremos á la AP la perpendicular $AA' = a$, y tracemos una hypérbola equilátera $N'A'P'$, cuyo centro esté en A , y el vértice en A' . Desde el punto P tirémosle á la parábola la ordenada PM , prolongándola hasta que encuentre la hypérbola en P' ; será $AA'P'P$

$\equiv S.dy\sqrt{y^2 + a^2}$; luego $as \equiv AA'P'P$; por consiguiente el arco AM de la parábola será igual al espacio hyperbólico $AA'P'P$ dividido por la mitad del parámetro. Fig.

588 Cuestion II. Rectificar la segunda parábola cúbica, cuya equacion es $y^3 \equiv ax^2$.

De la equacion de la curva inferiremos que $x^2 \equiv \frac{y^3}{a}$,
 y $x \equiv \frac{y^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}}$; luego $dx \equiv \frac{\frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}}dy}{a^{\frac{1}{2}}}$; y $dx^2 \equiv \frac{9}{4} \frac{ydy^2}{a}$;

por consiguiente $\sqrt{dx^2 + dy^2} \equiv \sqrt{dy^2 + \frac{9}{4a}ydy^2} \equiv dy\sqrt{1 + \frac{9y}{4a}}$ (II. 62). Esta cantidad es facil de integrar por lo dicho (509) por ser el esponente de y fuera del binomio una unidad menor que en el binomio; porque no habiendo y fuera del radical es lo mismo que si hubiera y^0 . Será, pues, $S.dy\sqrt{1 + \frac{9y}{4a}}$, ó $S.dy(1 + \frac{9y}{4a})^{\frac{1}{2}}$
 $\equiv \frac{dy(1 + \frac{9y}{4a})^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2} \cdot \frac{9dy}{4a}} + C \equiv \frac{8a}{27} (1 + \frac{9y}{4a})^{\frac{3}{2}} + C$.

Para determinar la constante C , hemos de considerar 229, que si queremos contar los arcos AM desde el punto A origen de las y , será preciso que la integral ó el valor del arco AM sea cero quando fuere $y \equiv 0$. Pero en este supuesto la integral queda reducida á $\frac{8a}{27} (1)^{\frac{3}{2}} + C$, ó $\frac{8a}{27} + C$; luego la longitud de un arco qualquiera AM cuyo origen esté en A , será $\frac{8a}{27} (1 + \frac{9y}{4a})^{\frac{3}{2}} - \frac{8a}{27}$.

589 Cuestion III. Rectificar el círculo.

232.

Buscaremos primero la longitud de un arco de círculo AM por medio de su seno verso AP .

Su-

Fig.

Supondremos para el intento el arco Mm infinitamente pequeño; si tiramos pm paralela á PM , y Mr paralela á AP , y el radio CM , resultarán dos triángulos semejantes CPM , Mrm , que darán $PM : CM :: Mr : Mm$. Si llamamos AP , x ; el diámetro AB , a ó 1 para calcular con mas facilidad, tendremos $Mr = dx$; $CM = \frac{1}{2}$, y $PM = \sqrt{(x - xx)}$. Luego $\sqrt{(x - xx)} : \frac{1}{2} :: dx : Mm$; luego $Mm = \frac{\frac{1}{2}dx}{\sqrt{(x - xx)}}$, y por consiguiente $AM = S. \frac{\frac{1}{2}dx}{\sqrt{(x - xx)}}$.

Como esta cantidad no se puede integrar sin transformarla en serie, lo egecutaremos; pero primero la daremos esta forma $S. \frac{\frac{1}{2}dx}{x^{\frac{1}{2}} \sqrt{(1 - x)}} = S. \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} dx (1 - x)^{-\frac{1}{2}}$ (II. 91).

Y como $(1 - x)^{-\frac{1}{2}}$ transformada en serie $= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \&c$ (II. 101); será $S. \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} dx (1 - x)^{-\frac{1}{2}} = S. \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} dx (1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \&c.) = S. (\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} dx + \frac{1}{4}x^{\frac{1}{2}} dx + \frac{3}{16}x^{\frac{3}{2}} dx + \frac{5}{32}x^{\frac{5}{2}} dx + \&c) = \frac{\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{4}x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + \frac{\frac{3}{16}x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + \frac{\frac{5}{32}x^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}} + \&c. = x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{6}x^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{40}x^{\frac{5}{2}} + \frac{5}{112}x^{\frac{7}{2}} + \&c.$ á cuya integral no hay que añadir constante alguna, porque quando $x = 0$, tambien será cero la integral, y así debe ser, pues entonces es nulo el arco AM que representa.

Por razon del multiplicador comun $x^{\frac{1}{2}}$, se la puede dar á la serie que espresa el arco AM , la forma siguiente $x^{\frac{1}{2}} (1 + \frac{1}{6}x + \frac{3}{40}x^2 + \frac{5}{112}x^3 + \&c)$. Si consideramos que el seno verso x , es siempre menor que el diámetro 1 ,

ex-

excepto quando el arco es igual á la semicircunferencia, Fig. x será siempre un quebrado ; por consiguiente los valores de los términos de la serie irán menguando tanto mas, quanto menor fuese el seno verso del arco cuya longitud se buscáre. Así, si quisiéramos averiguar quanto coge un arco, cuyo seno verso es la centésima parte del diámetro , sería $x = \frac{1}{100} = 0,01$, y por tanto $x^{\frac{1}{2}} = 0,1$, sería , pues, el valor de dicho arco $= 0,1 \times \left(1 + \frac{0,01}{6} + \frac{3(0,01)^2}{40} + \frac{5(0,01)^3}{112} \right)$, y como el término siguiente de esta serie sería por lo menos cien veces menor que el último que vá puesto , por ser cada uno mas de cien veces menor que su antecedente inmediato , considerando el valor de $\frac{5}{112} (0,01)^3$, y tomando su centésima parte , podremos formar juicio de lo mucho que nos acercaremos al verdadero valor del expresado arco con calcular no mas que los quatro primeros términos de la serie. Pero $\frac{5}{112} (0,01)^3$ es lo propio que $\frac{5}{112} (0,000001) = \frac{0,000005}{112} = 0,0000000446$, cuya centésima parte es $0,00000000446$; por consiguiente podemos valuar con seguridad cada término de la serie hasta diez decimales , sin temor de que el valor que resultare del arco, discrepe de una unidad en la novena decimal. Luego será $\frac{5}{112} (0,01)^3 = 0,0000000446$; $\frac{3}{40} (0,01)^2 = 0,0000075000$; $\frac{0,01}{6} = 0,0016666666$; por consiguiente el total de la serie será $0,1(1,0016742112)$, ó finalmente $0,100167421$, ciñéndonos á nueve decimales.

Este es el valor del arco , cuyo seno verso fuese la
cen-

Fig. centésima parte del diámetro. Luego si supiéramos el número de veces que los grados que coge dicho arco, caben en 360° , con multiplicar la longitud del arco por dicho número de veces sacaríamos su longitud aproximada. Pero esto es cabalmente lo que no sabemos.

Como sabemos (I. 642) que el seno de 30° es la mitad del radio, y que en conociendo el seno de un arco es facil hallar su seno verso (I. 641), podríamos calcular el seno verso de 30° , y substituirle en lugar de x en la serie hallada, y multiplicando el resultado por 12 que espresa quantas veces 30° caben en 360° , sacaríamos por aproximacion lo que coge de largo la circunferencia. Pero convergeria muy poco la serie, y sería preciso calcular muchos de sus términos para sacar un valor bastante aproximado de la circunferencia. Por lo mismo enseñaremos otro camino por donde llegaremos mas pronto al término que deseamos.

590 Hemos visto que si llamamos x la tangente de un arco, y a el radio, será $\frac{a dx}{aa+xx}$ el elemento de dicho arco, cuyo valor será $S. \frac{a dx}{aa+xx}$. Como no se puede integrar cabalmente esta diferencial, es preciso acudir á la aproximacion, para cuyo fin la daremos esta forma: $S. a dx (aa+xx)^{-1}$, y como (I. 101) $(aa+xx)^{-1} = a^{-2} (1 - \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^4}{a^4} - \frac{x^6}{a^6} + \frac{x^8}{a^8} - \&c.)$, será $S. a dx (aa+xx)^{-1} = S. (dx - \frac{x^2 dx}{aa} + \frac{x^4 dx}{a^4} - \frac{x^6 dx}{a^6} + \frac{x^8 dx}{a^8} - \&c.) = x - \frac{x^3}{3a^2} + \frac{x^5}{5a^4} - \frac{x^7}{7a^6} + \frac{x^9}{9a^8} - \&c.) = x(1 - \frac{x^2}{3a^2} + \frac{x^4}{5a^4} - \frac{x^6}{7a^6} + \frac{x^8}{9a^8} - \&c.)$.

Ya no nos falta sino saber si hay algun arco que que-

pa

pa un número determinado de veces en la circunferencia, Fig. y tenga una tangente conocida. Concorre esta circunstancia en el arco de 45° que cabe 8 veces en la circunferencia, y tiene su tangente $= 1$ (I. 643). Luego haremos $x = a$, y la longitud de un arco de 45° será la que espresa esta serie $a(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \&c)$. Pero como los términos de esta serie menguan con suma lentitud, hemos de ver si se puede resolver el arco de 45° en otros dos, cuyas tangentes sean conocidas. No le hace el que no sepamos quantos grados coge cada uno de estos arcos, con tal que formen juntos 45° : quando hubiésemos calculado sus longitudes por medio de sus tangentes, las sumaremos una con otra, y sacaremos la del arco de 45° . Como cada uno de estos arcos ha de valer menos de 45° , sus tangentes serán menores que el radio, y será por lo mismo la serie mas convergente, y menos trabajosa de calcular.

Para hallar estos dos arcos, recurriremos á lo que dejamos dicho (I. 408). Con efecto, ya sabemos que $\text{tang}(a+b) = \frac{\text{tang } a + \text{tang } b}{1 - \text{tang } a \text{ tang } b}$, siendo a y b dos arcos cualesquiera, y suponiendo que el radio $= 1$. Luego si suponemos $a+b = 45^\circ$, en cuyo caso será $\text{tang}(a+b) = 1$, sacaremos $\frac{\text{tang } a + \text{tang } b}{1 - \text{tang } a \text{ tang } b} = 1$, y resolviendo esta equacion por las reglas ordinarias del Álgebra, $\text{tang } b = \frac{1 - \text{tang } a}{1 + \text{tang } a}$. Hagamos, pues, $\text{tang } a = \frac{1}{2}$, y resultará $\text{tang } b = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$.

Ya

Fig. Ya no nos falta sino calcular por medio de la serie que hemos dado mas arriba, la longitud del arco cuya tangente x es $\frac{a}{2}$ ó la mitad del radio ; y la longitud del arco cuya tangente x es $\frac{a}{3}$; la suma de estas dos longitudes formará la del arco de 45° . Substituyendo en lugar de x , $\frac{a}{2}$, y despues $\frac{a}{3}$, resultará $\frac{a}{2} (1 - \frac{1}{3 \cdot 2^2} + \frac{1}{5 \cdot 2^4} - \frac{1}{7 \cdot 2^6} + \frac{1}{9 \cdot 2^8} - \frac{1}{11 \cdot 2^{10}} + \frac{1}{13 \cdot 2^{12}} \&c.)$, y $\frac{a}{3} (1 - \frac{1}{3 \cdot 3^2} + \frac{1}{5 \cdot 3^4} - \frac{1}{7 \cdot 3^6} + \frac{1}{9 \cdot 3^8} - \frac{1}{11 \cdot 3^{10}} + \frac{1}{13 \cdot 3^{12}} \&c.)$.

Para sacar las espresiones exacras hasta nueve decimales de los valores de estos arcos , deberíamos calcular los 15 primeros términos del primero, y los 10 primeros términos no mas del segundo , cuyo cálculo es sumamente facil , si se atiende á que en el primero se pueden calcular consecutivamente los términos , formando primero una serie que tenga cada uno de sus términos igual al que le precede multiplicado por $\frac{1}{2^2}$, esto es, igual á $\frac{1}{4}$ de su precedente ; multiplicando despues los términos de dicha serie, por los de la serie $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9} \&c.$ cada uno por el suyo ; y finalmente juntando unos con otros los términos de número par , y los de número impar tambien unos con otros , se restará la suma de estos últimos de la de los primeros, y se multiplicará el residuo por $\frac{a}{2}$. El cálculo de la segunda serie se reduce á formar una serie , tal que cada uno de sus términos se componga del precedente multiplicado por $\frac{1}{3^2}$ ó por $\frac{1}{9}$, esto es , que sea $\frac{1}{9}$ del que le precede ; se multiplicará despues cada término de dicha serie por cada uno de los de la serie $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9} \&c.$ res-

pec-

pectivamente, y se proseguirá del mismo modo que quan- Fig.
 do se calculó la primera serie; pero en lugar de multipli-
 car como antes por $\frac{a}{2}$, se habrá de multiplicar ahora por
 $\frac{a}{3}$. Si executamos la operacion continuando la aproximación
 hasta 10 decimales, el valor de la primera serie será
 $\frac{a}{2}(0,9272952180)$, ó $a(0,4636476090)$; y el de la
 segunda será $\frac{a}{3}(0,9652516632)$, ó $a(0,3217505544)$;
 luego el arco de 45° , que es la suma de los dos, será
 $a(0,7853981634)$. Para sacar la semicircunferencia,
 se tomará el quádruplo de este valor, y resultará
 $a(3,1415926536)$; luego el radio es á la semicircun-
 ferencia, ó el diámetro es á la circunferencia, como a :
 $a(3,1415926536) :: 1 : 3,1415926536$; lo mismo
 que sacamos (II. 424) casi por el mismo camino que
 ahora.

591 Cuestion IV. Rectificar el arco de elipse FM, en 233
 el supuesto de ser $AD = a$, $AF = c$, $AB = x$, $BM = y$,
 $FM = z$.

Por la naturaleza de la curva será $y = \frac{c}{a}\sqrt{(aa-xx)}$,
 luego $dy = \frac{-cx dx}{a\sqrt{(aa-xx)}}$; luego $dz = \sqrt{(dx^2 + dy^2)} =$
 $dx \frac{\sqrt{(a^4 - a^2 x^2 + c^2 x^2)}}{\sqrt{(a^4 - a^2 x^2)}} =$ (con dividir arriba y abaxo por aa ,
 y hacer $\frac{aa-cc}{aa} = m$) $dx \frac{\sqrt{(aa-mxx)}}{\sqrt{(aa-xx)}} = dx \frac{\sqrt{[a^2-mxx(aa-xx)]}}{aa-xx} =$
 $dx + \frac{1-m}{2aa} x^2 dx + \frac{3-2m-mm}{8a^4} x^4 dx + \&c$. Por consiguiente
 $z = x + \frac{1-m}{6aa} x^3 + \frac{3-2m-mm}{40a^4} x^5 + \frac{5-3m-mm-m^3}{112a^6} x^7 + \&c$.
 $= FM$.

592 Cuestion V. Rectificar el arco FM de hypér- 234
 bola.

Con-

Fig. Considerarémos AB como la mitad de un primer diámetro, y la llamaremos a ; llamaremos c la mitad AF de su conjugado; AP , x ; PM , y ; FM , z . La equacion de la curva dará $y = \sqrt{cc + \frac{cx}{a}}$, $dy = \frac{cx dx}{\sqrt{(a^2 + a^2 x^2)}}$, $\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \sqrt{(dx^2 + \frac{c^2 x^2 dx^2}{a^2 + a^2 x^2})} = dx \frac{\sqrt{(a^2 + a^2 x^2 + c^2 x^2)}}{\sqrt{(a^2 + a^2 x^2)}}$ $= dx \frac{\sqrt{(aa + mxx)}}{\sqrt{(aa + xx)}}$, con dividir arriba y abaxo por aa , y hacer $\frac{aa + cc}{aa} = m$. Luego $dz = dx \frac{\sqrt{(aa + mxx)}}{\sqrt{(aa + xx)}} = dx \frac{\sqrt{[(aa + mxx)(aa + xx)]}}{aa + xx} = dx \left(1 - \frac{1-m}{2aa} x^2 + \frac{3-2m-m^2}{8a^4} x^4 - \frac{5-3m-m^2-m^3}{16a^6} x^6 + \&c. \right)$, y por consiguiente $z = x - \frac{1-m}{6aa} x^3 + \frac{3-2m-mm}{16a^4} x^5 - \frac{5-3m-m^2-m^3}{112a^6} x^7 + \&c. = FM$.

593 Cuestion VI. Rectificar la espiral de Arquimedes.

235

Si llamamos a el radio del círculo $ABFG$, el arco $AGFBN$, x ; la circunferencia entera, c ; la ordenada CM , y ; y tiramos el radio Cn infinitamente próximo á CN , será (366) $x = \frac{cy}{a}$; $Nn = dx$; los triángulos semejantes CNn , CMr darán $Mr = \frac{y dx}{a}$; será, pues, $Mm = d(COM) = \sqrt{(dy^2 + \frac{y^2 dx^2}{a^2})}$, y substituyendo en lugar de dx^2 su valor $\frac{c^2 dy^2}{a^2}$ sacado de $\frac{cy}{a} = x$, sacaremos $\sqrt{(dy^2 + \frac{c^2 y^2 dy^2}{a^4})} = dy \sqrt{(1 + \frac{c^2 y^2}{a^4})} = dy \frac{\sqrt{(a^4 + c^2 y^2)}}{\sqrt{a^4}} = \frac{dy}{a^2} \sqrt{(a^4 + c^2 y^2)} = \frac{c}{a^2} dy \sqrt{(y^2 + \frac{a^4}{c^2})}$. Luego $COM = \frac{c}{a^2} \times S.dy \sqrt{(yy + \frac{a^4}{c^2})}$. Pero hemos visto (587) que esta diferencial es el elemento de un arco de parábola cuya abscisa es y , y el parámetro es igual al duplo de la raíz quadrada de la cantidad constante que está debaxo del radical; luego se reduce la rectificacion de la espiral á la de la parábola.

Por

Por consiguiente trazaremos en el caso actual una parábola Fig. CN' cuyo parámetro $= \frac{2a^2}{c}$; haciendo $CQ = CM$, y tirando la ordenada QN , será $CN' = \frac{c}{a^2} S. dy \sqrt{\left(\frac{a^4}{c^2} + xy\right)}$. Luego $CN' = COM$.

594 Cuestión VII. Rectificar la cycloide, ó hallar 228. el valor de un arco AD.

Llamaremos AF , x ; FD , y ; AE , a ; FC , u ; el arco AC , s ; será (369) $y = s + u$. Por la naturaleza del círculo $uu = ax - xx$, $du = \frac{adx - 2x dx}{2u}$, y $ds = \frac{adx}{2u}$ (589); por consiguiente $dy = ds + du = \frac{a-x}{u} dx$; de donde sale $\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = dx \sqrt{\left(1 + \frac{(a-x)^2}{uu}\right)} = \frac{dx}{u} \sqrt{(aa - xx)} = dx \times \frac{\sqrt{(aa - xx)}}{\sqrt{(ax - xx)}} = dx \sqrt{\frac{a}{x}}$, cuya integral es $2\sqrt{ax} = 2$ cuerda AC (I. 463).

Usos del cálculo integral para medir la solidez de los cuerpos.

595 Para medir la solidez de los cuerpos, podemos suponer que se componen de rebanadas infinitamente delgadas y paralelas unas á otras, ó de una infinidad de pirámides, cuyos vértices se juntan todos en un punto comun. Quando se consideran como formados de rebanadas infinitamente delgadas y paralelas, la diferencia de las dos superficies opuestas que terminan cada rebanada, es infinitamente pequeña, y por lo mismo se debe omitir en los cálculos, si queremos dar á entender que dicha rebanada es infinitamente delgada. De donde resulta que su solidez se ha de espresar por el producto de la una de

Fig. sus dos bases opuestas por su altura infinitamente pequeña.

236. Por ejemplo, si imaginamos que la pirámide $SABC$ se compone de rebanadas como $abcfeg$ infinitamente delgadas, pondremos espresar la solidez de dicha rebanada por el producto de la superficie abc , ó de la superficie gef por el grueso de la rebanada.

237. Si consideramos el sólido de revolucion engendrado por la rotacion de la curva AM al rededor de la recta AP , como compuesto de rebanadas paralelas é infinitamente delgadas; habremos de espresar la medida de cada rebanada por el producto de la superficie del círculo cuyo radio es PM , por el grueso Pp .

596 Sentado este principio, declaremos como se podrá valuar la solidez de los cuerpos. Consideraremos cada rebanada como la diferencial del sólido, porque en la realidad $MmLL = AmlA - AMLA = d(AMLA)$; y despues de determinada la espresion algebraíca de dicha rebanada, se integrará.

236. Supongamos, por ejemplo, que queramos medir la pirámide $SABC$. Supondremos que la superficie ABC de su base es igual á la cantidad conocida bb , y su abscisa $ST = a$; llamaremos x la distancia St de una rebanada qualquiera, y será dx la diferencia de dicha rebanada. Por lo que mira á la superficie abc , la sacaremos (I. 554) de esta proporcion: $(ST)^2 : (St)^2 :: ABC : abc$; esto es, $aa : xx :: bb : abc = \frac{bbxx}{aa}$; por consiguiente la solidez de la rebanada será $\frac{bbxxdx}{aa}$, cuya integral es $\frac{bbx^2}{3aa} + C$, ó solamente

te $\frac{bbx^2}{3aa}$, si contamos la solidez desde el vértice *S*. Esta cantidad que representa la solidez de la porcion piramidal qualquiera *Sabc*, es lo mismo que $\frac{bbxx}{aa} \times \frac{x}{3}$, que no se distingue de $abc \times \frac{Sx}{3}$, cuyo resultado concuerda con el que sacamos tiempos há (I. 603).

597 En orden á los sólidos de revolucion, se puede sacar una fórmula general que represente la rebanada elemental ó diferencial. Imaginemos, pongo por caso, que *r : c* señale la razon que hay entre el radio, y la circunferencia; la circunferencia cuyo radio es *PM* ó *y* la sacaremos de esta proporcion *r : c :: y : $\frac{cy}{r}$* ; si multiplicamos este valor $\frac{cy}{r}$ de la circunferencia cuyo radio es *PM*, por $\frac{1}{2}y$ mitad del radio, será $\frac{cy^2}{2r}$ la superficie, cuyo producto por el grueso *Pp* ó *dx* es $\frac{cy^2 dx}{2r}$, que es la espresion del elemento de la solidez de todo el sólido de revolucion. Y como en el supuesto de ser *r : c* la razon entre el radio, y la circunferencia, ha de ser (II. 232) $\frac{c}{2r}$ la area del círculo cuyo radio = 1; si llamamos *p* esta area, y substituímos *p* en la fórmula en lugar de $\frac{c}{2r}$, se transformará en *pyydx*. De donde inferiremos que en el supuesto de ser *p* la area del círculo cuyo radio = 1, será *pyy* la area de un círculo cuyo radio = *y*, pues $1^2 : y^2 :: p : pyy$; porque son las areas de las figuras semejantes como los quadrados de sus lados homólogos. Para aplicar esta fórmula á los casos particulares, se substituirá en lugar de *y* su valor en *x* sacado de la equacion de la curva generatriz *AM*, y se integrará.

Fig. 598 Cuestion I. Hallar la solidez del cono engendra-
do por el triángulo rectángulo ABD , dando la vuelta al
rededor del lado AB .

Llamemos AB , x ; BD , y ; y ϕ el ángulo BAD . Si
tomamos AD por radio, tendremos $\cos \phi : \sin \phi :: x : y$

$$= \frac{x \sin \phi}{\cos \phi}, \text{ y por consiguiente } yy = \frac{(\sin \phi)^2}{(\cos \phi)^2} xx. \text{ Luego}$$

$$\text{el cono espresado será} = \frac{c}{2r} S. \frac{\sin^2 \phi}{\cos^2 \phi} x^2 dx = \frac{c}{2r} \cdot \frac{\sin^2 \phi}{\cos^2 \phi} \frac{x^3}{3}$$

$$= \frac{c}{2r} \frac{xy^2}{3}, \text{ que segun sabemos es la tercera parte del cí-}$$

lindro que tiene una misma base y altura que él.

Por el mismo camino sacaríamos que el cono engen-
drado por el mismo triángulo dando la vuelta al rededor
del lado ó ege AC , sería $= \frac{c}{2r} \cdot \frac{x^2 y}{3}$. Luego el primer co-
no será á el segundo $:: y : x :: \sin \phi : \cos \phi$. De donde
sacaremos la respuesta á la siguiente pregunta:

*¿Qué se ha de hacer para hallar dos conos tales, que
la altura del uno sea igual al radio de la base del otro, y
sean uno con otro en razon dada? Para esto se dividirá el
ángulo recto CAB de modo que el seno del ángulo BAD
sea al seno del ángulo CAD en la razon dada; y tirando
desde un punto qualquiera D las ordenadas DB , DC , los
dos conos engendrados el uno del triángulo ADB que dá
la vuelta al rededor de AB , y el otro del triángulo ADC
al rededor de AC , serán los que se piden.*

599 Cuestion II. Hallar la solidez de un conoide
parabólico, ó de un paraboloides.

Llámanse *Conoide* en general todo cuerpo formado por la revolucion de la area de alguna de las tres secciones cónicas al rededor del ege , de la ordenada , ó de la tangente de dicha seccion. Quando el sólido resulta de la revolucion de una semiparábola al rededor de su ege , el sólido se llama *Conoide parabólico* , ó *Paraboloide* ; *Conoide elíptico* , ó *Elipsoide* , si se origina de la revolucion de una semiellipse al rededor del uno de sus eges ; quando la area elíptica dá la vuelta al rededor del ege mayor de la curva , engendra el *Elipsoide prolongado* , y si dá la vuelta al rededor del ege menor , engendra el *Elipsoide aplanado*. El elipsoide , sea el que fuere , se llama tambien *Esferoide*. Finalmente quando el sólido resulta de la revolucion de una area hyperbólica al rededor del uno de sus eges , se llama *Conoide hyperbólico* , ó *Hyperboloide*. Sentado esto, busquemos la solidez del paraboloide.

Como la equacion de la parábola es $yy = ax$, la fórmula $\frac{cyydx}{2r}$ se transformará en $\frac{caxdx}{2r}$; cuya integral es $\frac{cax^2}{4r} + C$, ó $\frac{cax}{2r} \times \frac{x}{2} + C$, ó con substituir en lugar de ax su valor yy , $\frac{cyy}{2r} \times \frac{x}{2} + C$. Si queremos apreciar la solidez del paraboloide desde el punto A , como en este supuesto el sólido es cero , quando x es cero , la constante C ha de ser cero , y la solidez se reduce á $\frac{cyy}{2r} \times \frac{x}{2}$; pero $\frac{cyy}{2r}$ expresa la superficie del círculo , cuyo radio sería PM , ó la base del paraboloide $AMLA$; luego el paraboloide es la mitad del producto de su base por su altura x ; luego es la mitad del cilindro de igual base y altura que él.

Fig. Si quisiéramos contar la solidez desde un punto dado K , tal que $AK = e$; como en este supuesto sería cero la solidez en el punto K , esto es, quando $x = e$, la integral general ha de ser cero en este caso, quiero decir que $\frac{cax^2}{4r} + C$, que será $\frac{cae^2}{4r} + C$, ha de ser cero; luego $\frac{cae^2}{4r} + C = 0$, y $C = -\frac{cae^2}{4r}$; luego la solidez de una porcion de paraboloide comprendida entre dos planos paralelos, que están respectivamente á las distancias x y e del vértice, es $\frac{cax^2}{4r} - \frac{cae^2}{4r}$.

239. 600 Cuestion III. Hallar la solidez del elipsoide prolongado, formado por la revolucion de la elipse al rededor de su ege mayor.

Si llamamos el ege mayor AB , a ; el menor CD , b ; AP , x ; PM , y , la equation de la elipse será $yy = \frac{bb}{aa}(ax - xx)$. Por consiguiente la fórmula $\frac{cy \cdot dx}{2r}$ se transformará en $\frac{cbb}{2raa} dx (ax - xx)$, ó $\frac{cbb}{2raa} (axdx - xxdx)$, cuya integral es $\frac{cbb}{2raa} \left(\frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) + C$, ó solamente $\frac{cbb}{2raa} \left(\frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right)$, si contamos la solidez desde el punto A .

Para sacar la solidez de todo el esferoide, haremos $x = AB = a$, y resultará $\frac{cbb}{2raa} \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} \right)$ que se reduce á $\frac{cabb}{12r} = \frac{cbb}{4r} \times \frac{1}{3}a$, ó á $\frac{cbb}{8r} \times \frac{2}{3}a$; pero $\frac{cbb}{8r}$ espresa la superficie del círculo, cuyo diámetro es $b = CD$, y por lo mismo $\frac{cbb}{8r} \times a$ es la solidez del cilindro circunscripto al elipsoide; luego una vez que, segun hemos hallado, la solidez del elipsoide es $\frac{cbb}{8r} \times \frac{2}{3}a$, hemos de inferir que la solidez del elipsoide es los $\frac{2}{3}$ del cilindro circunscripto. Y como la esfera es lo mismo que un elipsoide cuyos dos eges son

son iguales , será tambien la esfera los $\frac{2}{3}$ del cilindro cir- Fig.
cunscripto.

601 Por el mismo camino hallaríamos que el elip-
soide aplanado es los $\frac{2}{3}$ del cilindro circunscripto ; quiero
decir , que en el supuesto de ser a y b los eges mayor y
menor de la ellipse generatriz , la solidez del esferoide apla-
nado será $\frac{caab}{12r}$; por consiguiente el esferoide prolongado es
al aplanado :: $\frac{cabb}{12r} : \frac{caab}{12r} :: b : a ::$ como el ege menor es al
mayor.

602 Si en lo dicho (600) hubiéramos contado
la solidez desde un punto determinado K , tal que $AK=e$,
hubiéramos tomado la integral general $\frac{cbb}{2raa} \left(\frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) + C$;
y como la solidez hubiera empezado desde el punto K , di-
cha integral sería cero en dicho punto , esto es , quando
 $x=e$. Pero entonces se transforma en $\frac{cbb}{2raa} \left(\frac{ae^2}{2} - \frac{e^3}{3} \right) + C$;
luego $\frac{cbb}{2raa} \left(\frac{ae^2}{2} - \frac{e^3}{3} \right) + C = 0$; y por consiguiente $C =$
 $-\frac{cbb}{2raa} \left(\frac{ae^2}{2} - \frac{e^3}{3} \right)$, y por consiguiente la espresion de la
solidez contada desde el punto K es $\frac{cbb}{2raa} \left(\frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) -$
 $\frac{cbb}{2raa} \left(\frac{ae^2}{2} - \frac{e^3}{3} \right)$. Esta es la espresion de una rebanada de es-
feroide comprendida entre dos planos paralelos , perpen-
diculares al ege , entre los quales hay la distancia $x-e$.

603 Cuestion IV. Hallar la solidez del hyperbo- 240.
loide MAm engendrado por la hypérbola dando la vuelta al
rededor de su primer ege.

Llamemos a el primer ege de la curva ; b , el segundo;
 AP , x ; PM , y . Su equacion será $yy = \frac{bh}{aa} (ax + xx)$, y
 $pyydx$ será $\frac{pbhdx}{aa} \times (ax + xx)$, cuya integral es $\frac{pbhxx}{2aa} + \frac{pbhx^3}{3aa}$,

Ee 4. que

Fig. que con substituir el valor de bb sacado de la equacion de la curva, se reduce á $\frac{3ax+2xx}{6a+6x} \times ppy = \frac{3a+2x}{6a+6x} \times x \times ppy$; será, pues, la solidez el producto de $\frac{3a+2x}{6a+6x}$ por la altura x , y por su base (597) ppy .

De donde inferiremos que quando $x = 0$, el sólido será $= \frac{1}{2}$ base $\times$ por la altura, y si x fuese infinita, el el hyperboloide será $= \frac{1}{3}$ base $\times$ la altura; y que por consiguiente tiene un medio entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$ del cilindro circunscrito, y será como unos $\frac{5}{12}$ de él.


604 Cuestion V. Hallar la solidez del hyperboloide engendrado por la hypérbola, dando la vuelta al rededor de su segundo ege.

Sea CM la hypérbola generatriz, cuyo centro está en A , y llamemos AC , b ; su semiconjugado, a ; AP , x ; PM , y . La propiedad de la curva dará $yy = bb + \frac{bbxx}{aa}$. Luego $pyydx$ será $= pbbdx + \frac{pbbx^2dx}{aa}$, cuya integral $pbbx + \frac{pbb}{3aa}x^3 = \frac{2}{3}pbbx + \frac{1}{3}pyyx$, despues de substituido en lugar de $\frac{bb}{aa}xx$ su valor $yy - bb$ sacado de la equacion de la curva. Es, pues, $\frac{2}{3}pbbx + \frac{1}{3}pyyx$ la solidez del cuerpo que forma la area $CAPM$ al tiempo de dar la curva una vuelta.

242. 605 Cuestion VI. Hallar el sólido formado por la revolucion de una hypérbola equilátera al rededor de su asýmtota.

Sea MGN la hypérbola; AM , AN sus asýmtotas. Para hallar el valor del sólido engendrado por la area $GFDB$ dando la vuelta al rededor de AB , llamaremos $AF = FG$,

x ,



x , y será (171) $aa = xy$, ó $yy = \frac{a^4}{x^2}$; cuyo valor Fig. substituido en $\frac{c}{2r} S. y^2 dx$ dará $\frac{c}{2r} S. \frac{a^4 dx}{x^2}$. Y como la integral de $\frac{a^4 dx}{x^2}$ ó $a^4 x^{-2} dx$ es $-\frac{a^4}{x} + C$, será la espresion del hyperboloide que buscamos $\frac{c}{2r} \times (C - \frac{a^4}{x})$. El valor de la constante C le hallaremos con suponer que el sólido es nulo quando $x = 0$, en cuyo supuesto $C = a^3$; luego el valor cabal del sólido será $\frac{c}{2r} (a^3 - \frac{a^4}{x}) = \frac{c}{2r} (a^3 \cdot \frac{(x-a)}{x})$; de cuya fórmula inferiremos que si crecieren las abscisas en progresion arismética, de modo que sean a , $2a$, $3a$ &c. resultarán sólidos iguales á $\frac{c}{2r} a^3$, multiplicados succesivamente por 0 , $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ &c. Si fuese x infinita, el sólido será $\frac{c}{2r} a^3$, igual al cilindro engendrado en la misma revolucion por el rectángulo $AFGC$. Si fuese x menor que a , el sólido será negativo, é infinito si fuese $x = 0$. Por lo que el sólido infinitamente largo engendrado por el espacio GFN es finito, y el que engendra la area $AFGM$ dando la vuelta al rededor de la asíntota AN es infinito.

606 Cuestion VII. Hallar la solidez de un sólido 243. parabólico ACBDA engendrado por la rotacion de una parábola dada ACB al rededor de la ordenada AB.

Llamemos a la abscisa CM de la parábola dada, y b la semiordenada AM ó BM ; y suponiendo que sea ENF una seccion del sólido paralela á DC , llamaremos u la distancia MN ó EP que hay entre la espresada seccion, y la linea CD . Sentado esto, la propiedad de la parábola dá $(AM)^2 : (EP)^2 :: CM : CP$, ó $bb : uu :: a : CP = \frac{auu}{bb}$. Luego $EN = CM - CP = a - \frac{auu}{bb} = \frac{a \times (b^2 - u^2)}{bb}$, y por con-

Fig. consiguiente será $p \times (EN)^2 = \frac{pa^2}{b^+} \times (b^4 - 2bbuu + u^4)$ la espresion de la area de la seccion EF . El producto de esta area por la diferencial du de MN dará $\frac{pa^2}{b^+} (b^4 du - 2b^2 u^2 du + u^4 du)$, que será el elemento del sólido que buscamos. Luego su integral $\frac{pa^2}{b^+} (b^4 u - \frac{2}{3} b^2 u^3 + \frac{1}{5} u^5)$ será el valor de la mitad del sólido quando $u = b$, en cuyo supuesto dicha integral será $\frac{8pa^2b}{15}$.

244. 607 Cuestion VIII. Hallar el valor del sólido ACBDA engendrado por la rotacion del segmento de círculo ACB al rededor de la cuerda ú ordenada AB.

Supongamos que esté el centro en O , y llamemos el radio OE , r ; OM , m ; y EP , u . Será $OP = \sqrt{(OE)^2 - (EP)^2} = \sqrt{(rr - uu)}$, y $EN = OP - OM = \sqrt{(rr - uu)} - m$. Se transformará, pues, en este caso la fórmula general en $pdu(\sqrt{(rr - uu)} - m)^2 = pdu[r^2 - u^2 + m^2 - 2m\sqrt{(r^2 - u^2)}] = pdu(r^2 - u^2 - m^2) - pdu(2m\sqrt{(r^2 - u^2)} - 2m^2)$. La integral de $pdu(2m\sqrt{(r^2 - u^2)} - 2m^2) = 2mp \times du \times [\sqrt{(rr - uu)} - m] = 2mp \times du \times EN$, será $2mp \times \text{area } MNEC$; por consiguiente toda la integral será $pu(r^2 - m^2 - \frac{1}{3}u^2) - 2mp \times \text{area } MNEC$, que es igual á $p \times MN \times [(\overline{AM})^2 - \frac{1}{3}(\overline{MN})^2] - 2p \times OM \times \text{area } MNEC$; que en el supuesto de ser $MN = MA$ es $p \times \frac{2}{3}(\overline{AM})^3 + 2p \times OM \times \text{area } ACM$, y será el valor de la mitad del sólido.

245. 608 Cuestion IX. Hallar la solidez del cuerpo prismoidal, ó del prismoide AEGB, siendo sus quatro lados AH, AF, CH, CF superficies planas, y ADCB, EFGH rectán-

tángulos dados, paralelos el uno al otro.

Fig.

Llamemos AB, a ; AD, b ; EH, c ; EF, e ; la altura perpendicular del sólido, h ; y x , la distancia, considerando como variable, á que está del plano EG una sección IL del sólido hecha con un plano paralelo á la base.

La naturaleza misma de la figura está diciendo que la sección IL es un rectángulo; y que (I.451) $b : x :: AB - EH : IM - EH :: BC - HG : ML - HG$. De cuyas proporciones inferiremos $IM - EH = \frac{(a-c)x}{h}$, y $ML - HG = \frac{(b-e)x}{h}$. Luego $IM = \frac{(a-c)x}{h} + c$, y $ML = \frac{(b-e)x}{h} + e$; y por consiguiente la area del rectángulo $IL = \frac{(a-c) \times (b-e)}{h^2} \times x^2 + \frac{ae - 2ce + cb}{h} x + ce$. Si multiplicamos esta espresion por dx , y sacamos despues la integral, resultará $\frac{(a-c)(b-e)x^3}{3h^2} + \frac{(ae - 2ce + cb)x^2}{2h} + cex$, que será el valor del sólido $IFGL$, que quando $x = b$ se transforma en $\frac{(a-c)(b-e)b^3}{3} + \frac{(ae - 2ce + cb)b^2}{2} + ceb = (2ab + ae + bc + 2ce) \times \frac{1}{6}b = [AB \times AD + EH \times EF + (AB + EH) \times (AD + EF)] \times \frac{1}{6}b$, que es el valor de todo el prismoide.

Si $EF = e$ llegára á ser nula, las lineas EH, FG coincidirían, y los planos $AEHB, DFGC$ formarían un ángulo en la parte superior del sólido, que en este caso tendria la forma de la armadura de un tejado. Su solidez se sacaría muy facilmente, y sería $= (2ab + bc) \times \frac{1}{6}b$, ó $(2AB + EH) \times AD \times \frac{1}{6}b$.

Si fuese $EF = EH$, y $AD = AB$, el sólido sería un trozo de pirámide quadrada, sería su solidez $= (a^2 + ac$

+

Fig. $+ c^2) \times \frac{1}{3} b = ((AB)^2 + AB \times EH + (EH)^2) \times \frac{1}{3} b$; y si supusiéramos $EH = 0$, resultaría la solidez de toda la pirámide cuya base sería $(AB)^2$, y la altura $= b$, y cuya solidez sería $= (AB)^2 \times \frac{1}{3} b$.

609 Cuestion X. *Hallar la solidez del cuerpo llamado Groin.*

Este sólido que los Autores Ingleses llaman *Groin* es de tal configuracion, que todas las secciones paralelas á la base son quadrados, y las dos secciones hechas perpendicularmente á la base por el medio de los lados opuestos son semicírculos. Sea, pues, $cefg$ una seccion paralela á la base, llamemos x la distancia Ab que hay desde el vértice del sólido á dicha seccion; y supongamos que sea $= a$ el radio $AB = BN$ de la seccion circular $ANBMA$ perpendicular á la base. En estos supuestos será $bn = \sqrt{(ax - xx)}$ por la naturaleza del círculo, y el lado del quadrado $cefg$ será $2\sqrt{(2ax - xx)}$, y su area será $4(2ax - xx)$. Será, pues, el elemento de la porcion $cefgA$ del groin $= 4dx(2ax - xx)$, cuya integral será $4ax^2 - \frac{4x^3}{3}$, y espresará el valor de dicha porcion. Luego si hacemos $x = a$, resultará $\frac{(2a)^3}{3}$ que será la espresion de todo el sólido.

Por el mismo camino sacaríamos la solidez del groin, aun quando las secciones perpendiculares al medio de los lados opuestos en lugar de ser semicírculos; fuesen otras curvas cualesquiera, y las secciones paralelas á la base fuesen rectángulos, y no quadrados. Supongamos, por exemplo,

plo, que la una de las dos espresadas secciones sea un círculo, y la otra una parábola, cuyas ordenadas correspondientes á una misma abscisa x sean respectivamente $\sqrt{(px - xx)}$, y $\sqrt{ax}$; en virtud de esto, los lados de la seccion rectangular paralela á la base del groin serán $2\sqrt{(px - xx)}$, y $2\sqrt{ax}$; será, pues, la area de la misma seccion $= 4x\sqrt{(ap - ax)}$, y el elemento del sólido será $4xdx\sqrt{(ap - ax)}$, y su integral (510)

$$\frac{16p^2\sqrt{ap} - a^{\frac{3}{2}} \times (p - x)^{\frac{3}{2}} \times (16p + 24x)}{15}$$

será el valor que se busca.

610 Question XI. Hallar la solidez de la pirámide ó cono ABCD formado con tirar muchas lineas rectas desde todos los puntos de un plano dado BDC á un punto dado A fuera de dicho plano. 247

Sea EFG una seccion paralela á BDC; llamemos x la distancia perpendicular AQ á que está dicha seccion del vértice A; a , la altura dada AP del sólido; y b la area de la base BDC que suponemos dada.

Por lo dicho (I. 551) es constante que los dos planos BDC, EFG son semejantes; y como las figuras semejantes tienen unas con otras la misma razon que los cuadrados de sus lados homólogos, será $(AP)^2 : (AQ)^2 :: BDC : EFG$, ó $a^2 : x^2 :: b : EFG = \frac{bx^2}{a^2}$, cuya espresion multiplicada por dx diferencial de la altura AQ ó $\frac{bx^2 dx}{a^2}$, será el elemento del sólido $AEGF = S. \frac{bx^2 dx}{a^2} = \frac{bx^3}{3a^2} = \frac{ab}{3}$ quando $x = a$; será, pues, $\frac{ab}{3}$ la solidez del sólido propuesto.

Cues-

Fig. 611 Cuestion XII. Hallar la solidez de una úngula cilíndrica.

Llamamos *Úngula cilíndrica* el sólido *ADBE* que resulta de cortar un cilindro con un plano obliquo respecto
1248. de su base, y que para escusar complicaciones supondremos que pasa por el centro de dicha base.

Si imaginamos la úngula cortada por planos paralelos infinitamente inmediatos unos á otros, y perpendiculares á la base *AEB*, las secciones serán triángulos semejantes cuyas superficies estarán en razon de los quadrados de sus lados homólogos. Por consiguiente, si llamamos *r* el radio *CE* de la base; *a*, la altura *DE*; é *y*, la base *PM* del triángulo *PMN*, tendremos $CED : PMN :: rr : yy$; pero $CED = \frac{ar}{2}$; luego $PMN = \frac{ary}{2r} = \frac{ayy}{2r}$. Luego si llamamos *AP*, *x*, será *dx* el grueso de la rebanada comprendida entre dos planos paralelos, y será $\frac{ayydx}{2r}$ su valor. Como *y* es la ordenada del círculo que sirve de base, y es $yy = 2rx - xx$, la rebanada elemental será $\frac{adx(2rx - xx)}{2r}$ ó $\frac{a}{2r}(2rxdx - xxdx)$, cuya integral, contando desde el punto *A*, es $\frac{a}{2r}(rx^2 - \frac{x^3}{3})$. Por consiguiente sacaremos el valor de todo el sólido con hacer $x = 2r$, y resultará $\frac{a}{2r}(4r^3 - \frac{8r^3}{3})$, ó $\frac{2}{3}ar^2$, ó $\frac{ar}{2} \times \frac{4}{3}r$, ó $CED \times \frac{4}{3}AC$, ó finalmente $CED \times \frac{2}{3}AB$; quiero decir, los dos tercios del prisma cuya base sería el triángulo *CED*, y la altura el diámetro *AB*.

1249. 612 Cuestion XIII. Hallar la solidez de una úngula cónica *EFGC*, cortada en el cono *ABC* por un plano *EFG* que pasa por su base.

Sea

Sea AD la altura perpendicular del cono ; tiremos Fig. la AM perpendicular á HE , que es el ege de la seccion FEG , y sea FAG otra seccion del cono hecha por un plano que pasa por el vértice A , y la linea FG .

Esto supuesto, los dos sólidos $CAFG$, $EAFG$, cuyas bases son respectivamente FCG y FEG , serán en virtud de lo que acabamos de probar (611) respectivamente $FCG \times \frac{1}{3}AD$, y $FEG \times \frac{1}{3}AM$; restando el segundo del primero su diferencia $\frac{FCG \times AD - FEG \times AM}{3}$ será el valor de la úngula $CEFG$.

Si las bases FCG y FEG fuesen secciones cónicas, se sacarían sus areas por lo dicho (570 , 577 y 578), y se resolveria la cuestion. Supongamos , por egemplo , que sea EH paralela á AB , la seccion FEG será (215) una parábola , cuya area es (570) $\frac{2}{3} \times FG \times EH$; luego la solidez del segmento $EFGA = \frac{2}{9} \times FG \times EH \times AM$; y rebajando esta cantidad del sólido $CFGA$, el residuo será el valor de la úngula. Se percibe facilmente como se resolverá la cuestion en el caso de ser FEG una elipse ó una hypérbola.

613 Cuestion XIV. Hallar la fórmula general para cubar los sólidos engendrados por la revolucion de una area al rededor de una linea paralela al ege de las abscisas.

Supongamos que la curva AM , cuyas coordenadas forman un ángulo recto APD , dé la vuelta no al rededor ^{250.} del ege AP , sino al rededor de HK paralela á AP ¿quál será el valor del sólido engendrado por la area APM ?

Lla-

Fig. Llamaremos AP , x ; PM , y ; y m la distancia AH que hay entre el ege AP de la curva, y el ege de rotacion HK ; en cuyos supuestos será $KM = y + m$. El sólido engendrado por la area $AHKM$ será $(597) = \frac{c}{2r} S. (y + m)^2 dx$; el cilindro engendrado por el rectángulo $AHKP$ $= \frac{c}{2r} m^2 x = \frac{c}{2r} S. m^2 dx$; luego si restamos el cilindro del sólido engendrado por la area $AHKM$, el residuo será el sólido engendrado por la area APM dando la vuelta al rededor de HK , cuyo valor será $\frac{c}{2r} S. (y^2 dx + 2mydx)$.

[251.] Supongamos que dada la hypérbola equilátera AM , cuyo primer ege $AH = m$, y despues de tirada la tangente AT , queramos valuar el sólido engendrado por el trilineo ATM dando la vuelta al rededor de HK . Si llamamos AT , x ; TM , y , la equacion de la curva será $2cy + yy = xx$. Haciendo en la fórmula hallada la substitucion correspondiente, é integrándola, sacaremos que el sólido que buscamos $= \frac{c}{2r} \times \frac{x^3}{3}$ que espresa un cono cuya altura, y el radio de la base son cada uno $= x$.

[252.] Averiguemos el valor del sólido que engendra el cuadrante de círculo $AGDF$ dando la vuelta al rededor del ege HK paralelo á AB . Para aplicarle á este caso la fórmula $\frac{c}{2r} S. (y^2 dx + 2mydx)$ la escribo como sigue: $\frac{c}{2r} S. y^2 dx + \frac{cm}{r} S. y dx$. El primer término espresa el sólido engendrado por la area $AGBD$ dando la vuelta al rededor de AB , cuyo sólido es igual á la mitad de la esfera, cuyo radio es AF , en el caso de ser $AB = AF$. Para saber lo que significa el otro término de la fórmula, es de advertir que

que $\frac{cm}{r}$ es la circunferencia trazada con el radio HA , y que $S. ydx$ espresa (566) el espacio $GABD$, que será igual al quadrante de círculo cuyo radio es AF , si suponemos $AB = AF$. Por consiguiente el sólido engendrado por el quadrante de círculo AGF dando la vuelta al rededor de HK es mayor que el emisferio cuyo radio es AF , de todo el sólido que resulta multiplicando el quadrante del radio AF por la circunferencia, trazada con el radio HA .

Fig.

614 Cuestion XV. Hallar la mudanza que padece la fórmula $\frac{c}{2r} S.(y^2dx + 2mydx)$ quando la curva está entre el ege de sus abscisas, y el de revolucion.

Esto es lo mismo que preguntar qual es el valor del sólido engendrado por el espacio ABD dando la vuelta al rededor de HK , siendo AB el ege de la curva AD . En este caso es evidente que el valor del espresado sólido se sacará restando del cilindro engendrado por el rectángulo $AHKB$ el sólido engendrado por el espacio $AHKD$; por consiguiente el sólido que buscamos será $= \frac{c}{2r} m^2 x - \frac{c}{2r} S.(m-y)^2 . dx = \frac{c}{2r} S. (2my - yy) . dx$.


253.

Sea el quadrante del radio $AH = m$, cuya tangente sea AB , de modo, que si llamamos $AB, x; BD, y$, la equacion sea $2my - yy = xx$. En estos supuestos, hallaremos con substituir en la fórmula xx en lugar de $2my - yy$, que el sólido engendrado por el trilineo ADB al rededor de HK será $= \frac{c}{2r} . S.x^2dx = \frac{c}{2r} . \frac{x^3}{3} = \frac{c}{2r} . \frac{m^3}{3}$, quando $x = m$. Será, pues, el sólido igual al cono cuya altura, y el radio de la base es $= m$, cuyo cono se origina del triángulo

254.

Fig. 1o AHF dando la vuelta al rededor del ege HF .

252. Si quisiéramos valuar el sólido engendrado por el cuadrante $AFEI$ dando la vuelta al rededor del ege HK , tiraríamos la recta BEK ; llamaríamos AB , x ; BE , y ; y escribiríamos la fórmula como sigue $\frac{cm}{r} S.ydx - \frac{c}{2r} S.y^2dx$. De los dos términos que lleva la fórmula, el primero es el producto de la circunferencia trazada con el radio HA multiplicada por la area $AEIB$, cuya area es igual al cuadrante quando $AB = AF$; el otro término espresa el sólido engendrado por la area $AIEB$, dando la vuelta al rededor de AB , cuyo sólido es un emisferio quando $AB = AF$. Luego el sólido que engendra el cuadrante AIF al rededor de HK es igual al sólido que resulta de la multiplicacion del cuadrante de círculo cuyo radio es AF por la circunferencia trazada con el radio AH , quitado el emisferio.



Si al sólido engendrado por el cuadrante AFI se le añade el sólido engendrado por el cuadrante AFG al rededor de HK , resultará el sólido engendrado por el semicírculo GFI al rededor de HK , igual al duplo del cuadrante, ó al mismo semicírculo multiplicado por la circunferencia, cuyo radio $= AH$, y restando el segundo sólido del primero resultará la diferencia igual al duplo del emisferio, ó á toda la esfera.

615 Cuestion XVI. Hallar una fórmula general para espresar la solidez de los sólidos engendrados por la area comprendida entre dos curvas, ó entre dos ramos de una misma curva.

Averiguemos el valor del sólido engendrado por la Fig. area ADE , comprendida entre dos curvas AD , AE , 255. que tienen una misma abscisa AB , y dan la vuelta al rededor del eje KH . Llamaremos AB , z ; BD , y ; BE , u ; y será $KD = m + y$; $KE = m + u$. Por lo dicho hasta aquí consta que el sólido engendrado por la area $ADKH$ $= \frac{c}{2r} \times S. (m + y)^2 dx$, y el que engendra la area $AEKH$ $= \frac{c}{2r} S. (m + u)^2 dx$; luego con restar este del primero, resultará el sólido engendrado por el espacio $ADE = \frac{c}{2r} S. [2m(y - u)dx + (y^2 - u^2)dx]$. El término $S. (y - u)dx$ es la area ADE , y $S.y^2 dx$ es el sólido engendrado por la area ADB dando la vuelta al rededor de AB , y $S.u^2 dx$ es el sólido engendrado por la area AEB dando la vuelta al rededor de AB ; por consiguiente el sólido engendrado por la area ADE al rededor de HK es igual á $\frac{cm}{r} AED$ mas la diferencia de los sólidos que engendran las areas ADB , AEB al rededor de AB .

Supongamos, para hacer alguna aplicacion de la fórmula, que sobre el diámetro NO se haya trazado el semicírculo NFO , y que sobre una de sus cuerdas MI paralela á NO , como diámetro, se haya trazado otro semicírculo MGI , y queramos valuar el sólido engendrado por la area $MGIF$ dando la vuelta al rededor de NO . Por el centro H tiraremos la normal HG que lo divide todo por el medio. Llamemos HO , a ; AI , b ; AH , $m = \sqrt{(aa - bb)}$. Tiraremos la ordenada KD , y llamaremos AB , x ; BD , y ; BE , u ; con lo que las equaciones de las curvas

Ff 2; GI,

Fig. *GI*, *FI* serán $bb - xx = yy$, $aa - xx = (m + u)^2$. Es constante que $S.(y - u) dx = GFED$; luego $\frac{c}{2r} S. 2m(y - u) dx = \frac{cm}{r} GFED$. Por otra parte $y^2 - u^2 = bb - x^2 +$
 $-aa + x^2$
 $-mm$

$2m\sqrt{(aa - xx)} = 2m[\sqrt{(aa - xx)} - m]$; luego $(y^2 - u^2) dx = 2m[dx\sqrt{(aa - xx)} - m dx]$, é integrando $S.(yy - uu) dx = 2m(HFEK - mx)$. Y como $mx = AHKB$, será $S.(yy - uu) dx = 2m(HFEK - HKB) = 2m.AFEB$. Por consiguiente el sólido que engendra $GFED$ al rededor de $HK = \frac{cm}{r}. GFED + \frac{cm}{r}. AFEB = \frac{cm}{r} GABD$; luego el sólido que engendra $GFI = \frac{cm}{r} GAI$. El quadrante $GAI = \frac{cb^2}{8r}$; luego el sólido que GFI engendra $= \frac{c^2}{8r^2} b^2 m$, y el que engendra toda la lúnula, será $= \frac{c^2}{4r^2} b^2 m$.

Si la curva á la qual pertenecen las ordenadas u estuviera del otro lado, se la debería considerar como negativa. Por lo que, mudando su signo para que se hiciese positiva, resultaria la fórmula $\frac{c}{2r} S. [2m(y + u) dx + (y^2 - u^2) dx]$. Y si $y = u$, se transformaría la fórmula en $\frac{2mc}{r} S. y dx$. Si fuese GFI un semicírculo que diera la vuelta al rededor de HK , tiraríamos el radio ABF paralelo á HK , y el sólido engendrado por el espacio $GDEI$ sería $= \frac{cm}{r} GDEI$, lo propio que hallamos antes (613 y 614).

616 Cuestion XVII. Hallar la mudanza que se origina en las fórmulas halladas (613 y sig.) quando el ege de revolucion atraviesa la curva.

257. Supongamos que la curva GFD , cuya abscisa AB

=

$\equiv x$, la ordenada $BD \equiv y$, dé la vuelta al rededor de la Fig. línea de las abscisas AB que corta la curva en F . Tiraremos la ordenada GA ; en cuyo supuesto el espacio AFG engendrará un sólido redondo, y el espacio FBD engendrará otro. Resta saber si la suma general $\frac{c}{2r} S.y^2 dx$ de la cubatura espresa la suma ó la diferencia de estos dos sólidos. Para averiguarlo, tiraremos en la parte de arriba la ordenada $B'D'$ que hemos de mirar como negativa, siendo positiva la abscisa $AB' \equiv x$, y su elemento dx ; por cuyo motivo hemos de considerar como negativa la area $AGB'D'$. Pero como el quadrado de una cantidad negativa es positivo, será y^2 positivo, bien que sea negativa y . Luego $S.y^2 dx$ será tambien una espresion positiva. Por consiguiante una vez que el sólido engendrado por cada area es positivo, es evidente que la fórmula $\frac{c}{2r} S.y^2 dx$, integrada de modo que sea nula quando $x \equiv 0$, representa la suma de los dos sólidos.

Lo podemos probar con un egeemplo muy sencillo. Supongamos que sea FGD una linea recta que forma un ángulo semirecto con la linea de las abscisas. Sea $AF \equiv GA \equiv a$, tendremos la equacion $x - a \equiv y$; luego $dx \equiv dy$; por consiguiante $\frac{c}{2r} S.y^2 dx \equiv \frac{c}{2r} S.y^2 dy \equiv \frac{c}{2r} \cdot \frac{y^3 + a^3}{3}$. Hemos añadido la constante, tal que si $y \equiv -a$ la cantidad sea nula. Pero $\frac{c}{2r} \cdot \frac{y^3}{3}$ es el cono engendrado por el triángulo FDB , y $\frac{c}{2r} \cdot \frac{a^3}{3}$ es el cono formado por el triángulo AGF ; luego la fórmula representa la suma de los dos sólidos. Para hallar su diferencia sería menester hallar sepa-

Fig. radamente el valor de cada uno , y restar el uno del otro.

250. 617 Si en lo dicho (605) quando buscábamos el sólido engendrado por la area AMP dando la vuelta al rededor de HK , concebimos que HK se vá arrimando, moviéndose paralelamente á sí misma, al ege AP hasta llegar á confundirse del otro lado con $H'K'$; es constante que $AH = m$ será negativa; por lo que, mudando en la fórmula el signo de m , se transformará en $\frac{c}{2r} S.(y^2 dx - 2mydx)$, donde $AH' = m$. Esta fórmula, integrándola de modo que sea nula quando fuere $x = 0$, espresará la diferencia de los dos sólidos que provienen de las areas MFK' , $AFK'P$.

Para manifestarlo, buscaremos primero el sólido que engendra $MAH'K'M$ al rededor de $H'K'$, que por lo dicho (616) sabemos que es la suma de los sólidos que engendran las dos areas MFK' , AFH' ; despues restaremos el cilindro formado por la revolucion del rectángulo $AH'K'P$, que es positivo, aun quando m es negativa. Es evidente que egecutada esta sustraccion quedará la diferencia de los dos sólidos que engendran las areas MFK' , $AFK'P$.

Supongamos que sea AFM una linea recta que forma con AP un ángulo semirecto, de modo que $x = y$, Será; pues, $\frac{c}{2r} S.(y^2 dx - 2mydx) = \frac{c}{2r} S.(x^2 dx - 2mx dx) = \frac{c}{2r} \cdot \frac{x^3}{3} - mx^2$. Démosle á esta espresion la forma siguiente $\frac{c}{2r} \left[\frac{(x-m)^3}{3} - m^2 x + \frac{m^3}{3} \right]$; y como $\frac{c}{2r} \cdot \frac{(x-m)^3}{3}$ es el cono engendrado por el triángulo FMK' ; $\frac{c}{2r} m^2 x$ es el cilindro que engendra el rectángulo $AH'K'P$; y finalmente $\frac{c}{2r} \cdot \frac{m^3}{3}$, es el cono que engendra el triángulo AFH' , se infiere que

que el sólido engendrado por la area $AFK'P = \frac{c}{2r} (m^2x \text{ Fig. } - \frac{m^3}{3})$. Por consiguiente la fórmula espresa la diferencia de los dos sólidos que engendran las areas FMK' , $AFK'P$.

618 Si en el caso antes propuesto (615) repasamos las operaciones egecutadas, determinaremos qué cosa significará la fórmula quando el ege de revolucion fuese $H'K'$ 255. y m fuese negativa. Porque con mudar el signo de la cantidad m , la fórmula se transformará en $\frac{c}{2r} S. (-2m(y-u)dx + (y^2 - u^2) dx)$. Esta fórmula se saca si buscamos primero el sólido engendrado por el espacio $ADK'H'$ que vale la suma de los dos engendrados por los trilineos FDK' , FAH' ; y buscando despues el sólido formado por el espacio $AEK'H'$ igual á la suma de los sólidos engendrados por los trilineos GEK' , GAH' , y restando el último sólido del primero. Egecutando la sustraccion queda el sólido engendrado por $FGED$, menos el sólido que engendra AFG ; luego la fórmula espresa la diferencia de los dos sólidos que engendran las areas $FGED$, AFG .


Apliquemos esto á un caso muy sencillo. Supongamos que sean AFD , AGE dos lineas rectas, y que $AB = x$: $BD = y :: 1 : f$; y $x : BE = u :: 1 : g$. Luego $y = fx$, y $u = gx$. Por consiguiente la fórmula se transformará en $\frac{c}{2r} S. -2m(f-g) xdx + (f^2 - g^2) x^2 dx = \frac{c}{2r} (f^2 - g^2) \frac{x^3}{3} - (f-g)mx^2$. Veamos, pues, si esta fórmula espresa la diferencia de los dos sólidos que engendran las areas $FGED$, AFG , conforme hemos dicho.

Hallaremos facilmente que $FH' = \frac{m}{f}$, y $GH' = \frac{m}{g}$;
Ff 4 luc-


Fig. luego $FK' = x - \frac{m}{f}$, $GH' = x - \frac{m}{g}$; $K'D = fx - m$, $K'E = gx - m$; luego el cono engendrado por el triángulo $FK'D$ al rededor de $FK' = \frac{c}{2r}$.
$$\frac{(fx - m)^2 \left(x - \frac{m}{f}\right)}{3}$$
$$= \frac{c}{2r} \left(\frac{f^2 x^3}{3} - fmx^2 + m^2 x - \frac{m^3}{3f} \right).$$
 El cono originado de la revolucion del triángulo $GK'E$ será $= \frac{c}{2r} \left(\frac{g^2 x^3}{3} - gmx^2 + m^2 x - \frac{m^3}{3g} \right)$; luego si restamos el segundo cono del primero, quedará el sólido engendrado por la area $FGED$
$$= \frac{c}{2r} \left(f^2 - g^2 \right) \frac{x^3}{3} - (f - g) mx^2 + \frac{(f - g)m^3}{3fg}.$$
 El cono que engendra el triángulo GAH' es $\frac{c}{2r} \cdot \frac{m^3}{3g}$, y el que engendra el triángulo FAH' es $\frac{c}{2r} \cdot \frac{m^3}{3f}$. Restando el segundo sólido del primero, quedará el sólido formado por el triángulo $AFG = \frac{c}{2r} \cdot \frac{(f - g)m^3}{3fg}$. Si restamos este del otro, resultará la fórmula que sacamos antes por medio de la integracion, que por lo mismo representa la diferencia de los dos sólidos formados por las areas $FGED$, FGA .

Usos del cálculo integral para hallar las superficies curvas de los sólidos.


- 619 Trataremos aquí de las superficies de los sólidos de revolucion. Para cuyo fin imaginaremos que mien-
 258. tras la curva AM dé la vuelta al rededor de AP , su porcion Mm infinitamente pequeña traza una zona ó faja, ó porcion de cono truncado que es el elemento de la superficie, y que es (I. 576) igual al producto de Mm por la circunferencia, cuyo radio fuese la perpendicular tirada desde el medio de Mm á AP , ó lo que es lo propio, una vez que




241




242




243




244




245




246




247




248



250




251




249



252



253



que Mm es infinitamente pequeña, por la circunferencia Fig. cuyo radio fuese MP , ó el diámetro MM' . Luego si llamamos p la razón entre el diámetro y la circunferencia, la circunferencia del círculo, cuyo diámetro fuese $MM' = 2y$, será $2py$. Será, pues, $2py\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ el elemento de la superficie de los sólidos de revolución.

Si llamáramos u la curva AM , sería $Mm = du$; y substituyendo en $2py\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$, du en lugar de $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ la fórmula se reducirá á esta $2pydu$, que parece mas sencilla.

620 Cuestión I. Hallar la superficie del cono recto ABD.

Imaginemos el cono cortado por un plano $PMNG$ paralelo á su base, y el eje AB . Si llamamos AB , a ; BC , b ; PM , y ; y AM , u ; los triángulos semejantes ABC , AMP darán $AB : BC :: AM : MP$; esto es, $a : b :: u : y = \frac{bu}{a}$. Substituyendo este valor de y en $2pydu$, resultará $\frac{2pbudu}{a}$ que será el elemento de la superficie del cono parcial AMN , cuya integral $\frac{pbu^2}{a}$ será el valor de la superficie del mismo cono. Quando $u = a$, la expresión $\frac{pbu^2}{a}$ expresará la superficie de todo el cono, y como entonces $\frac{pbu^2}{a} = \frac{pba^2}{a} = abp$, será la superficie convexa de todo el cono $= p \times AB \times BC$.

621 Cuestión II. Hallar la superficie de la esfera $AMBDA$, cuyo radio $CM = a$.

Llamaremos AP , x ; PM , y ; AM , u ; será $Mm = du$; $Pp = Mn = dx$. De los triángulos semejantes CMP , Mmn , sacaremos $PM : MC :: Mn : Mm$; esto es $y : a :: dx :$

Fig. $dx:du = \frac{adx}{y}$. Substituyendo este valor de du en la fórmula $2pydu$, resultará $2padx$; y por consiguiente la superficie $= 2pax = AP \times \text{circunf. } AMBM'A$. Como ap es la periferia del círculo $AMBM'$, y la periferia multiplicada por la mitad del radio a vale la area del espresado círculo; se sigue que dicha periferia multiplicada por a valdrá el duplo de dicha area, y que si la multiplicamos por $2a = AB$, el producto $AB \times \text{perif. } AMBM'$ será quádruplo de la area del mismo círculo. Y como en el supuesto de ser $x = AB$, representa la fórmula la superficie de toda la esfera, es evidente que la superficie de toda la esfera es quádrupla de la area de uno de sus círculos máximos, conforme ya lo tenemos averiguado (I. 578) por otro camino.

Luego ya que $AP \times \text{perif. } AMBM'$ es la superficie del segmento esférico $AM'PM$, inferiremos que la superficie de un segmento esférico es á la superficie toda la esfera $:: AP \times \text{perif. } AMBM' : AB \times \text{perif. } AMBM' :: AP:AB$, esto es, como la altura ó grueso del segmento al diámetro de la esfera.

622 Cuestion III. Hallar la superficie del paraboloides que engendra la parábola AM al rededor de su ege.

258. La equacion de esta curva $yy = ax$ dá $x = \frac{yy}{a}$, $dx = \frac{2ydy}{a}$, y $dx^2 = \frac{4ydy^2}{aa}$; luego $\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \sqrt{(dy^2 + \frac{4ydy^2}{aa})} = dy \frac{\sqrt{(aa+4yy)}}{\sqrt{aa}}$. Luego la fórmula $2pydu$ se transformará en $\frac{2pydy}{a} \times (a^2 + 4y^2)^{\frac{1}{2}}$, cuya integral es (509) $\frac{p \times (a^2 + 4y^2)^{\frac{3}{2}}}{6a}$; completando esta integral como pide el

supuesto de $y = 0$ (501), será $\frac{p(a^2 + 4yy)^{\frac{3}{2}}}{6a}$ — Fig.

$\frac{pa^2}{6}$ el valor cabal de la superficie del paraboloides.

623 Cuestion IV. Hallar la superficie de un esferoide. 261.

Supongamos que $ACFHG$ represente la una mitad del esferoide propuesto, engendrado por la revolucion de la semiellipse FAG al rededor del ege AH ; y llamemos AH , a ; FH ó HG , c ; BH , x ; BC , y ; FC , u . La naturaleza de la curva dará $y = \frac{c}{a} \sqrt{(a^2 - x^2)}$; luego $dy =$

$$= \frac{cx dx}{a \sqrt{(a^2 - x^2)}}; \text{ y por consiguiente } du = \sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \sqrt{(dx^2 + \frac{c^2 x^2 dx^2}{a^2 (a^2 - x^2)})} = \frac{dx \sqrt{(a^4 - (aa - cc)xx)}}{a \sqrt{(aa - xx)}} = \frac{dx \sqrt{(a^4 - b^2 x^2)}}{a \sqrt{(a^2 - x^2)}}$$

(con hacer $\sqrt{(a^2 - c^2)} = b$) $= \frac{b dx \sqrt{(\frac{a^4}{bb} - x^2)}}{a \sqrt{(a^2 - x^2)}}$. Por

consiguiente $2pydu$ será $\frac{2pbcdx}{aa} \sqrt{(\frac{a^4}{bb} - x^2)}$, cuya integral espresada por una serie infinita es $2pcx \times (1 - \frac{b^2 x^2}{2.3a^4} - \frac{b^4 x^4}{2.4.5a^8} - \frac{3b^6 x^6}{2.4.6.7a^{12}})$.

La integral del elemento hallado de la superficie del esferoide se puede hallar mas facilmente por medio de la quadratura del círculo. Porque si desde el centro H , y con un radio igual á $\frac{aa}{b}$ trazamos el círculo IER , y prolongamos hasta E la ordenada BC ; es evidente que $BE = \sqrt{(\frac{a^4}{bb} - xx)}$, y que el elemento de la area $EIHB$ será $dx \sqrt{(\frac{a^4}{bb} - xx)}$, que tendrá con el elemento $\frac{2pbcdx}{aa} \sqrt{(\frac{a^4}{bb} - xx)}$ de la superficie la misma razon que 1 con $\frac{2pb^5c}{aa}$, y sus integrales tendrán tambien la misma razon. Y como la última espresa la superficie $CFGD$, se sigue que

Fig. $\frac{2pb^c}{aa} \times BEIFH = 2p \times \frac{FH}{HI} \times BEIFH.$

Es de reparar que esta resolucion sirve para el esferoide prolongado; pero si fuese AH el ege menor, el esferoide engendrado por la semiellipse FAG será aplanado, y como AH sería menor que FH , el valor de $b = \sqrt{(a^2 - c^2)}$ sería imposible. Pero si hiciéramos $b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$ y $m = \frac{a^2}{b}$, la cantidad $\frac{2pbcdx}{a^2} \sqrt{\left(\frac{a^4}{bb} + x^2\right)}$ sería $= \frac{2pcdx}{m} \sqrt{(m^2 + x^2)} = \frac{2pc}{m} \times dx \sqrt{(m^2 + x^2)}$. La integral de esta diferencial se hallará por medio de los logaritmos; porque podemos transformar la parte variable $dx \sqrt{(m^2 + x^2)}$ en

$$\frac{dx(m^2 + x^2)}{\sqrt{(m^2 + x^2)}} = \frac{m^2 dx + x^2 dx}{\sqrt{(m^2 + x^2)}} = \frac{m^2 x dx + x^3 dx}{\sqrt{(m^2 x^2 + x^4)}} =$$

$$\frac{\frac{1}{2} m^2 x dx + x^3 dx}{\sqrt{(m^2 x^2 + x^4)}} + \frac{\frac{1}{2} m^2 x dx}{\sqrt{(m^2 x^2 + x^4)}}; \text{ de cuya espresión el}$$

primer término se integrará por lo dicho (492), y hallaremos que su integral $= \frac{1}{2} \sqrt{(m^2 x^2 + x^4)}$; y añadiéndola á esta cantidad la integral del otro término

$$\frac{\frac{1}{2} m^2 x dx}{\sqrt{(m^2 x^2 + x^4)}} \text{ ó } \frac{\frac{1}{2} m^2 dx}{\sqrt{(m^2 + x^2)}} \quad (545), \text{ sacaremos } \frac{1}{2} x$$

$\sqrt{(m^2 + x^2)} + \frac{1}{2} m^2 \times L \left[x + \sqrt{(m^2 + x^2)} \right]$, que será la integral de $dx \sqrt{(m^2 + x^2)}$. Multiplicándola por $\frac{2pc}{m}$, y practicando lo dicho (501) resultará $\frac{pcx}{m} \times \sqrt{(m^2 + x^2)} + pcm \times L \left[\frac{x + \sqrt{(m^2 + x^2)}}{m} \right]$ que será el valor de la superficie del esferoide aplanado.

624 Cuestion V. Hallar la superficie de un conoide hyperbólico.

Lla-

Llamemos a el primer ege de la hypérbola generatriz; Fig. c , su conjugado; y x la distancia entre la ordenada, y el centro de la curva. Por la propiedad de la hypérbola será $y = \frac{c}{a} \sqrt{(x^2 - a^2)}$; luego $dy = \frac{cx dx}{a \sqrt{(xx - aa)}}$, $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ será $\frac{dx \sqrt{(a^2 + c^2) x^2 - a^4}}{a \sqrt{(xx - aa)}}$, y $2py \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ será $\frac{2pc dx}{aa} \times \sqrt{(aa + cc) xx - a^4}$, que con suponer $\frac{a^4}{aa + cc} = m^2$ será $\frac{2pc dx}{m} \sqrt{(x^2 - m^2)}$, cuya integral hallaremos por el mismo camino que en la última cuestion $= \frac{pcx \sqrt{(xx - mm)}}{m} - pcm \times L \left[x + \sqrt{(x^2 - m^2)} \right]$, y añadiendo la constante hallada con suponer $x = a$, será $\frac{pcx}{m} \sqrt{(xx - mm)} - pc - pcm \times L \left[\frac{x + \sqrt{(x^2 - m^2)}}{a + \frac{cm}{a}} \right]$, que será el verdadero valor de la superficie del conoide hyperbólico.

625 Cuestion VI. Hallar la superficie del sólido llamado Groin.

Sea $cgef$ una seccion del sólido paralela á su base, 262; y llamemos x la distancia á que está del vértice A ; llamemos z el arco correspondiente An de la seccion semicircular NnA ; y su radio $AB = BN, a$.

Consta (539) que $dz = \frac{adx}{\sqrt{(2ax - xx)}}$, multiplicando esta cantidad por $2 \sqrt{(2ax - xx)}$ valor de $ge = 2gn$, resultará $2adx$ (619) que será el elemento de una de las quatro superficies iguales convexas que terminan el sólido. Luego toda la superficie del sólido, no contando la de la base, será $= 8a^2$, que por consiguiente es cabalmente dupla de la base.

Si el groin fuese de otra especie , como si las dos secciones iguales que pasan por el medio de los lados opuestos en vez de ser círculos fuesen otras curvas , se sacaria del mismo modo su superficie. Si las espresadas secciones fuesen , por egeemplo , parábolas ; como la superficie de un conoide parabólico $= \frac{p(aa + 4y^2)^{\frac{3}{2}}}{6a} - \frac{pa^2}{6}$ (622) la superficie convexa de un groin en el supuesto de ser AnN una parábola , sería $\frac{4(a^2 + 4y^2)^{\frac{3}{2}}}{6a} - \frac{4a^2}{6}$.









Método para reducir en algunos casos la integracion de una diferencial propuesta á la de otra diferencial conocida , y para conocer quando es posible esta reduccion.


626 Aunque nos ceñiremos aquí á las diferenciales binomias , qualquiera se hará cargo de que quanto digésemos se podrá tambien aplicar á las diferenciales mas compuestas.

Supongamos primero que la diferencial propuesta es $bx^s dx(a + bx^n)^p$, y que su integracion se ha de reducir á la integracion de la diferencial $x^m dx(a + bx^n)^p$; ó lo que es lo propio , supongamos primero que lleve cada binomio un mismo esponente.

Supondremos $S. bx^s dx(a + bx^n)^p = (a + bx^n)^{p+t} (Ax^k + Bx^{k+q} + Cx^{k+2q} + \dots Px^{k+iq}) + S.Rx^m dx(a + bx^n)^p$; siendo k y q esponentes incógnitos; t , un número entero positivo ; A, B, C, P, R &c. coefi-

cien-





cientes constantes, tambien incógnitos. Si diferenciamos, resultará $bx^s dx(a + bx^n)^p = (p + 1)nbx^{n-1} dx(a + bx^n)^p$
 $(Ax^k + Bx^{k+q} + Cx^{k+2q} \dots + Px^{k+q-1}) + (a + bx^n)^{p+1} (kAx^{k-1} dx + (k + q)(Bx^{k+q-1} dx) + (k + 2q)(Cx^{k+2q-1} dx) \dots + (k + tq)Px^{k+q-1} dx + R x^m dx(a + bx^n)^p$, ó dividiendo todo por $(a + bx^n)^p dx$, sacaremos $bx^s = (p + 1)nbx^{n-1} (Ax^k + Bx^{k+q} + Cx^{k+2q} \dots + Px^{k+q-1}) + (a + bx^n) (kAx^{k-1} + (k + q)Bx^{k+q-1} + (k + 2q)Cx^{k+2q-1} \dots + (k + tq)Px^{k+q-1} + R x^m$.

Para que se verifique esta equacion, sea el que fuere el valor de x , es preciso que despues de egecutadas la multiplicacion y transposicion, la suma de las cantidades que multiplicaren una misma potencia de x , sea cero; con esto se podrán determinar los coeficientes A , B , C &c. pero para esto es indispensable que el número de las potencias de x , que esta equacion llevare no sea mayor que el número de dichos coeficientes.

Pero el número de estos es $t + 2$, como es facil comprobarlo; veamos, pues, cuál será el de las potencias de x . Para conseguirlo, hemos de determinar k y q .

Como los esponentes k y q son indeterminados, los determinaremos del modo siguiente. Supongamos que sea $k - 1$ el menor esponente indeterminado que lleva la equacion; le igualaremos con m ó s , segun fuere m ó s el esponente menor. El mayor esponente que llevare la equacion, será $k + tq + n - 1$, segun se echa de ver; le iguala-

laremos con s , si hubiéremos igualado $k - 1$ con m , ó le igualáremos con m , si hubiéremos igualado $k - 1$ con s .

Supongamos $k - 1 = m$; tendremos, pues, $k + tq + n - 1 = s$. Sentado esto, para que no haya en la equacion mas potencias de x , que coeficientes indeterminados, es preciso que los esponentes de x en la equacion compongan tambien una progresion arismética, cuya diferencia sea q , y no puede dejar de ser así una vez que hemos supuesto $k - 1 = m$, $k + tq + n - 1 = s$, y t un número entero positivo. Pero como el término mayor de esta progresion es $k + tq + n - 1$, y $k - 1$ es el menor; es facil probar que el número de los términos de esta progresion es (II. 169) $\frac{k+tq+n-1-k-1}{q} + 1$ ó $\frac{tq+n}{q} + 1$; es, pues, preciso que $\frac{tq+n}{q} + 1 = t + 2$; y por consiguiente $q = n$: si substituimos en lugar de q y k su valor en la equacion $k + tq + n - 1 = s$, resultará $tn + m + n = s$, y por lo mismo $t = \frac{s-m-n}{n} = \frac{s-m}{n} - 1$. Luego será posible reducir una diferencial á otra, quando la diferencia $s - m$ de los esponentes de x fuera de los dos binomios, divididos por el esponente de x en el binomio, diere al cociente un número entero positivo; en cuyo caso se supondrá $S. x^s dx (a + bx^n)^p = (a + bx^n)^{p+1} (Ax^{n+1} + Bx^{m+n+1} + Cx^{m+2n+1} \dots + Px^{s-n+1}) + S. Rx^m dx (a + bx^n)^p$; y para determinar los coeficientes A, B, C, P, R &c. diferenciaremos, dividiremos por $(a + bx^n)^p dx$, egecutaremos las operaciones que estuvieren indicadas, lo pasaremos todo á un mismo miembro, é igualaremos con

cero la suma de las cantidades que multiplicaren una misma potencia de x , y tendremos con esto otras tantas ecuaciones como coeficientes indeterminados hubiere.

627 Se echa de ver que en el supuesto de referirse $S.x^s dx (a + bx^n)^p$ á $S.x^m dx (a + bx^n)^p$, esta última se ha de referir igualmente á la primera; pero practicando lo que antes, para reducir $S.x^m dx (a + bx^n)^p$ á $S.x^s dx (a + bx^n)^p$, hallaríamos que $\frac{m-s}{n}$ ha de ser un número entero positivo, y que habríamos de suponer $S.x^m dx (a + bx^n)^p = (a + bx^n)^{p+1} (Ax^{s+1} + Bx^{s+n+1} \&c. + Px^{m-n+1}) + S.Rx^s dx (a + bx^n)^p$; luego aunque sea s mayor ó menor que m , con tal que $\frac{s-m}{n}$ ó $\frac{m-s}{n}$ sea un número entero positivo, siempre se podrá reducir la una de las dos diferenciales á la otra, substituyendo en lugar del primer esponente de x en la serie $Ax^k + Bx^{k+q} \&c.$ el menor de los dos esponentes m y s , despues de añadirle la unidad, y substituyendo en lugar de q el esponente que llevare x en el binomio.

Por exemplo, si quisiéramos reducir $x^4 dx (bb - xx)^{\frac{1}{2}}$ á $dx (bb - xx)^{\frac{1}{2}}$, que pende de la quadratura del círculo; echaríamos de ver que en este caso $s - m$ sería $4 - 0$, que dividido por n , esto es por 2, dá el cociente 2 que es un número entero; luego es posible la reduccion; y porque la fórmula $t = \frac{s-m}{n} - 1$ dá $t = 1$, y el menor esponente $m = 0$, substituiremos 1 en lugar de k ; haremos, pues, $S.x^4 dx (bb - xx)^{\frac{1}{2}} = (bb - xx)^{\frac{3}{2}} (Ax + Bx^3) + S.R dx (bb - xx)^{\frac{1}{2}}$. Hecho esto, diferenciaremos, dividiremos

por $(bb - xx)^{\frac{1}{2}}dx$, traspasaremos, y saldrá

$$\begin{aligned} 0 &= Abb - Ax^2 - 3Bx^4 \\ &+ R + 3Bbbx^2 - x \\ &- 3Ax - 3Bx^4; \end{aligned}$$

de donde inferiremos $-6B - 1 = 0$, $-4A + 3Bbb = 0$, $Abb + R = 0$; luego $B = -\frac{1}{6}$, $A = -\frac{1}{8}bb$, $R = \frac{1}{8}b^4$; luego $S.x^4dx(bb-xx)^{\frac{1}{2}} = (bb-xx)^{\frac{3}{2}}(-\frac{1}{8}bbx - \frac{1}{6}x^3) + \frac{1}{8}b^4 S.d x \sqrt{(bb-xx)} + C$.

Facilita, pues, este método el hallar las diferenciales que se reducen á una diferencial dada, y por consiguiente las que se refieren á la quadratura del círculo, de la elipse, y de la hypérbola; de cuyas diferenciales es facil hallar las diferentes espresiones, por medio de las diferentes equaciones de las mismas curvas.

628 Repararemos de camino que este método dá tambien las diferenciales binomias integrables; porque lo mismo es indagar entre las diferenciales como esta $bx^sdx(a+bx^n)^p$ quáles son integrables, que buscar quáles son las que se reducen á $Rx^{n-1}dx(a+bx^n)^p$, que por lo dicho (509) se integra inmediatamente. Pero de lo dicho (626) se sigue que $\frac{s-n+1}{n}$ ha de ser un número entero positivo; esto es, que $\frac{s+1}{n}$ ha de ser un número entero positivo, cuya consecuencia quadra con lo que digimos antes (510).

629 Supongamos ahora que sean diferentes los exponentes de los binomios que hay en las diferenciales de que estamos tratando; por manera que la diferencial propues-

puesta sea $bx^s dx(a + bx^n)^r$, y sea $x^m dx(a + bx^n)^p$ la diferencial á la qual nos proponemos reducirla, siendo el valor numérico de p menor que el valor numérico de r . Si fuere r positiva, transformaremos la diferencial $bx^s dx(a + bx^n)^r$ en estotra $bx^s dx(a + bx^n)^{r-p} \times (a + bx^n)^p$. Y si fuese $r-p$ un número entero positivo, podremos reducir $bx^s dx(a + bx^n)^{r-p} \times (a + bx^n)^p$ á una serie de términos de esta forma $(A'x^s + B'x^{s+n} + C'x^{s+2n} \&c.) dx(a + bx^n)^p$, y se podrá reducir cada uno de ellos á $x^m dx(a + bx^n)^p$ por el método antecedente si $s-m$ fuese divisible por n ; y para reducirlos todos juntos, se practicará al pie de la letra quanto manda el espresado método, tomando en lugar de la cantidad que allí llamamos s , el mayor esponente de x , en el valor que tuviere x en $bx^s dx(a + bx^n)^{r-p}$ despues de elevado el binomio á la potencia $r-p$.

Si quisiéramos reducir, por egemplo, $S. x^2 dx(bb - xx)^{\frac{3}{2}}$ á $S. dx(bb - xx)^{\frac{1}{2}}$, transformaríamos $S. x^2 dx(bb - xx)^{\frac{3}{2}}$ en $S. x^2 dx(bb - xx)(bb - xx)^{\frac{1}{2}}$ ó $S. (bbx^2 dx - x^4 dx)(bb - xx)^{\frac{1}{2}}$, en cuyo caso en lugar de s habríamos de substituir 4. Supondríamos, pues, arreglándonos al método, $S. (bbx^2 dx - x^4 dx)(bb - xx)^{\frac{1}{2}} = (bb - xx)^{\frac{3}{2}} (Ax + Bx^3) + S. Rdx(bb - xx)^{\frac{1}{2}}$.

Si al contrario fuese negativo el valor de r , prepararíamos la diferencial á la qual quisiésemos reducir la propuesta, dándola esta forma $x^m dx(a + bx^n)^{p-r}(a + bx^n)^r$. Si en este caso fuese $p-r$ un número entero, que será indispensablemente positivo, una vez que su-

ponemos r negativa y mayor que p , siendo por otra parte p lo que se quisiere, se podrá reducir $x^m dx (a + bx^n)^{-r}$ $(a + bx^n)^r$ á una serie finita de términos de esta forma $(A'x^m + B'x^{m+n} + C'x^{m+2n} + \&c.) (a + bx^n)^r$. Hecho esto, se harán las mismas operaciones que si se hubiese de reducir la última á la forma $x^s dx (a + bx^n)^r$; quiero decir que se practicará lo propio que quando r era positiva.

Supongamos, por egemplo, que se haya de reducir $gx^{-2} dx (aa + xx)^{-2}$ á $dx (aa + xx)^{-1}$ ó $\frac{dx}{aa + xx}$, cuya integral es (589) un arco de círculo cuya tangente es x , y el radio a . Transformaríamos $dx (aa + xx)^{-1}$ en $(aa + xx)dx (aa + xx)^{-2}$; y como el menor esponente fuera del binomio propuesto es -2 , supondríamos $S. R(aa + xx)dx (aa + xx)^{-2} = (aa + xx)^{-1} (Ax^{-1} + Bx) + S. gx^{-2} dx (aa + xx)^{-2}$, y proseguiríamos del mismo modo que antes para determinar los coeficientes A, B, R . Hecho esto, sacaríamos por medio de la transposicion el valor de $S. gx^{-2} dx (aa + xx)^{-2}$, en el qual reduciríamos despues $R(aa + xx) dx (aa + xx)^{-2}$ á $Rdx(aa + xx)^{-1}$.

De las Fracciones racionales.

630 No hay cantidad alguna diferencial que no se pueda integrar, ó algebráicamente, ó por arcos de círculo, ó por logaritmos, ó por estos tres métodos juntos, ó solo por dos.

Es

Es siempre integrable algebráicamente, quando no lleva denominador variable, á no ser que este denominador sea monomio, excepto sin embargo el caso de no pasar el denominador de la primera potencia, conforme hemos visto (476).

Nos queda, pues, probar que es verdadera la proposicion en los demás casos; esto es quando la diferencial propuesta lleva un denominador racional complejo.

Supondremos que en el numerador de la fraccion diferencial propuesta, la variable esté menos elevada que en el denominador. Si no lo estuviese, sería facil conseguir que lo estuviera dividiendo el numerador por el denominador, hasta que la potencia residua fuese menor que en el denominador. Por egemplo, si hubiéramos de integrar $\frac{x^3 dx}{aa+3ax+xx}$, empezariamos dividiendo $x^3 dx$ por $xx+3ax+aa$; sacariamos el cociente $x dx$, y la resta $-3ax^2 dx - aax dx$; dividiríamos esta resta por el mismo denominador, y saldria el cociente $-3a dx$, y la resta $+8a^2 x dx + 3a^3 dx$. Hecho esto, en lugar de $\frac{x^3 dx}{aa+3ax+xx}$, integrariamos $x dx - 3a dx + \frac{8a^2 x dx + 3a^3 dx}{aa+3ax+xx}$.

A fin de hallar un método que nos dirija en la integracion de las fracciones diferenciales racionales, hemos de tener presente que como la diferencial del logaritmo de una cantidad es la diferencial de dicha cantidad, dividida por la cantidad misma, ó es una fraccion; es natural sospechar que la integracion de las fracciones racionales podrá reducirse en muchos casos á los logaritmos. Sirva de

egemplo $2aL(a+x) - 2aL(2a+x)$; diferenciando tendremos $\frac{2adx}{a+x} - \frac{2adx}{2a+x}$, ó $\frac{2aadx}{2aa+3ax+xx}$ despues de reducidos ambos términos á un mismo denominador. Se viene á los ojos que para integrar esta faccion, no habria otra cosa que hacer sino resolverla en dos fracciones, tales que el denominador de la una fuese $a+x$, y el de la otra $2a+x$; y cuyos numeradores fuesen números constantes multiplicados por dx ; estas dos fracciones se integrarian despues por logaritmos.

631 Es, pues, muy natural intentar resolver estas fracciones, para integrarlas, en otras tantas fracciones simples, como factores puede tener el denominador, de las cuales cada una tenga por denominador uno de dichos factores; este es con efecto el camino que se puede, y debe seguir, quando son desiguales todos los factores, de cuya multiplicacion puede ser el denominador el resultado.

632 Pero quando el denominador tiene algunos factores iguales unos á otros, no sirve este método; porque no puede entonces reducirse enteramente á los logaritmos la integracion. Con efecto, si la propuesta fuese $\frac{dx}{(a+x)^2}$, cuyo denominador tiene dos factores iguales $a+x$, y $a+x$, hallaríamos (492) que la integral de esta cantidad, ó de su igual $dx(a+x)^{-2}$ es $-(a+x)^{-1} + C$, que no pende de los logaritmos. Pero al mismo tiempo se echa de ver, que si diferenciáramos una cantidad como esta $\frac{aa}{a+x} + 2aL(a+x) - 2aL(2a+x) - aL(3a+x)$, sacaríamos

mos $\frac{-adx}{(a+x)^2} + \frac{2adx}{a+x} + \frac{2adx}{2a+x} - \frac{adx}{3a+x}$ ó $\frac{(2ax+aa)dx}{(a+x)^2} + \frac{2a+x}{2a+x}$
 $-\frac{adx}{3a+x}$, ó con reducirlo todo al mismo denominador,
 $\frac{10a^4dx+26a^3x dx+17a^2x^2dx+3ax^3dx}{(a+x)^2(2a+x)(3a+x)}$; cuya fraccion se integraría
 con transformarla en $\frac{2ax+aa}{(a+x)^2}dx + \frac{2adx}{2a+x} - \frac{adx}{3a+x}$, esto es,
 con resolverla en tres fracciones, tales que el denomina-
 dor de la primera constase de todos los factores iguales, lle-
 vando su numerador todas las potencias de x menores que
 la mayor potencia del denominador; por lo que mira á las
 otras dos fracciones, el denominador de cada una sería uno
 de los factores desiguales; y no llevarian en el numerador
 ninguna potencia de x . Este es con efecto el método por
 el qual se puede integrar qualquiera fraccion racional, y le
 practicaremos quando el denominador no tuviese factores
 imaginarios; dejando para despues declarar lo que hay que
 hacer en este último caso.

Supondremos que
$$\frac{(a+bx+cx^2+\dots kx^{n-1})dx}{(M+Nx+Px^2+\dots Tx^n)}$$

representa en general qualquiera fraccion racional; si supo-
 nemos que tiene el denominador un número m de factores
 iguales á $x+g$, un número p de factores iguales á $x+b$, y
 un número qualquiera de factores desiguales como $x+i$,
 $x+q$, $x+n$ &c. en cuyos supuestos la fraccion propuesta

será
$$\frac{(a+bx+cx^2+\dots kx^{n-1})dx}{(x+g)^m(x+b)^p \times \&c. (x+i)(x+q)(x+n)}$$

para integrar esta fraccion, habremos de suponer

$$(a + bx + cx^2 + \dots + kx^{n-1})dx$$

$$(x+g)^m (x+b)^p \times \&c. (x+i)(x+q)(x+n) \times \&c.$$

$$= \frac{Ax^{m-1}dx + Bx^{m-2}dx + \dots + Rdx}{(x+g)^m} + \frac{A'x^{p-1}dx + B'x^{p-2}dx + \dots + R'dx}{(x+b)^p} \&c.$$

+ $\frac{Qdx}{x+i} + \frac{Mdx}{x+q} + \frac{Ndx}{x+n} + \&c.$ siendo $A, B, C \&c.$ coeficientes constantes é indeterminados. Y si consiguiéramos determinarlos por algun camino, tendríamos averiguada la integral. Esto es cierto por lo que toca á las fracciones simples $\frac{Qdx}{x+i}, \frac{Mdx}{x+q}, \frac{Ndx}{x+n} \&c.$ cuya integral es $QL(x+i), ML(x+q), NL(x+n) \&c.$ Por lo que mira á las fraccio-

nes $\frac{Ax^{m-1}dx + Bx^{m-2}dx + \dots + Rdx}{(x+g)^m}$, haremos para

abreviar $x+g=z$, de donde sacaremos $x=z-g$, y $dx=dz$. Substituyendo estos valores, quedará todo reducido á una serie de monomios fáciles de integrar, y entre los cuales no habrá mas que uno de la forma $\frac{dx}{x}$, que se integrará por logaritmos. En quanto á los términos

$\frac{A'x^{p-1}dx + B'x^{p-2}dx + \dots + T'dx}{(x+b)^p}$, haremos $x+b$

$=z'$. Por consiguiente no son mas que dos los puntos que nos toca averiguar. 1.º como se hallan los factores del denominador de la fraccion racional. 2.º como se hallan los coeficientes indeterminados.

633 Los factores del denominador se hallan buscando las raíces de la equacion que resultaría de hacer dicho denominador igual á cero ; porque lo mismo es resolver una equacion que buscar los factores binomios de cuya multiplicacion resulta dicha equacion ; para cuyo fin sirven los métodos declarados (II. 235 y sig.).

634 Para determinar los coeficientes A, B, C , parece natural reducir á un mismo denominador las fracciones en que están ; entonces los dos miembros de la equacion que formare la fraccion propuesta con las nuevas fracciones tendrán un mismo denominador ; se podrá , pues, omitir en ambos miembros este denominador , y pasándolo todo á un mismo miembro , será menester para que se verifique la equacion , sea el que fuere el valor de x , que sea cero la suma de los términos que multiplicaren una misma potencia de x . Con esto se formarán tantas equaciones quantos fueren los coeficientes indeterminados , que servirán para determinarlos.

Propongámonos integrar , por egemplo , $\frac{dx}{aa-xx}$; supondremos $\frac{dx}{aa-xx} = \frac{A dx}{a+x} + \frac{B dx}{a-x}$, porque los dos factores del denominador $aa-xx$ son $a+x$ y $a-x$. Reduciéndolo todo á un mismo denominador resultará $\frac{dx}{aa-xx} = \frac{(Aa-Ax+B a+B x) dx}{aa-xx}$; omitiendo el denominador comun , dividiendo por dx , y traspasando sacaremos $1 + Ax = 0$;

$$\begin{array}{r} - Aa - Bx \\ - Ba \end{array}$$

luego $1 - Aa - Ba = 0$, y $A - B = 0$, de donde
re-

resultará $A = \frac{1}{2a}$, $B = \frac{1}{2a}$; luego $\frac{dx}{aa - xx} = \frac{\frac{1}{2a}dx}{a+x} + \frac{\frac{1}{2a}dx}{a-x}$, cuya integral es $\int \frac{dx}{aa - xx} = \frac{1}{2a} L(a+x) - \frac{1}{2a} L(a-x) + C = \frac{1}{2a} L\left(\frac{a+x}{a-x}\right) + C$.

Integremos ahora la fraccion

$\frac{10a^4 dx + 26a^3 x dx + 17a^2 x^2 dx + 3ax^3 dx}{(a+x)^2 (2a+x) (3a+x)}$ que sacamos (632) diferenciando $\frac{aa}{a+x} + 2aL(a+x) - aL(3a+x)$. Supondremos, pues, $\frac{10a^4 dx + 26a^3 x dx + 17a^2 x^2 dx + 3ax^3 dx}{(a+x)^2 (2a+x) (3a+x)} = \frac{(Ax+B)dx}{(a+x)^2} + \frac{Cdx}{2a+x} + \frac{Ddx}{3a+x}$; si lo reducimos todo al mismo denominador, omitimos despues el denominador comun, dividimos por dx , y traspasamos, sacaremos

$$\left. \begin{aligned} 10a^4 + 26a^3x + 17a^2x^2 + 3ax^3 \\ - 6Ba^2 - 5Bax - Bx^2 - Ax^3 \\ - 3Ca^3 - 6Aa^2x - 5Aax^2 - Cx^3 \\ - 2Da^3 - 7Ca^2x - 5Cax^2 - Dx^3 \\ - 5Da^2x - 4Dax^2 \end{aligned} \right\} = 0$$

luego $3a - A - C - D = 0$, $17a^2 - B - 5Aa - 5Ca - 4Da = 0$, $26a^3 - 5Ba - 6Aa^2 - 7Ca^2 - 5Da^2 = 0$, $10a^4 - 6Ba^2 - 3Ca^3 - 2Da^3 = 0$, de donde sacaremos $A = 2a$, $B = a^2$, $C = 2a$, $D = -a$. Por consiguiente la diferencial propuesta se transformará en estotra $\frac{(2ax+aa)dx}{(a+x)^2} + \frac{2adx}{2a+x} - \frac{adx}{3a+x}$, la misma cabalmente que hallamos antes. La integral de los dos últimos términos es patentemente $2aL(2a+x) - aL(3a+x)$; y por lo que mira al término $\frac{2ax+aa}{(a+x)^2} dx$, haremos $a+x = z$, y saldrá $x = z - a$, y $dx = dz$; tendremos, pues, $\frac{(2a(z-a)+a^2)dz}{z^2}$

ó $\frac{2adx}{x} - \frac{aadx}{x^2}$; cuya integral es $2aLx + \frac{aa}{x}$ ó $2aL(a+x) + \frac{aa}{a+x}$; por consiguiente la integral total es $\frac{aa}{a+x} + 2aL(a+x) + 2aL(2a+x) - aL(3a+x)$.

635 Este es el método general; pero hay otros muchos que facilitan la determinacion de los coeficientes. Por egemplo, se pueden hallar los coeficientes de las fracciones simples, sin que sea preciso conocer el valor de los unos para averiguar el de los demas. Sea $\frac{Ndx}{M}$, por egemplo, la fraccion propuesta; $bx+a$ uno de los factores del denominador, y P el cociente de M dividido por $bx+a$. Imaginemos $\frac{Ndx}{M}$ resuelta en $\frac{Adx}{hx+a}$, y $\frac{Qdx}{p}$; tendremos $\frac{Ndx}{M} = \frac{Adx}{hx+a} + \frac{Qdx}{p}$, ó $\frac{N}{M} = \frac{A}{hx+a} + \frac{Q}{p}$; luego reduciendo al mismo denominador, y teniendo presente el supuesto de ser $P = \frac{M}{hx+a}$ ó $P \times (bx+a) = M$, sacaremos $N = AP + Q(bx+a)$. Pero como de la diferenciacion de la equation $(bx+a)P = M$ sacamos $bPdx + (bx+a)dP = dM$; y se ha de verificar esta equation igualmente que la equation $N = AP + Q(bx+a)$ sea el que fuere el valor de x , se verificarán tambien las dos equations qualquiera cantidad que se substituya en lugar de x . Substituyamos, pues, en lugar de x el valor que dá el resultado mas sencillo; quiero decir, que substituyamos en lugar de x el valor $-\frac{a}{h}$ que resulta de suponer el denominador $bx+a=0$; en virtud de esto tendremos $bPdx = dM$, y $N = AP$. Substituyendo en la segunda el valor $P = \frac{dM}{hdx}$, que dá la primera, resultará $A = \frac{hNdx}{dM}$; luego para hallar el numerador A de qualquiera de las fracciones sencillas, se

ha

ha de dividir el numerador Ndx de la propuesta, por la diferencial dM de su denominador, y substituyendo en lugar de x el valor que resultaría de suponer igual á cero el denominador de la fraccion sencilla, se multiplicará el resultado por el coeficiente que llevare x en dicho denominador simple.

Por egeemplo, para determinar los numeradores A y B de las fracciones $\frac{Adx}{a+x}$ y $\frac{Bdx}{a-x}$, en que resolvimos antes la fraccion $\frac{dx}{aa-xx}$, diferenciaremos el denominador $aa-xx$, y resultará $-2xdx$. Dividiremos, pues, el numerador dx de la propuesta por $-2xdx$, y sacaremos $-\frac{1}{2x}$; y substituyendo succesivamente en esta espresion en lugar de x las cantidades $-a$ y a , que son los valores de x que resultan de suponer succesivamente iguales á cero los denominadores $a+x$ y $a-x$ de las fracciones parciales, y multiplicando por los valores 1 y -1 de b , sacaremos $\frac{1}{2a}$, y $\frac{1}{2a}$ que serán los valores de A y B , los mismos que hallamos antes.

636 Aunque son generales las reglas que acabamos de dar para integrar las fracciones racionales; no obstante quando son imaginarios algunos de los factores del denominador, se hallan integrales compuestas de imaginarias, cuyas integrales no dejan de ser reales; pero con dificultad se reducen á una forma real. Lo que importa en este caso es sacar todos los factores reales del denominador; hecho esto, se resuelve lo demas, no en factores del primer grado, sino en factores del segundo, que siempre serán

rán (II. 198) reales. Despues se formará respecto de cada factor del segundo grado que podemos representar por $ax^2 + bx + c$, una fraccion como $\frac{Ax dx + B dx}{ax^2 + bx + c}$, y se determinan los coeficientes como antes.

637 Si entre los factores del segundo grado, los hubiese iguales unos con otros, se tomará respecto de cada grupo ó conjunto de factores iguales una fraccion de esta forma
$$\frac{Ax^{2n-1} dx + Bx^{2n-2} dx + \dots + Q dx}{(ax^2 + bx + c)^n}$$
, representando n el número de los factores $ax^2 + bx + c$, que son iguales unos con otros.

638 Ya no nos falta sino declarar cómo se integran estas cantidades. Empecemos por la primera.

Supongamos, para mayor brevedad, que la fraccion parcial esté reducida á esta forma $\frac{A'x dx + B' dx}{x^2 + a'x + b'}$, conforme se puede conseguir siempre que se quiere, con dividir sus dos términos por a .

Hecho esto, eliminaremos el segundo término del denominador, haciendo $x + \frac{1}{2}a' = z$, de donde resulta $x = z - \frac{1}{2}a'$, y $dx = dz$; si substituimos, sacaremos una cantidad de esta forma $\frac{Cz dz + D dz}{z^2 + qq}$, cuya primera parte $\frac{Cz dz}{z^2 + qq}$ se integra (543) por logaritmos, y la segunda se integra por un arco de círculo cuyo radio $= q$, y la tangente $= z$.

Por lo que mira á las cantidades de esta forma

$\frac{Ax^{2n-1}dx + Bx^{2n-2}dx + \dots Qdx}{(x^2 + ax + b)^n}$; eliminaremos tam-

bien el segundo término del denominador, y resultará una cantidad de esta forma $\frac{Mz^{2n-1}dz + Nz^{2n-2}dz + \dots Tdz}{(zz + qq)^n}$,

que integraremos con reducir á $\frac{dz}{zz + qq}$ (629) la integral de la sumade los términos en que llevare z esponentes pares. Por lo tocante á los términos cuyos esponentes fuesen impares se integrarán por lo dicho (510), ó reduciéndolos (628) á $\frac{zdz}{(zz + qq)^n}$.

Luego toda fraccion racional, ó se integra cabalmente, ó se integra por arcos de círculo, y logaritmos.

De algunas transformaciones que pueden facilitar las integraciones.

639 No es posible dar acerca de este punto reglas generales; la forma de las cantidades, el egercicio, y el tino del calculador le sugieren en los casos que ocurren las transformaciones mas á propósito.

Las transformaciones que vamos á proponer sirven para hacer que sean racionales las diferenciales propuestas, porque en consiguiendo esto se consigue tambien su integracion. Acerca de esto haremos algunas prevenciones.

640 Si no hubiere sino radicales monomios, se les darán esponentes fraccionarios, reduciéndolos todos á un mis-

mo denominador. Si $x^{\frac{k}{l}}$ representare una de estas cantidades despues de la espresada reduccion, haremos $x^{\frac{1}{l}} = z$, que dará $x = z^l$, y $dx = lz^{l-1}dz$. Se hará la substitution correspondiente, y saldrá una cantidad enteramente racional. Por egemplo, si fuese la propuesta $\frac{dx\sqrt{x} + adx}{\sqrt[5]{x^2} + \sqrt{x}}$, la escribiríamos de este modo $\frac{x^{\frac{1}{2}}dx + adx}{x^{\frac{2}{5}} + x^{\frac{1}{5}}}$, despues la trans-

formaríamos en $\frac{x^{\frac{3}{5}}dx + adx}{x^{\frac{4}{5}} + x^{\frac{3}{5}}}$. Haciendo, pues, $x^{\frac{1}{5}} = z$,

sacaríamos $x = z^5$, $dx = 5z^4dz$; y por consiguiente $\frac{6z^3dz + 6az^2dz}{z^4 + z^3}$, que se reduce á $\frac{6z^3dz + 6az^2dz}{z + 1}$, y se integrará facilmente en virtud de lo que hemos dicho acerca de las fracciones racionales.

641 Toda cantidad que no llevare mas que un radical complejo que no pasare del segundo grado, y cuya variable debajo del radical no pasare del segundo grado, se podrá transformar en cantidad racional practicando qualquiera de las dos reglas siguientes. 1.º Despues de despejado el quadrado de la variable que el radical abraza, se igualará dicho radical con la misma variable, mas ó menos otra variable. 2.º Ó se resolverá la cantidad afecta del radical en sus dos factores; y despues de resuelta se la igualará con el uno de sus factores, multiplicado por una nueva variable.

Pon-

Pongo por caso que haya de integrar $\frac{dx}{\sqrt{(xx-aa)}}$; pue-
do hacer $\sqrt{(xx-aa)} = x - z$; y sacaré $x = \frac{zz+aa}{2z}$.
Luego $dx = \frac{(z-aa)dz}{2z}$, y $\sqrt{(xx-aa)} = \frac{aa-zz}{2z} = -\frac{(zz-aa)}{2z}$; de donde se saca que $\frac{dx}{\sqrt{(xx-aa)}} = -\frac{dz}{z}$, que es
una cantidad facil de integrar.

Tambien podria hacer en el mismo caso $\sqrt{(xx-aa)}$
ó $\sqrt{[(x-a)(x+a)]} = (x-a)z$; quadrando y divi-
diendo despues por $x-a$, sacaría $x+a = (x-a)zz$,
que daría $x = \frac{a+az^2}{z^2-1}$; $\sqrt{(xx-aa)} = \frac{2az}{z^2-1}$; $dx = \frac{-4azdz}{(z^2-1)^2}$; luego $\frac{dx}{\sqrt{(xx-aa)}} = \frac{-2dz}{z^2-1}$, que se integra por el mis-
mo método que las fracciones racionales.

642 Quando no hay segundo término en lo que co-
ge el radical, se puede igualar el radical con una nueva va-
riable multiplicada por la variable actual. Si la propuesta
fuese, por egemplo, $\frac{dx}{\sqrt{(aa-xx)}}$; podríamos hacer $\sqrt{(aa-xx)} = xz$. Y si la cantidad que el radical abraza llevare se-
gundo término, tambien serviría esta transformacion, con-
tal que primero se eliminase dicho segundo término.

643 Finalmente, con la mira de hacer que sea ra-
cional una diferencial propuesta, se puede igualar la va-
riable, ó una funcion qualquiera de la variable, con una
nueva variable, ó con una funcion de una nueva varia-
ble, en la qual se dejará alguna cosa indeterminada que
pueda servir para el intento del calculador. Pongo por
caso que queramos saber en qué casos se podrá hacer que
sea racional la cantidad $x^m dx (a+bx^n)^p$; haría $(a+bx^n)^p = z^q$, siendo q indeterminada; sacaría $a+bx^n =$

$$z^{\frac{q}{p}}; x^n = \frac{z^{\frac{q}{p}} - a}{b}; x = \left(\frac{z^{\frac{q}{p}} - a}{b} \right)^{\frac{1}{n}}; x^m = \left(\frac{z^{\frac{q}{p}} - a}{b} \right)^{\frac{m}{n}};$$

$$dx = \frac{q}{npb} z^{\frac{q}{p} - 1} dz \left(\frac{z^{\frac{q}{p}} - a}{b} \right)^{\frac{1}{n} - 1}; \text{ luego } x^m dx (a +$$

$$bx^n)^p = \frac{q}{npb} z^{\frac{q}{p}} + q - 1 dz \left(\frac{z^{\frac{q}{p}} - a}{b} \right)^{\frac{m}{n} + \frac{1}{n} - 1}, \text{ que es}$$

integrable sea q lo que fuere, quando $\frac{m+1}{n} - 1$ es un número entero positivo ó cero (495); y que conseguiremos que sea racional, haciendo $q=p$, quando $\frac{m+1}{n} - 1$ fuere un número entero negativo. Y si el valor de p fuese $\pm \frac{k}{2}$, siendo k un número entero impar, reduciremos la propuesta al caso espresado (640) con hacer $q=k$, si fuese $\pm \frac{k'}{2}$ el valor de $\frac{m+1}{n}$, siendo k' un número entero impar.

644 No nos detendremos mas en especificar estas transformaciones. Solo prevendremos que se facilitan en muchos casos ciertas integraciones, igualando la variable con una fraccion de esta forma $\frac{x}{1+x}$. Si se nos propusiera, por egemplo, $\frac{x^{15} dx + a dx}{x^{26} + x^{18}}$; con hacer $x = \frac{1}{1+z}$, sacaríamos $\frac{-1 dz + a dz}{1+z}$, que por medio de la division se podrá reducir á una serie de monomios, y á una cantidad de la forma $\frac{Adz}{1+z}$, cuya integral ya tenemos averiguada.

De la integracion de las cantidades que llevan dos ó mas variables.

645 El que tuviere presente la regla que dimos (326)

Tom.III.

Hh

pa-

para diferenciar las cantidades que llevan muchas variables, echará de ver que para integrar, quando es posible, las diferenciales con muchas variables, se han de juntar todos los términos afectos de la diferencial de una misma variable, é integrarlos como si no hubiera mas variable que esta, esto es, como si todas las demás fuesen constantes. Si despues se diferencia dicha integral considerando sucesivamente como variables todas las variables, y se resta el resultado de la diferencial propuesta, la integral que se hubiere hallado, será, añadiéndola una constante, la verdadera integral, en el supuesto de no quedar resta alguna. Si hubiere una resta, no llevará la variable que se consideró al tiempo de integrar; se practicará con esta resta lo propio que antes, y se proseguirá del mismo modo respecto de cada variable.

Si me tocára integrar $3x^2ydx + x^3dy + 5xy^4dy + y^5dx$; tomaría los dos términos en que está dx ; los integraría como si y fuese constante, y sacaría la integral $x^3y + y^5x$. Y como despues de diferenciada esta cantidad respecto de x é y , y restado el resultado de la diferencial propuesta, no queda nada, inferiré que la integral es $x^3y + y^5x + C$.

Si hubiera de integrar $x^3dy + 3x^2ydx + x^2dz + 12xzdx + xdx + y^2dy$; juntaría todos los términos afectos de dx ; integraría tratando y y z como constantes, y saldría $x^3y + x^2z + \frac{x^2}{2}$. Pero como despues de restada de la propuesta la diferencial de esta cantidad, sacándola en el

su-

supuesto de ser variables x , y y z , queda la resta $y^2 dy$, añadido $\frac{y^3}{3}$, que es la integral de $y^2 dy$, á la que hallé antes, y será por consiguiente $x^3 y + x^2 z + \frac{x^2}{2} + \frac{y^3}{3} + C$ la integral de la propuesta.

646 Pero como hay diferenciales con muchas variables que no se pueden integrar, es muy del caso dar una regla fija para conocer aquellas cuya integracion se puede conseguir.

647 Para esto es de reparar que si en una cantidad Q compuesta, como se quisiere, de otras dos cantidades x é y , se substituye primero en lugar de x una cantidad qualquiera p , y se substituye en el resultado en lugar de y una cantidad q , resultará lo mismo que si se hubiera empezado, substituyendo q en lugar de y , y despues p en lugar de x ; esto no tiene dificultad.

648 De aquí se infiere, que si se diferencia una cantidad qualquiera Q compuesta de x , y y constantes, mirando primero sola x como variable, y se diferencia despues el resultado, mirando sola y como variable, se sacará lo propio que si se hubiera diferenciado, mirando primero sola y como variable, y despues el resultado, mirando sola x como variable.

Porque si concebimos que con substituir $x + dx$ en lugar de x , Q se transforme en Q' ; será $Q' - Q$ la diferencial. Si concebimos que con substituir $y + dy$ en lugar de y , Q' se transforme en Q'' , y Q en Q''' , por manera que $Q' - Q$ llegue á ser $Q'' - Q'''$, será $Q'' - Q'''$

$Q''' - Q' + Q$ la segunda diferencial.

Hagamos ahora las substituciones al reves ; y una vez que con substituir $y + dy$, en lugar de y en Q , sale Q''' , será $Q''' - Q$ la primera diferencial en el supuesto de y variable. Si substituímos ahora en esta cantidad $x + dx$ en lugar de x , Q se transformará en Q' , como antes ; y Q''' (647) será Q'' , por manera que $Q''' - Q$ será $Q'' - Q'$; luego la segunda diferencial será $Q'' - Q' - Q''' + Q$, la misma cabalmente que la primera.

Sentado esto , es evidente que si A representa una cantidad compuesta de x é y , $\frac{dA}{dy} dy$ espresará la diferencial de A , sacada en el supuesto de que sea y la variable, $\frac{dA}{dx} dx$ será la diferencial de A en el supuesto de ser x la variable. Tambien espresará $\frac{ddA}{dxdy} \cdot dxdy$, que se diferenciò primero A , mirando como variable sola x , y que despues se diferenciò el resultado mirando como variable sola y .

649 Despues de todo este preliminar, sea $A dx + B dy$ una diferencial cabal, y M su integral ; será , pues, $\frac{dM}{dx} dx + \frac{dM}{dy} dy = A dx + B dy$; luego $\frac{dM}{dx} = A$, y $\frac{dM}{dy} = B$; luego tambien $\frac{ddM}{dxdy} dy = \frac{dA}{dy} dy$, y $\frac{ddM}{dydx} = \frac{dB}{dx}$, ó $\frac{ddM}{dxdy} = \frac{dA}{dy}$, y $\frac{ddM}{dydx} = \frac{dB}{dx}$; pero hemos probado poco ha (648) que $\frac{ddM}{dxdy} = \frac{ddM}{dydx}$; luego $\frac{ddM}{dxdy} = \frac{ddM}{dydx}$; luego tambien $\frac{dA}{dy} = \frac{dB}{dx}$; quiero decir, que si $A dx + B dy$ es una diferencial completa, la diferencial de A sacada mirando sola y como variable, y dividida por dy , ha de ser igual á la diferencial de B sacada en el supuesto de no haber mas variable que x , y dividida por dx .

Por

Por esto sabemos que $\frac{1}{3}y^3dx + xy^2dy$ es una diferencial completa, porque $\frac{d(\frac{1}{3}y^3)}{dy} = \frac{d(xy^2)}{dx}$, porque el primer miembro se reduce á $\frac{y^2dy}{dy}$, y el segundo á $\frac{y^2dx}{dx}$. Al contrario sabemos que $xydx + 2xdy$ no es integrable, porque $\frac{d(xy)}{dy}$ no es igual á $\frac{d(2x)}{dx}$.

650 Si hubiese mas de dos variables en la diferencial propuesta; quiero decir, si fuera de esta forma $A dx + B dy + C dz$, sería preciso para que fuese integrable que fuera $\frac{dA}{dy} = \frac{dB}{dx}$, $\frac{dA}{dz} = \frac{dC}{dx}$, $\frac{dB}{dz} = \frac{dC}{dy}$; con efecto, podremos mirar succesivamente z , y y x como constantes; y aunque en este supuesto tendrá la diferencial dos términos no mas, porque entonces $dz = 0$, ó $dy = 0$, ó $dx = 0$, no dejará por esto de ser una diferencial completa, si lo fuese la propuesta; tendrá, pues, en cada uno de estos dos casos las circunstancias que caracterizan las diferenciales completas con dos variables. Esto mismo manifiesta las condiciones que han de concurrir quando fuere mayor el número de las variables.

651 Acerca de lo que hemos dicho tenemos que hacer una prevencion muy del caso. Supongamos que sea Q una cantidad incógnita compuesta de x , y y constantes, y que conozcamos su diferencial $A dx$, sacada en el supuesto de ser y constante. Para sacar la diferencia total de Q , supondremos que es $A dx + B dy$; en cuyo supuesto ha de ser B de tal calidad que sea $\frac{dA}{dy} = \frac{dB}{dx}$; luego $dB = \frac{dA}{dy} dx$; integremos mirando como variable sola x , pues en B no he-

mos hecho variar mas que x . Tendremos $B = S \cdot \frac{dA}{dy} dx$; luego $Bdy = dyS \cdot \frac{dA}{dy} dx$. Y como suponemos que $A dx$ es la diferencial de Q sacada mirando x como variable, será $Q = S \cdot A dx$, integrando en el supuesto de no haber mas variable que x ; luego la diferencial completa de Q , ó de $S \cdot A dx$ es $A dx + dy S \cdot \frac{dA}{dy} dx$, previniendo que $S \cdot \frac{dA}{dy} dx$ se ha de integrar mirando y como constante.

De las Equaciones diferenciales.

652 Quando en la equacion diferencial propuesta no hay mas que dos variables x é y , y están en el un miembro todas las x y dx , y las y y dy en el otro; la integracion se reduce, respecto de cada miembro, á la práctica de las reglas que hemos dado acerca de las diferenciales con una sola variable.

Así, si hubiéramos de integrar $ax^m y^n dx = by^q x^r dy$, que puede representar todas las equaciones de dos términos; esta equacion cuyas indeterminadas se separan sobre la marcha dividiendo por y^n , y por x^r , se transforma en $ax^{m-r} dx = by^{q-n} dy$, cuya integral es evidentemente

$$\frac{ax^{m-r+1}}{m-r+1} = \frac{by^{q-n+1}}{q-n+1} + C.$$

653 Pero como puede suceder que uno ú otro, ó ninguno de los dos miembros de la equacion diferencial separada, sea integrable algebráicamente, y que no obstante la equacion pueda ser algebráica, ó puesta por lo menos en una forma algebráica; conviene tratar de los casos

mas

mas comunes en que esto puede suceder.

Por egemplo , si en la equacion antecedente fuera $m - r = -1$, y $q - n = -1$; la equacion diferencial se reduciría á $\frac{adx}{x} = \frac{b dy}{y}$, cuyos miembros no se pueden integrar sino por logaritmos ; por manera que será $aLx = bLy + LC$; porque tambien podemos suponer que la constante es un logaritmo. Pero podemos hacer que esta equacion sea algebraica , escribiéndola de este modo $Lx^a = Ly^b + LC$ ó $Lx^a + LCy^b$; pero se viene á los ojos que si los dos logaritmos fueren iguales , las dos cantidades á que pertenecen lo serán tambien ; luego $x^a = Cy^b$, que es una equacion algebraica.

654 Si solo $q - n$ fuera igual á -1 ; la equacion diferencial sería $ax^{m-r}dx = \frac{dy}{y}$, cuya integral es $\frac{ax^{m-r+1}}{m-r+1}$

$= bLy + LC$. A esta equacion se la puede dar tambien una forma algebraica , multiplicando el primer miembro por Le , siendo e el número cuyo logaritmo es 1 ; porque entonces no se alterará en nada el valor de la equacion.

Resultará , pues , $\frac{ax^{m-r+1}}{m-r+1} Le = bLy + LC$, ó

con hacer $m - r + 1 = p$, $\frac{ax^p}{Le^p} = LCy^b$, y por con-

siguiente $\frac{ax^p}{e^p} = Cy$. En adelante llamaremos siempre e

el número cuyo logaritmo = 1.

655 Servirá de segundo egemplo la equacion $ndx = \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}$; el segundo miembro representa el elemento de un arco de círculo cuyo seno $= z$, y el radio $= 1$. Es, pues, z el seno de $S. \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}$, esto es de $S. ndx$ ó de $nx + C$. Será, pues, la integral $z = \sin(nx + C)$. Por el mismo camino hallaríamos que de la equacion $ndx = \frac{-dz}{\sqrt{1-z^2}}$ se podria inferir que $z = \cos(nx + C)$.

656 Ya que $\frac{dz}{1+z^2}$ representa el elemento de un arco de círculo cuyo radio $= 1$, y la tangente $= z$; si tuviéramos $ndx = \frac{dz}{1+z^2}$, inferiríamos $z = \tan(nx + C)$. Pero si tuviéramos $ndx = \frac{bdz}{a+fz^2}$; la reduciríamos á la forma de la antecedente con hacer $z = mu$, siendo m un coeficiente constante; de donde sacaríamos $\frac{bmdz}{a+fz^2} = \frac{bmdz}{a+fm^2u^2}$; haciendo, pues, $fm^2 = a$, tendríamos $m = \sqrt{\frac{a}{f}}$, y sacaríamos $ndx = \frac{b\sqrt{\frac{a}{f}} du}{a + uua}$, de donde se saca $\frac{du}{1+uu} = \frac{n}{b} dx \sqrt{af}$; luego u , ó $\frac{z}{m}$, ó $z\sqrt{\frac{f}{a}} = \tan\left(\frac{n}{b} x\sqrt{af} + C\right)$. Luego $z = \sqrt{\frac{a}{f}} \times \tan \frac{n}{b} x\sqrt{af} + C$.

657 En las espresiones $\sin(nx + C)$, $\tan(nx + C)$ que acabamos de sacar, $nx + C$ espresa la longitud absoluta del arco en partes del radio 1. Pero como es mas acomodado hacer uso de los números de grados, que de las longitudes mismas, será preciso quando ocurriesen semejantes espresiones valuar los arcos en grados. Esto se consigue (487) con facilidad dividiéndolos por el número de las partes del radio que caben en un arco, esto es, por 0,0174533, ó lo que es lo propio, multiplicán-

do-

dolos por $57,2957795$. Así el seno del arco cuya longitud es b ; ó el seno de un arco que coge un número de grados. $= b \times 57,2957795$, son una misma cosa.

658 Si se nos propusiera $\frac{ndx}{\sqrt{(1-xx)}} = \frac{dy}{\sqrt{(1-yy)}}$, cuyos miembros espresan los elementos de dos arcos que estan uno con otro en razon de $1:n$, y cuyos senos son x é y ; para integrar empezáramos haciendo que fuese racional cada miembro, valiéndonos para el primer miembro del supuesto $\sqrt{(1-xx)} = x\sqrt{-1} - z$; y para el segundo del supuesto $\sqrt{(1-yy)} = y\sqrt{-1} - t$. La equacion se transformaría en $\frac{ndx}{x} = \frac{dy}{y}$, cuya integral es $nLz = Lt + LC$, de donde sacaríamos $Ct = z^n$; y con substituir en lugar de z y t sus valores, $C[y\sqrt{-1} - \sqrt{(1-yy)}] = [x\sqrt{-1} - \sqrt{(1-xx)}]^n$, que espresa generalmente la razon que hay entre los senos x é y de dos arcos multiplicados el uno por el otro.

Pero para valerse de esta equacion, es indispensable determinar primero la constante C . Supongamos, conforme es lícito, que es uno mismo el origen de los dos arcos; en este caso x é y llegarán á ser cero á un tiempo; pero entonces la equacion se transforma en $-C\sqrt{-1} = (-\sqrt{-1})^n$, ó $-C = (-1)^n$; pero $(-1)^n$ es $+1$ ó -1 , segun fuere n par ó impar; luego será $-C = \pm 1$, y $C = \mp 1$; sirviendo el signo superior para los casos en que n fuere par; y el inferior para quando n fuere impar; luego finalmente $\mp (y\sqrt{-1} - \sqrt{(1-yy)}) = [x\sqrt{-1} - \sqrt{(1-xx)}]^n$.

En

En cada caso particular se podrán eliminar las imaginarias ; pero lo mas facil será igualar con cero , despues de traspasado todo á un solo miembro , la suma de las cantidades reales ; hecho esto , será divisible por $\sqrt{-1}$ la equacion restante , y será la misma que se hubiere formado igualando con cero la suma de las cantidades reales. Por egemplo , si hacemos $n = 2$, tendremos $-y\sqrt{-1} + \sqrt{(1-yy)} = -xx - 2x\sqrt{-1}$. $\sqrt{(1-xx)} + 1 - xx$, ó $\sqrt{(1-yy)} + 2xx - 1 + 2x\sqrt{-1}$. $\sqrt{(1-xx)} - y\sqrt{-1} = 0$; Igualando , pues , con cero la suma de las cantidades reales , sacaremos $\sqrt{(1-yy)} + 2xx - 1 = 0$; y la equacion total quedará reducida á $2x\sqrt{-1}$. $\sqrt{(1-xx)} - y\sqrt{-1} = 0$, que despues de dividida por $\sqrt{-1}$ será $2x\sqrt{(1-xx)} - y = 0$, ó $y = 2x\sqrt{(1-xx)}$; pero si quadramos esta equacion , y la equacion $\sqrt{(1-yy)} + 2xx - 1 = 0$, ó mejor la equacion $\sqrt{(1-yy)} = 1 - 2xx$, sacaremos el mismo resultado.

Por el mismo camino se pueden hallar los cosenos y las tangentes de los arcos múltiplos. Por lo que pertenece á estas últimas , se integraría $\frac{ndx}{1+xx} = \frac{dy}{1+yy}$ (589) , resolviendo $1 + xx$ en $(1 + x\sqrt{-1})(1 - x\sqrt{-1})$, y $1 + yy$ en $(1 + y\sqrt{-1})(1 - y\sqrt{-1})$; y se concluiría lo demas por lo que hemos dicho acerca de las fracciones racionales.

659 Esto nos trae á la memoria un modo de espresar el seno y coseno de un arco , que puede ser de algun uso.

Sca,

Sea, pues, $dx = \frac{dy}{\sqrt{1-yy}}$, la equation que espresa la relacion entre un arco x , y su seno y . Si hacemos $\sqrt{1-yy} = y\sqrt{-1-z}$, sacaremos $dx = \frac{-dz}{2\sqrt{-1}}$, ó $\frac{dz}{z} = -dx\sqrt{-1}$, cuya integral es $Lz = -x\sqrt{-1} + LC$, ó $Lz = -x\sqrt{-1} Le + LC$ (654), que dá $z = Ce^{-x\sqrt{-1}}$; y substituyendo en lugar de z su valor, resultará $y\sqrt{-1} = 1 - \sqrt{1-yy} = Ce^{-x\sqrt{-1}}$. Para determinar la constante C , es de observar que el arco x y su seno han de llegar á ser cero á un tiempo; será, pues, $-\sqrt{1} = C$; luego $y\sqrt{-1} = 1 - \sqrt{1-yy} = e^{-x\sqrt{-1}}$, y por consiguiente $\sqrt{1-yy} = y\sqrt{-1} + e^{-x\sqrt{-1}}$; qua-

drando, y reduciendo, sacaremos $y = \frac{1 - e^{-2x\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1} \cdot e^{-x\sqrt{-1}}}$

$= \frac{e^{x\sqrt{-1}} - e^{-x\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}}$; luego una vez que y es seno de x ,

será sen $x = \frac{e^{x\sqrt{-1}} - e^{-x\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}}$.

Si en el segundo miembro de la equation $\sqrt{1-yy} = y\sqrt{-1} + e^{-x\sqrt{-1}}$, substituímos en lugar de y el valor que acabamos de hallar, resultará $\sqrt{1-yy}$, esto es,

$\cos x = \frac{e^{x\sqrt{-1}} - e^{-x\sqrt{-1}}}{2} + e^{-x\sqrt{-1}} = \frac{e^{x\sqrt{-1}} + e^{-x\sqrt{-1}}}{2}$;

luego $\cos x = \frac{e^{x\sqrt{-1}} + e^{-x\sqrt{-1}}}{2}$. Volvamos á la inte-

gracion de las equations.

Quan-

660 Quando las indeterminadas no están separadas en la equacion diferencial propuesta, antes de separarlas se ha de indagar si acaso sería integrable la equacion conforme viene propuesta. Esto sucederá (649) quando $\frac{dA}{dx} = \frac{dB}{dy}$, en el supuesto de que $A dx + B dy = 0$ represente dicha equacion. En este caso se integraría por lo dicho (645).

661 Podría sin embargo ser integrable la equacion, aunque esta condicion no se verificára; pero para esto sería preciso multiplicarla por un factor que hiciese al caso compuesto de x , y y constantes.

Sea P este factor; será, pues, $AP dx + BP dy = 0$ una diferencial completa. Es, pues, preciso que $\frac{d(AP)}{dy} = \frac{d(BP)}{dx}$. Luego se reduce únicamente la cuestion á hallar en lugar de P una funcion de x, y y constantes, que cumpla con la equacion. Pero como esta investigación es sumamente penosa, nos ceñiremos á buscar el valor de P para el caso en que no ha de llevar mas que x y constantes, ó y y constantes. Supongamos, pues, que no ha de haber en P mas que x , tendremos $P \frac{dA}{dy} = B \frac{dP}{dx} + P \frac{dB}{dx}$, de donde se saca $\frac{dP}{P} = \frac{\left(\frac{dA}{dy} - \frac{dB}{dx}\right) dx}{B}$; se hallará, pues, facilmente el valor de P , si $\frac{\frac{dA}{dy} - \frac{dB}{dx}}{B}$ se redugere á una funcion de x , como es preciso para que sea P , segun suponemos, una funcion de x solá.

662 Por este camino se puede hallar generalmente la

la integral de toda equacion de la forma siguiente : $Xy^q dy + X'y^{q+1} dx + X''y^r dx = 0$, siendo X , X' , X'' cualesquiera funciones de x ; y q y r cualesquiera esponentes.

Podríamos probar si es integrable multiplicandola por un factor de la forma Py^n , siendo P una funcion de x , y n un esponente indeterminado; y hallaríamos que lo sería con efecto, si hiciéramos $n = -r$. Pero es mas natural reducir sobre la marcha la equacion á esta forma $y^{q-r} dy + Fy^{q-r+1} dx + F' dx = 0$, dividiendo por X , y por y^r , y representando por F y F' los cocientes $\frac{X'}{X}$, $\frac{X''}{X}$. Hecho esto, para integrar la última equacion supondremos que P sea el factor, siendo P una funcion de x . Tendremos, pues, $Py^{q-r} dy + FPy^{q-r+1} dx + F'P dx = 0$. Pero si fuese P una funcion de x , $F'P$ lo será tambien; se reducirá, pues, $S. F'P dx$ á la integración de las cantidades que llevan sola una variable. Solo falta, pues, hacer que $Py^{q-r} dy + FPy^{q-r+1} dx$ sea una diferencial completa; para cuya circunstancia es preciso que $\frac{d(Py^{q-r})}{dx} =$

$$\frac{d(FPy^{q-r+1})}{dy}; \text{ esto es, que } y^{q-r} \frac{dP}{dx} = (q-r+1)y^{q-r}FP;$$

de donde se saca $\frac{dP}{P} = (q-r+1)Fdx$; é integrando $LP = S.(q-r+1)Fdx = S.(q-r+1)Fdx$. Le; luego $P = e^{S.(q-r+1)Fdx}$. Substituyendo este valor de P en la equacion $Py^{q-r} dy + \&c.$ é integrando, sacaremos

$$\frac{y^{q-r+1}}{q-r+1} e^{S.(q-r+1)Fdx} + S.F'dxe^{S.(q-r+1)Fdx} + C = 0.$$

No

No hemos añadido constante alguna despues de integrada la equacion que ha dado P , porque como no hay ninguna condicion para determinarla, está en nuestra mano suponerla nula.

Supongamos, por egemplo, que hayamos de integrar $dy + \frac{aydx}{x} + (bx^2 + cx + f)dx = 0$. Multiplicando por el factor P , sacaremos $Pdy + \frac{ayPdx}{x} + P(bx^2 + cx + f)dx = 0$; es, pues, preciso que $\frac{dP}{dx} = d\left(\frac{ayP}{x}\right) = \frac{aP}{x}$; luego $\frac{dP}{P} = \frac{adx}{x}$; luego $LP = aLx$, ó $P = x^a$. Se transforma, pues, la equacion en $x^a dy + ax^{a-1}ydx + bx^{a+2}dx + cx^{a+1}dx + fx^a dx$, cuya integral es $x^a y + \frac{bx^{a+3}}{a+3} + \frac{cx^{a+2}}{a+2} + \frac{fx^{a+1}}{a+1} + C = 0$.

663 La equacion general que acabamos de integrar, ocurre con bastante frecuencia, y el método que hemos dado se puede aplicar á otros muchos casos, como los que vamos á proponer.

Si hubiéramos de integrar las dos equaciones $dx + ady + (bx + cy)Tdt = 0$, $kdx + a'dy + (b'x + c'y)Tdt = 0$, siendo x , y y t tres variables; a , b , c , a' constantes, y T una funcion qualquiera de t ; hallaremos la integral de estas dos equaciones por el método antecedente, practicando lo que sigue. Multiplicaremos una de las dos, pongo por caso la primera, por un coeficiente indeterminado y constante g ; y añadiendo el resultado á la segunda,

mul-

multiplicaremos el total por un factor P , que supondremos sea una funcion de t ; resultará $(gP + kP)dx + (gaP + a'P)dy + [(gbP + b'P)x + (gcP + c'P)y] Tdt = 0$. Supongamos ahora que esta equation sea una diferencial cabal; será preciso (650) que 1.º $\frac{d(gP+kP)}{dt} = \frac{d[(gbP+b'P)x+(gcP+c'P)y]}{dt}$; 2.º $\frac{d(gaP+a'P)}{dx} = \frac{d[(gbP+b'P)x+(gcP+c'P)y]}{dy}$; 3.º $\frac{d(gP+kP)}{dy} = \frac{d(gaP+a'P)}{dx}$. Y como suponemos que P es una funcion de t , la última equation se reduce á $0 = 0$. Las otras dos dán $(g+k) \frac{dP}{dt} = (gb+b')P$, y $(ga+a') \frac{dP}{dt} = (gc+c')P$; de donde se saca $\frac{dP}{P} = \frac{gb+b'}{g+k} dt$, y $\frac{dP}{P} = \frac{gc+c'}{ga+a'} dt$; luego si formamos una equation con estos dos valores de $\frac{dP}{P}$, y dividimos por dt , sacaremos $\frac{gb+b'}{g+k} = \frac{gc+c'}{ga+a'}$ en cuya equation asciende g al segundo grado, y de cuya resolucion se sacan dos valores de g .

Por consiguiente, si suponemos g conocida, sacaremos facilmente P ; pues la equation $\frac{dP}{P} = \frac{gb+b'}{g+k} dt$ dá $P = e^{\frac{gb+b'}{g+k} t}$. Como la equation $(gP + kP)dx + \&c.$ es ya una diferencial completa, si la integramos, sacaremos $(gP + kP)x + (gaP + a'P)y + C = 0$; luego si espresare g el primer valor de g que diere la equation de segundo grado, de que hablamos poca ha, y representare g' el segundo valor de g , y P' lo que es P , despues de substituida g' en lugar de g , tambien tendremos $(g'P' + kP')x + (g'aP' + a'P')y + C' = 0$, siendo C una nueva constante. Esto lo prevenimos, porque no hay razon ninguna para hacer uso del uno de los valores de g , y no del otro.

otro. Será fácil inferir de estas dos equaciones los valores de x é y , que no llevarán mas que t y constantes.

Si hubiera quatro variables x, y, z y t espresadas por tres equaciones de esta forma $adx + bdy + cdz + (ex + fy + bz)Tdt = 0$; se integrarian del mismo modo multiplicando la segunda y tercera por cantidades indeterminadas y constantes g, g' ; añadiendo despues los dos productos á la primera, multiplicaríamos el total por un factor P , que supondríamos ser una funcion de t no mas. Suponiendo entonces que esta nueva equacion fuese una diferencial cabal, hallaríamos por lo dicho (650) las equaciones que han de determinar g, g' y P . La equacion que determinare g , ó la que determinare g' , será de tercer grado; se hallarán, pues, tres valores de g , tres correspondientes de g' , y tres correspondientes de P ; de donde resultarán, mudando la constante en cada valor de g , tres integrales que facilitarán la determinacion de x, y, z en t .

Es fácil percibir lo que se debería practicar respecto de un número mayor de variables, con tal que las equaciones tuviesen la forma de las precedentes. El método sería tambien el mismo, aun quando hubiere uno ó muchos términos compuestos no mas que de t, dt y constantes.

664 Pero si tuviéramos en general un número m qualquiera de equaciones que tuviesen $m + 1$ variables, combinadas unas con otras de qualesquiera modo, se multipli-

ca-

caría la segunda, la tercera &c. hasta la última respectivamente por cantidades g, g', g'' &c. que se supondría que fuesen funciones indeterminadas de dichas variables; se añadirán á la primera, multiplicándolo despues todo por un factor P que también se supondrá ser una funcion de las mismas variables, se supondrá que la equacion total es una diferencial completa. Si tuviéramos, por egemplo, las dos equaciones $A dx + B dy + C dz = 0, A' dx + B' dy + C' dz = 0$; multiplicaríamos la segunda por g ; añadiendo el producto á la primera, y multiplicándolo todo por P , resultaría $P(A + A'g)dx + P(B + B'g)dy + P(C + C'g)dz = 0$. Pero para que esta sea una diferencial completa es preciso (650) que $\frac{d[P(A+A'g)]}{dy} = \frac{d[P(B+B'g)]}{dx}$; $\frac{d[P(A+A'g)]}{dz} = \frac{d[P(C+C'g)]}{dx}$; $\frac{d[P(B+B'g)]}{dz} = \frac{d[P(C+C'g)]}{dy}$. Esto es, $\frac{dP}{dy}(A + A'g) + P \frac{d(A+A'g)}{dy} = \frac{dP}{dx}(B + B'g) + P \frac{d(B+B'g)}{dx}$, $\frac{dP}{dz}(A + A'g) + P \frac{d(A+A'g)}{dz} = \frac{dP}{dx}(C + C'g) + P \frac{d(C+C'g)}{dx}$; $\frac{dP}{dz}(B + B'g) + P \frac{d(B+B'g)}{dz} = \frac{dP}{dy}(C + C'g) + P \frac{d(C+C'g)}{dy}$.

Si por medio de las dos últimas equaciones sacámos los valores de $\frac{dP}{dx}$, y de $\frac{dP}{dy}$, y los substituimos en la primera, tendremos, despues de egecutadas las reducciones correspondientes, $(C + C'g) \left(\frac{d(A+A'g)}{dy} - \frac{d(B+B'g)}{dx} \right) + (A + A'g) \left(\frac{d(B+B'g)}{dz} - \frac{d(C+C'g)}{dy} \right) + (B + B'g) \left(\frac{d(C+C'g)}{dx} - \frac{d(A+A'g)}{dz} \right) = 0$, que es una equacion independiente de P . Buscaremos, pues, para g una funcion de x, y y z , la mas general que se pueda, que pueda cumplir con dicha equacion. Despues de determinada g , se buscará para P una

funcion de x , de y , y de z , que cumpla con dos cualesquiera de las tres equaciones que hallamos primero; esto empeña las mas veces en investigaciones muy arduas, pero se puede conseguir.

Hemos de prevenir que si no hubiera mas que una equation; quiero decir, si tuviéramos $A' = 0$, $B' = 0$, $C' = 0$; la última equation que acabamos de hallar, se reduciría á $C\left(\frac{dA}{dy} - \frac{dB}{dx}\right) + A\left(\frac{dB}{dz} - \frac{dC}{dy}\right) + B\left(\frac{dC}{dx} - \frac{dA}{dz}\right) = 0$; que por ser una equation de condicion entre los coeficientes A, B, C manifiesta que para que sea integral una equation $A dx + B dy + C dz = 0$ con tres variables, es indispensable que los coeficientes A, B, C tengan la relacion que espresa la equation $C\left(\frac{dA}{dy} - \frac{dB}{dx}\right) + \&c. = 0$. Una vez que se ha cumplido con esta condicion, se determina el factor P , de modo que cumpla con dos de las tres equaciones $\frac{d(AP)}{dy} = \frac{d(BP)}{dx}$, $\frac{d(AP)}{dz} = \frac{d(CP)}{dx}$, $\frac{d(BP)}{dz} = \frac{d(CP)}{dy}$.

Con esto se echa de ver lo que se ha de hacer quando son mas las equaciones, y las variables; y por el mismo camino se puede hallar quales son las equaciones, en que bastará que sea g una constante, ó una funcion de la una, ó de dos de las variables, &c.

665 Quando la equation diferencial propuesta no está en ninguno de los casos espresados hasta (664); se ha de procurar separar las indeterminadas. En algunas ocasiones se consigue esto con solo el auxilio de las reglas ordinarias del Álgebra; en otras es preciso acudir á las transformaciones. Pero hay muchas equaciones respecto de las quales

no se sabe qual es la transformacion conveniente.

La equacion $ax^n dx + by^q x^n dx = y^k dy (e + fx^h)^r$ se separa inmediatamente por medio de la division , porque es la misma que $(a + by^q) x^n dx = y^k dy (e + fx^h)^r$ que se transforma en $\frac{x^n dx}{(e + fx^h)^r} = \frac{y^k dy}{a + by^q}$, cuya integracion depende de la integracion de las cantidades binomias de una sola variable.

Pero si la propuesta fuese $gxdx = (ax^4 ydy + 2abx^2 y^3 dy + abby^5 dy)$; se echa de ver que se podria escribir de este modo $gxdx = (x^4 + 2bx^2 y^2 + by^4) aydy$. Se echa de ver tambien que se la podrá dar despues esta forma $gxdx = (x^2 + by^2)^2 \times aydy$. Con tal que se la considere con un poco de cuidado, se echa de ver que se podrá hacer la separacion, haciendo $x^2 + by^2 = z$, porque tendremos $x^2 = z - by^2$, y $x dx = \frac{1}{2} dz - by dy$; luego egecutando las substituciones correspondientes , resultará $\frac{1}{2} g dz - by y dy = azz y dy$. De donde se saca $\frac{\frac{1}{2} g dz}{bg + azz} = y dy$, que es facil de integrar.

666 Como no es posible dar reglas generales acerca de las transformaciones, nos ceñiremos á manifestar algunos casos generales en que se puede egecutar la separacion.

Se puede egecutar generalmente en todas las equaciones homogeneas de dos variables ; esto es , en aquellas en que las dos indeterminadas x é y tienen en cada término,

ora estén juntas , ora estén solas , la misma suma de dimensiones.

Con efecto, imaginemos que $A dx + B dy = 0$ o sea una equacion homogenea , y que lo dividamos todo por una potencia de x , cuyo esponente sea igual al número de las dimensiones de la equacion ; se echa de ver que no habrá en A y B sino potencias de $\frac{y}{x}$ y constantes ; por manera que la equacion será $F dx + F' dy = 0$, siendo F y F' funciones de $\frac{y}{x}$ y constantes. Sentado esto , ya que $d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x dy - y dx}{xx}$, será $dx = \frac{-xx}{y} \times d\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{x}{y} dy$; luego si hacemos $\frac{y}{x} = z$, será $dx = -\frac{y dz}{z} + \frac{dy}{z}$; luego si substituimos en lugar de $\frac{y}{x}$ y dx sus valores , tendremos $-\frac{F y dz}{z} + \frac{F dy}{z} + F' dy = 0$, siendo F y F' funciones de z y constantes. Esta equacion dá $\frac{dy}{y} = \frac{F dz}{F + F' z}$, que es una equacion separada , porque en F y F' no hay mas variable que z .

Si la propuesta fuese , por egemplo , $y^3 dx + y^2 x dy + b x^3 dy = 0$, que es homogenea , y cuyo número de dimensiones es 3 ; dividiríamos por x^3 , y saldria $\frac{y^3}{x^3} dx + \frac{y^2}{x^2} dy + b dy = 0$; haciendo , pues , $\frac{y}{x} = z$, ó $x = \frac{y}{z}$, saldria $dx = \frac{y dz - y dz}{z^2}$; substituyendo en la propuesta , sacaríamos $z^2 dy + y z dz + z^2 dy + b dy = 0$, de donde inferiríamos $\frac{dy}{y} = \frac{z dz}{2z^2 + b}$, cuya integral es $Ly = \frac{1}{4} L(z^2 + b) + LC$, que dá $y = C(z^2 + b)^{\frac{1}{4}}$, ó $y^4 = C^4(z^2 + b)$, ó finalmente $y^4 = C^4\left(\frac{y^2}{x^2} + b\right)$, despues de substituido en lugar de z su valor $\frac{y}{x}$.

667 Sería , pues , sumamente util poder conseguir fuesen homogeneas las equaciones. Pero para esto no hay mé-

método alguno general , y es preciso acudir á las transformaciones. Las que pueden servir con alguna esperanza de encaminar al fin que se desea , consisten en igualar una de las variables , ó una funcion de dicha variable , ó una funcion de las dos , con una funcion de una nueva variable con esponentes indeterminados. Despues se determinan estos esponentes , en virtud de la condicion de que sea homogenea la equacion transformada.

Si queremos saber , por egemplo , en qué casos la equacion $ax^m dx + by^n x^q dy + cy^k dy = 0$, que puede representar qualquiera equacion de tres términos , puede llegar á ser homogenea ; haremos $x = z^h$; y tendremos $abz^{mh+h-1} dz + by^n z^{qh} dy + cy^k dy = 0$. Pero para que esta sea homogenea es preciso que sea $k = qb + n$; y $k = mb + h - 1$, de donde se saca $h = \frac{n+1}{m-q+1}$, y $k = \frac{mn+q+1-n}{m-q+1}$; así , si los esponentes k , q , m y n fueren tales que se verifique la última equacion , se podrá hacer que sea homogenea la propuesta , y por consiguiente separar.

668 En general , por no haber métodos directos , se procura reducir las equaciones propuestas á otras equaciones cuya integracion sea conocida. Así se practica , por egemplo , con la equacion particular $dy + ay^2 dx = bx^m dx$, llamada la equacion de *Ricati* , y que no se sabe cómo se integra sino quando tiene m ciertos valores determinados.

Si m fuese cero , sería $dy + ay^2 dx = b dx$, que es separable , y dá $\frac{dy}{b-ay^2} = dx$, cuya integral es facil de hallar.

Pero quando son otros los valores de m , es preciso

para integrar la equacion , transformarla en otra , donde ay^2 y b estén multiplicadas por una misma potencia de x ; con esto será separable. Para determinar los valores de m que consienten esta transformacion , se practica lo siguiente. Hagamos $y = Ax^p + x^q t$; tendremos $dy = pAx^{p-1}dx + qx^{q-1}tdx + x^q dt$; substituyendo , sale

$$\left. \begin{aligned} & pAx^{p-1}dx + qx^{q-1}tdx + x^q dt + ax^{2q} ttdx \\ & + aAAx^{2p}dx + 2aAx^{p+q}tdx \end{aligned} \right\} = bx^m dx.$$

Supongamos $p = 1 = 2p$, $pA + aAA = 0$, $p + q = q - 1$, $q + 2aA = 0$; tendremos $p = -1$, $A = \frac{1}{a}$, $q = -2$, con lo que se transforma la transformada en $x^{-2} dt + ax^{-4} ttdx = bx^m dx$, ó $dt + ax^{-2} ttdx = bx^{m+2} dx$, que será separable , si $m = -4$. Hagamos en esta $t = \frac{1}{z}$, se transformará en $dz + bx^{m+2} z z dx = ax^{-2} dx$. Luego si hacemos $z = A'x^{p'} + x^{q'} t'$, y hacemos lo mismo que antes , resultará

$$\left. \begin{aligned} & p'A'x^{p'-1}dx + q'x^{q'-1}t'dx + x^{q'}dt' + bx^{2q'+m+2}t't'dx \\ & + bA'^2x^{2p'+m+2}dx + 2bA'x^{p'+q'+m+2}t'dx \end{aligned} \right\} = ax^{-2}dx$$

Si suponemos $2p' + m + 2 = p' - 1$, $p'A' + bA'^2 = 0$, $q' + 2bA' = 0$, $q' - 1 = p' + q' + m + 2$, tendremos $p' = -m - 3$, $A' = \frac{m+3}{b}$, $q' = -2m - 5$, y $x^{-2m-6} dt' + bx^{-3m-10} t't'dx = ax^{-2} dx$, ó $dt' + bx^{-m-4} t't'dx = ax^{2m+4} dx$, que será separable si $-m - 4 = 2m + 4$, ó si $m = -\frac{8}{3}$.

Si hacemos $t' = \frac{1}{z'}$, despues $z' = A''x^{p''} + x^{q''} t''$, y proseguimos siempre del mismo modo , hallaremos sucesivamente que la equacion será separable quando $m = -\frac{12}{5}$,

$m = -\frac{16}{7}$, $m = -\frac{20}{9}$, &c. quiero decir, en general, quando $m = \frac{-4r}{2r+1}$, siendo r un número entero positivo.

Y retrocediendo ácia las substituciones precedentes, hallaremos que la espresion $dy =$

$$Ax^{-1} + x^{-2} \left(\frac{1}{A'x^{-m-3} + x^{-2m-6}} \left(\frac{1}{A''x^{-2m-5} + x^{-4m-10}} \left(\frac{1}{A'''x^{-3m-7} + \&c.} \right. \right. \right.$$

prosiguiendo hasta que el primer término en x en el uno de los denominadores, tenga el esponente $-rm - 2r - 1$; y entonces el segundo término ha de ser $x^{-2rm-4r-2}t$; siendo t una variable que, despues de la substitucion de este valor de y , se determina por la integracion de la equacion resultante que entoncés es separable.

Volvamos á la equacion $dy + ay^2dx = bx^m dx$, é imaginemos que en lugar de substituir primero $y = Ax^p + x^q t$, conforme hicimos antes, hagamos primero $y = \frac{1}{x}$, y despues $z = Ax^p + x^q t$, y prosigamos practicando lo mismo que antes; inferiremos tambien que se podrá egecutar la separacion siempre que $m = \frac{-4r}{2r+1}$, siendo r un número entero positivo. Y el valor de y será

$$y = \frac{1}{Ax^{-m-1} + x^{-2m-2}} \left(\frac{1}{A'x^{-2m-3} + x^{-4m-6}} \left(\frac{1}{A''x^{-3m-5} + \&c.} \right. \right.$$

prosiguiendo al mismo tenor hasta que el primer término en x en el último denominador sea $-m(r+1)-2r-1$; y entonces el segundo término ha de ser $x^{-(2m+2)(r+1)-2}t$.

Se reducirá á los mismos casos la equacion $x^q dy + ay^2 x^n dx = bx^m dx$, dividiendo por x^q , y haciendo despues $x^{n-q+1} = z$.

Estos son los medios generales que sirven quando las dx y las dy no pasan del primer grado. Por lo que mira á las equaciones en que hubiese diferentes potencias de dx y dy ; como no pueden menos de ser homogeneas respecto de dx y dy , se dividirá todo por dx elevada á una potencia igual á la suma de las dimensiones de dx y dy ; se resolverá la equacion mirando $\frac{dy}{dx}$ como la incógnita. Como entonces dx y dy no serian mas que del primer grado, se probará si se le pueden aplicar á esta equacion los métodos antecedentes.

TRIGONOMETRÍA

ESFÉRICA.

Fíg.

669 **E**S escusado prevenir que dá la Trigonometría 263.
 esférica métodos para calcular los triángulos
 esféricos. Por triángulo esférico entendemos una porción de
 la superficie de la esfera, comprendida entre tres arcos
 de círculo, que tienen todos tres sus centros en el centro
 mismo de la esfera, y que por consiguiente son tres ar-
 cos de círculos máximos de la misma esfera.

Si concebimos que desde los tres ángulos A, F, G del
 triángulo esférico AFG se hayan tirado tres radios $AC, FC,$
 GC al centro C de la esfera, podremos considerar el espa-
 cio $CAFG$ como una pirámide triangular, cuyo vértice está
 en el centro C de la esfera, y cuya base AFG es curva, y
 es una porción de la superficie de la misma esfera. Los ar-
 cos AF, FG, AG , que son los lados curvilíneos de la ba-
 se, son el concurso de la superficie de la esfera con los
 planos ACF, FCG, GCA , que forman las caras de la es-
 presada pirámide.

La medida del ángulo A comprendido entre los dos
 arcos AF, AG es el ángulo rectilíneo IAK comprendi-
 do entre las tangentes AI, AK de los dos arcos. Cada una
 de estas tangentes está en el plano del círculo cuya es, y son
 ambas perpendiculares al radio CA (I. 346), que es la in-
 tersección de los dos planos ACF, ACG ; luego (I. 531) el
 án-

Fig. ángulo que forman sus dos tangentes es el mismo que forman los dos planos ACF , ACG de los dos arcos; luego

670 1.º Un ángulo esférico cualquiera FAG no se distingue del ángulo que forman los planos de sus dos lados AF, AG .

671 2.º Los ángulos formados por los arcos de círculo máximo que se encuentran en la superficie de la esfera, tienen las mismas propiedades que los ángulos planos; esto es las propiedades de que hablamos (I. 298, 299 y 302).

672 Luego dos lados de un triángulo esférico son perpendiculares uno á otro, quando los planos en que están son perpendiculares uno á otro.

Si imaginamos prolongados ácia todas las direcciones los dos planos ACG , ACF , es patente que la seccion que cada uno formáre en la esfera, será un círculo máximo, y que estos dos círculos máximos se cortarán mutuamente en dos partes iguales en los puntos A y D de la interseccion comun AC prolongada; porque como los dos planos pasan por el centro, su interseccion comun será un diámetro de la esfera.

673 Luego dos lados contiguos AG , AF de un triángulo esférico no se pueden volver á encontrar sino en el punto D , que dista 180° de su origen.

674 Si tomamos los dos arcos AB , AE , cada uno de 90° , y hacemos que por los dos puntos B y E , y el centro C pase un plano, cuya seccion con la esfera forme el círculo máximo $BENMO$; este círculo será perpendicular á los dos círculos ABD , AED .

Por-

Porque si tiramos los radios BC , EC , los ángulos Fig. ACB , cuya medida es el arco AB de 90° , y ACE cuya medida es el arco AE tambien de 90° , serán rectos; luego la línea AC será perpendicular á las dos rectas CE , BC ; luego (I. 537) es perpendicular á su plano; esto es, al círculo $BENMO$; luego los dos círculos AED , ABD , que pasan por la recta AD , son tambien perpendiculares al mismo círculo (I. 532); luego recíprocamente, el mismo círculo es perpendicular á los espresados AED , ABD .

Como no le hemos señalado cantidad alguna determinada al ángulo GAF ó EAB , es evidente que lo mismo se verificará, sea la que fuere la cantidad de dicho ángulo, y que por consiguiente el círculo $BENMO$ es perpendicular á todos los círculos que pasan por la recta AD .

La recta AD se llama el *Eje* del círculo $BENMO$, y los dos puntos A y D , que están ambos en la superficie de la esfera, se llaman los *Polos* del mismo círculo.

675 Inferamos, pues, 1.º que los polos de un círculo máximo qualquiera están á igual distancia de todos los puntos de la circunferencia del mismo círculo máximo; y su distancia á cada uno de dichos puntos, cuya medida es un arco de círculo máximo, es un arco de 90° .

Y recíprocamente, si un punto qualquiera A de la superficie de la esfera, está á la distancia de 90° de dos puntos B y E de un arco de círculo máximo, el punto A será el polo de este círculo máximo.

676 2.º Que quando un arco BF de círculo máximo

Fig. es perpendicular á otro arco BE de círculo máximo, pasa indispensablemente por el polo de este, ó pasaría por lo menos si se prolongára bastante.

677 3.º Que si dos arcos BF , EG de círculo máximo son perpendiculares á otro arco BE de círculo máximo, el punto A donde concurren es el polo de este último.

678 Una vez que las dos rectas BC , EC son perpendiculares al mismo punto C de la recta AD , el ángulo BCE que forman, será (I. 531) la medida de la inclinacion de los dos planos ABD , AED , ó del ángulo esférico EAB ó GAF ; luego

Un ángulo esférico GAF tiene por medida el arco BE de círculo máximo, que forman á la distancia de 90° del vértice sus lados, prolongados si fuere menester.

679 Si imaginamos que el semicírculo ABD dé la vuelta al rededor del diámetro AD , y que desde los diferentes puntos R , B , H de su circunferencia, se tiren á AD las perpendiculares RQ , BC , HP ; podremos inferir

1.º Que cada uno de dichos puntos trazará una circunferencia de círculo, cuyo centro estará en el punto de AD donde cae dicha perpendicular, y el radio será la misma perpendicular.

2.º Que los arcos RS , BE , HL trazados en virtud de este movimiento, é interceptados entre los dos planos ABD , AED , serán todos de un mismo número de grados.

Porque si tiramos las líneas SQ , EC , LP , serán todas perpendiculares á AD , pues no son otra cosa que los

ra-

radios RQ , BC , HP , que están en el plano AED ; luego (I. 531) cada uno de los ángulos RQS , BCE , HPL , ó cada uno de los arcos RS , BE , HL mide la inclinación de los dos planos ABD , AED ; luego todos los expresados arcos son de un mismo número de grados.

3.º *Las longitudes de dichos arcos RS , BE , HL son proporcionales á los senos de los arcos AR , AB , AH que miden las distancias á que cada uno de ellos está de un mismo polo A , ó, lo que es lo propio, á los cosenos de las distancias á que están del círculo máximo, al qual son paralelos.*

Porque es evidente que siendo semejantes dichos arcos son proporcionales á sus radios RQ , BC , HP que son los senos de los arcos AR , AB , AH , ó los cosenos de los arcos BR , o y BH .

680 Supongamos que $AFIG$, $BFHG$ son dos círculos 264. los máximos de la esfera, y $ABDEIH$ otro círculo máximo que corta perpendicularmente los dos primeros; resulta de lo dicho (676) que el círculo $ABDEIH$ pasa por los polos de los dos círculos $AFIG$, $BFHG$; sean D y E dichos polos, y DK , EL los dos eges; una vez que los ángulos ACD , BCE son rectos, si restamos de cada uno el ángulo comun BCD , los ángulos residuos ACB , DCE serán iguales, y por consiguiente lo serán tambien los arcos AB , DE ; luego el arco DE que mide la mas corta distancia que hay entre los polos de dos círculos máximos, es igual al arco AB que mide el menor de los dos ángulos, que el uno de los círculos forma con el otro.

Pro-

Fig.

Propiedades de los triángulos esféricos.

681 Es evidente que por dos puntos de la superficie de la esfera no puede pasar mas que un arco de círculo máximo. Porque este círculo máximo es la interseccion de la esfera con un plano que ha de pasar precisamente por el centro ; y es evidente que por tres puntos dados no puede pasar mas que un plano.

Pero por dos puntos dados en la superficie de la esfera se pueden tirar una infinidad de arcos de círculos menores de diferentes diámetros. Este es el motivo por que solo se consideran en la Trigonometría esférica los arcos de círculos máximos, una vez que la menor distancia que hay entre dos puntos de la superficie de la esfera , es un arco de círculo máximo. Si se consideráran los arcos de círculos menores , no tendríamos ninguna regla fija para averiguar la longitud de los lados , y la cantidad de los ángulos.

Aunque un triángulo esférico pueda tener alguna de sus partes mayor que 180° , no obstante solo consideraremos aquellos que tienen cada una de sus partes menor que 180° ; porque siempre se puede conocer el uno de estos triángulos por medio del otro. Por egemplo , si consideramos el triángulo $ABEMV$, que forman los arcos
 263. cualesquiera AB , AV , y el arco BMV mayor que 180° , é imaginamos el círculo entero $BMVB$; podremos substituir el triángulo $BOVA$, cuyo arco BOV coge menos de
 180° ,

180°, en lugar del triángulo *ABMEV*; porque las partes del primero son ó iguales á las del segundo, ó su suplemento para 180° ó 360°; por manera que el uno de dichos dos triángulos dá á conocer el otro. Fig.

682 *Cada lado de un triángulo esférico es menor que la suma de los otros dos. Es evidente.*

683 *La suma de los tres lados de un triángulo esférico es siempre menor que 360°.*

Porque es evidente (682) que *FG* es menor que *AG + AF*; pero *AG + AF* añadidos á *DG + DF* no valen mas que 360°; luego *AG + AF* sumados con *FG* valdrán menos de 360°. 263

684 *Sea ABC un triángulo esférico qualquiera; FED otro triángulo esférico, tal que el punto A sea el polo del arco DE; el punto C, el polo del arco FE; y el punto B, el polo del arco DF; cada lado del triángulo FED será suplemento del ángulo que es su opuesto en el triángulo ABC, y cada ángulo del mismo triángulo FED será suplemento del lado que es su opuesto en el triángulo ABC.* 265

Porque ya que el punto *A* es el polo del arco *DE*, el punto *E* ha de estar á la distancia de 90° del punto *A* (675); por la misma razon, ya que *C* es el polo del arco *FE*, el punto *E* estará á la distancia de 90° del punto *C*; luego (675) el punto *E* es el polo del arco *AC*; del mismo modo probaríamos que *F* es el polo de *BC*, y *D* el polo de *AB*.

Sentado esto, prolónguense los arcos *AB*, *AC* hasta que

Fig. que concurren en I y L con el arco DE . Ya que el punto D es el polo de ABL , el arco DL es de 90° ; y por ser E el polo de ACI , el arco EI es de 90° ; luego $DL + EI$, ó $DL + EL + IL$, ó $DE + IL$ vale 180° . Pero IL es la medida del ángulo A (678), por ser de 90° los arcos AL , AI ; luego $DE + A$ vale 180° ; luego DE es suplemento del ángulo A . Del mismo modo probaremos que FD es suplemento de B , y FE suplemento de C .

Prolonguemos el arco AC hasta que concorra en N con FE . Los dos arcos AI y CN son cada uno de 90° , pues A y C son los polos de los arcos DE , FE ; luego $AI + CN$, ó $AI + AC + AN$, ó $IN + AC$ vale 180° ; pero IN es la medida del ángulo E (678), por ser el punto E polo de IN ; luego $E + AC$ vale 180° ; luego E es suplemento de AC . Del mismo modo probaríamos que D es suplemento de AB , y F suplemento de CB .

685 De aquí inferiremos que *la suma de los tres ángulos de un triángulo esférico, vale siempre menos que 540° , ó que tres veces 180° , y mas que 180° .*

Porque la suma de los tres ángulos A , B , C con la suma de los tres lados DE , DF , FE vale tres veces 180° (684): luego 1.º la suma de los tres ángulos A , B , C es menor que tres veces 180° , ó 540° . 2.º la suma de los tres lados DE , DF , FE vale (683) menos que 360° , ó dos veces 180° ; luego queda mas de 180° para la suma de los tres ángulos A , B , C .

686 Luego puede tener un triángulo esférico rectos,

tos, y aun obtusos sus tres ángulos.

Fig.

Se echa, pues, de ver que la suma de los tres ángulos de un triángulo esférico, no es una cantidad constante como en los triángulos rectilíneos; y por lo mismo no es posible sacar el valor de uno de sus ángulos, dado el valor de los otros dos.

687 Por ser cada una de las partes del triángulo *FED* suplemento de la que le está opuesta en el triángulo *ABC*, se sigue que el uno de estos triángulos se puede resolver por medio del otro; porque una vez que conozcamos las partes del uno, sabremos qual es el valor de las partes del otro. Esta observacion nos será muy util; y como se nos ofrecerá á menudo hacer uso de los triángulos *ABC*, *FED*, llamaremos para abreviar al triángulo *FED* *Triángulo Suplementario*.

688 *Dos triángulos esféricos trazados en una misma esfera, ó en dos esferas iguales, son iguales* 1.º *quando tienen igual un lado adyacente á dos ángulos iguales cada uno al suyo.* 2.º *quando tienen igual un ángulo comprendido entre dos lados iguales, cada uno al suyo.* 3.º *quando tienen iguales los tres lados, cada uno al suyo.* 4.º *quando tienen los tres ángulos iguales cada uno al suyo.*

Los tres primeros casos se demuestran al pie de la letra del mismo modo que si fuesen rectilíneos los triángulos (I. 407, 408 y 410).

Por lo que mira al quarto, como no se verifica en los triángulos rectilíneos, pide una demostracion particular.

Fig. Para darla imaginaremos trazados los triángulos suplementarios FED , fed de cada uno de los triángulos ABC , abc .
 265. Si los ángulos A, B, C son iguales á los ángulos a, b, c , cada uno al suyo, los lados DE, DF, FE suplementos de los primeros ángulos, serán tambien iguales á los lados de, df, fe suplementos de los últimos; luego en virtud del tercero de los quatro casos de esta proposicion, serán exactamente iguales estos dos triángulos FED y fed ; luego los ángulos F, E, D serán iguales á los ángulos f, e, d , cada uno al suyo; luego los lados BC, AC, AB suplementos de los tres primeros ángulos, serán iguales á los lados bc, ac, ab suplementos de los tres últimos.

689 En un triángulo esférico isósceles, los dos ángulos opuestos á los lados iguales son iguales; y recíprocamente si dos ángulos de un triángulo esférico son iguales, los lados opuestos á dichos ángulos serán iguales.

Tómense en los lados iguales AB, AC los arcos iguales AD, AE , é imagínense los arcos de círculo máximo DC, BE ; los dos triángulos ADC, AEB , que con esto tendrán un ángulo comun comprendido entre dos lados iguales cada uno al suyo, serán (688) iguales. Luego el arco BE es igual al arco CD ; luego los dos triángulos BDC y BEC son iguales, porque sobre ser DC igual á BE , conforme acabamos de ver, tienen comun el lado BC , y por otra parte son iguales BD y CE , que son las restas de dos arcos iguales AB, AC despues de haberles quitado arcos iguales AD, AE . Una vez que son iguales dichos dos

dos triángulos, se puede inferir que el ángulo DBC ó ABC Fig. es igual al ángulo ECB ó ACB .

Por lo que mira á la segunda parte de la proposicion, es una consecuencia de la primera, con imaginar el triángulo suplementario; porque si los dos ángulos B y C son 265. iguales, sus suplementos FD , FE serán iguales; luego el triángulo FED será isósceles; luego los ángulos E y D serán iguales; luego serán iguales sus suplementos AC y AB .

690 En todo triángulo esférico ABC , el lado mayor está opuesto al ángulo mayor, y recíprocamente.

Si el ángulo B es mayor que el ángulo A , se podrá 268. trazar dentro del triángulo un arco BD de círculo máximo, que forme el ángulo ABD igual al ángulo BAD , y entonces BD será igual á AD (689); pero $BD + DC$ es mayor que BC ; luego $AD + DC$ ó AC es tambien mayor que BC .

La recíproca se demostrará facilmente, valiéndose del triángulo suplementario, y discurriendo del mismo modo.

Las últimas proposiciones que hemos demostrado sirven para guiarnos en la resolucion de los triángulos esféricos, donde todo lo que se busca se determina por senos ó tangentes; y como estas pertenecen indistintamente á arcos menores que 90° , ó á sus suplementos, puede quedar duda cuál de estos dos arcos se ha de escoger. Pero no bastan las espresadas proposiciones para manifestar los casos en que puede ser lo que se busca mayor ó menor que

Fig. 90° , y los casos en que puede ser indiferente que sea mayor ó menor.

Medios para conocer en qué casos los ángulos ó lados que buscamos en los Triángulos esféricos rectángulos, han de ser mayores, ó menores que 90° .

691 Aunque dos ángulos, y aun los tres de un triángulo esférico rectángulo pueden ser rectos, y que por consiguiente pueda haber dos ó tres hypotenusas, no obstante solo llamaremos hypotenusa el lado opuesto al ángulo recto que consideraremos; y los otros dos ángulos los llamaremos *Ángulos obliquos*.

692 Cada uno de los dos ángulos obliquos de un triángulo esférico rectángulo, es de la misma especie que el lado opuesto; quiero decir que será de 90° , si dicho lado fuere de 90° ; y mayor ó menor que 90° , segun fuere dicho lado mayor ó menor que 90° .

269. Supongamos que sea B el ángulo recto; si fuese BC menor que 90° , prolongándole hasta D , de modo que BD sea de 90° , el punto D será el polo del arco AB (676); luego el arco DA de círculo máximo, tirado en el extremo del lado BA , será perpendicular á BA ; luego el ángulo DAB será recto; luego CAB será menor que 90° . Los otros dos casos se demostrarán del mismo modo.

693 Si los dos lados, ó los dos ángulos de un triángulo esférico rectángulo son ambos menores ó mayores que 90° , la hypotenusa será siempre menor que 90° ; y al
con-

contrario será mayor que 90° , si los dos lados, ó los dos ángulos fueren de distinta especie. Fig.

Porque, guardando la misma construccion que en la 269. proposicion antecedente, si AB fuese tambien menor que 90° , el ángulo ADB que ha de ser (692) de la misma especie que el lado AB , será menor que 90° ; por la misma razon el ángulo ACB será menor que 90° ; luego ACD será obtuso, y por consiguiente mayor que ADC ; luego AD será mayor que AC (690); y como AD es de 90° , será AC menor que 90° .

Si los dos lados BC y AB del ángulo recto B fueren ambos mayores que 90° , la hypotenusa AC será tambien menor que 90° ; porque si tomamos BD de 90° , siendo D el polo del arco AB , será AD de 90° ; luego una vez que AB es mayor que 90° , el ángulo ACB (692) será obtuso; lo mismo digo, y por la misma razon del ángulo ADB ; luego ADC será agudo; y por consiguiente menor que ACD ; luego tambien AC será menor que AD (690), quiero decir, menor que 90° .

Al contrario, si fuese AB menor que 90° , y BC mayor; el ángulo ACB que es de la misma especie que AB (692), será agudo: lo propio digo del ángulo ADB ; luego ADC será obtuso; y por consiguiente mayor que ACD ; luego AC será mayor que AD ; esto es, mayor que 90° .

Por lo que mira á los ángulos comparados con la hypotenusa, la verdad de esta proposicion se funda en que

Fig. cada uno de dichos ángulos es de la misma especie que el lado opuesto (692).

694 Luego 1.º segun fuere la hypotenusa menor ó mayor que 90° , serán los lados ambos de una misma especie, ó los dos de distinta especie; lo propio digo de los ángulos obliquos.

695 Segun fueren la hypotenusa, y un lado de una misma, ó de distinta especie, el otro lado será menor ó mayor que 90° , y lo propio digo del ángulo opuesto al último lado.

De la Resolucion de los Triángulos esféricos rectángulos.

[272. 696 Sea una pirámide $GBPQ$ formada de quatro triángulos rectángulos GBQ , GBP , GPQ , BPQ , y sean AB , AC y BC tres arcos de círculo trazados desde el centro G , y con el radio GB , cada uno, como se echa de ver, en un triángulo distinto; es evidente que estos tres arcos de círculo formarán un triángulo esférico BAC rectángulo en A , por ser perpendiculares el uno al otro los dos planos GPQ , GBP . Si suponemos el radio $= 1$, consideramos la hypotenusa como el radio en cada uno de los triángulos rectángulos que forman la pirámide propuesta, y tenemos presente que $\text{rang} = \frac{\text{sen}}{\cos}$. y $\text{cot} = \frac{\cos}{\text{sen}}$, se sacará facilmente la tabla siguiente que espresa los valores de todas las partes del espresado triángulo.

1.º el arco BC , ó el ángulo QGB .	tiene por seno	$\frac{BQ}{GQ}$	por co- seno	$\frac{BG}{GQ}$	por tan- gente	$\frac{BQ}{BG}$
2.º el arco BA , ó el ángulo BGP .		$\frac{BP}{GP}$		$\frac{GB}{GP}$		$\frac{BP}{BG}$
3.º el arco AC , ó el ángulo PGQ .		$\frac{QP}{GQ}$		$\frac{GP}{GQ}$		$\frac{QP}{GP}$
4.º el ángulo ABC ó QBP .		$\frac{PQ}{BQ}$		$\frac{BP}{BQ}$		$\frac{QP}{BP}$
5.º el ángulo BCA .		$\frac{BP \times GQ}{BQ \times GP}$		$\frac{QP \times BG}{GP \times BQ}$		$\frac{BP \times GQ}{PQ \times BG}$

697 Es facil sacar todas estas espresiones despues de lo dicho (I. 666 y 667), y por esto nos contentaremos con sacar las que forman la primera linea de la tabla. Si consideramos como el radio la hypotenusa GQ , y hacemos $= 1$ el radio de las tablas, tendremos $GQ : QB :: 1 : \text{sen } QGB$, ó $\text{sen } BC = \frac{QB}{GQ}$, pues es BC la medida del ángulo QGB , y $GQ : GB :: 1 : \text{cos } QGB$, ó $\text{cos } BC = \frac{GB}{GQ}$. De donde sacaremos $\text{tang } BC = \frac{BQ}{BG}$, y $\text{cot } BC = \frac{BG}{BQ}$. Solo la última linea de la tabla se saca de las dos primeras proposiciones que vamos á sentar, y se demuestran todas con substituir en cada una en particular los valores de los términos de cada proporcion que en ella se espresa, y siempre se hallará una perfecta igualdad entre el producto de los medios y el de los estremos.

698 En un triángulo esférico qualquiera BAC rectángulo en A , el seno total es al seno de la hypotenusa, como el seno de un ángulo es al seno del lado opuesto; y recíprocamente.

Fig. De donde sacaremos $R: \text{sen } BC :: \text{sen } BCA: \text{sen } BA$, y substituyendo los valores que dá la tabla, calculados en el supuesto de $R=1$, tendremos $1: \frac{BQ}{CQ} :: \text{sen } BCA: \frac{BP}{GP}$, que dá $\text{sen } BCA = \frac{BP \times CQ}{GP \times BQ}$.

273. 699 En un triángulo esférico BAC rectángulo en A, se verificará que el radio es al coseno de un ángulo, como la tangente de la hypotenusa es á la tangente del lado adyacente á dicho ángulo; quiero decir que $R: \cos B :: \text{tang } BC: \text{tang } AB$; ó $R: \cos C :: \text{tang } BC: \text{tang } AC$.

De esta proposicion inferiremos la espresion del coseno de BCA qual está en la tabla; porque con egecutar en la segunda proporcion las substituciones correspondientes por medio de la tabla, tendremos $1: \cos C :: \frac{BQ}{BG}: \frac{QP}{GP}$; de donde se saca $\cos C$ ó $\cos BCA = \frac{QP \times BG}{GP \times BQ}$.

Con esto será facil hallar la espresion de la tangente y cotangente del espresado ángulo.

273. 700 En todo triángulo rectángulo, el seno total es al coseno del uno de los lados, como el coseno del otro lado es al coseno de la hypotenusa; esto es, $R: \cos AB :: \cos AC: \cos BC$.

273. 701 El radio es al seno de un ángulo, como el coseno del lado adyacente es al coseno del otro ángulo; esto es, $R: \text{sen } B :: \cos AB: \cos C$; ó $R: \text{sen } C :: \cos AC: \cos B$.

273. 702 El radio es al seno de un lado, como la tangente del ángulo adyacente á dicho lado es á la tangente del otro lado, ó $R: \text{sen } AB :: \text{tang } B: \text{tang } AC$; ó $R: \text{sen } AC :: \text{tang } C: \text{tang } AB$.

703 El radio es á la cotangente de un ángulo , como Fig. la cotangente del otro ángulo es al coseno de la hypotenusa; 273. ó lo que viene á ser lo mismo , el radio es al coseno de la hypotenusa , como la tangente de un ángulo es á la cotangente del otro ángulo. Quiero decir que $R : \cot B :: \cot C : \cos BC$; ó $R : \cos BC :: \tan B : \cot C :: \tan C : \cot B$.

704 De lo dicho (699) inferiremos que si dos 274. triángulos esféricos ABC , ABD ambos rectángulos en B tuvieren un lado AB comun, las tangentes de las hypotenusas serán en razon inversa de los cosenos de los ángulos adyacentes al lado comun.

Porque de la proposicion citada se sigue que $R : \cos CAB :: \tan CA : \tan AB$, y $R : \cos BAD : \tan DA : \tan AB$. Multiplicando los extremos y medios de las dos proporciones , sacaremos $\cos CAB \times \tan CA = R \times \tan AB = \cos BAD \times \tan DA$; luego $\tan CA : \tan DA :: \cos BAD : \cos CAB$.

705 De lo probado (700) resulta que si dos 274. triángulos esféricos rectángulos tuvieren un lado comun, los cosenos de sus hypotenusas serán como los cosenos de los lados no comunes.

Porque en virtud de la proposicion citada será $R : \cos AB :: \cos BC : \cos AC$, y $R : \cos AB :: \cos BD : \cos AD$. Luego $\cos BC : \cos BD :: \cos AC : \cos AD$.

706 De lo dicho (701) inferiremos que si dos triángulos esféricos rectángulos tuviesen un lado comun , los cosenos de los ángulos opuestos á dicho lado serán como

los

Fig. los senos de los ángulos adyacentes.

Porque en virtud de la proposicion citada tendremos $R : \text{sen } CAB :: \cos AB : \cos C$, y $R : \text{sen } BAD :: \cos AB : \cos D$; ó $\text{sen } CAB : \cos C :: R : \cos AB :: \text{sen } BAD : \cos D$; y por consiguiente $\cos C : \cos D :: \text{sen } CAB : \text{sen } BAD$.

707 De lo probado (702) se sigue que si dos triángulos rectángulos tuviesen un lado comun, los senos de los lados no comunes serán recíprocamente como las tangentes de los ángulos de los lados.

274. Porque de la proposicion citada sacaremos $R : \text{sen } CB :: \text{tang } C : \text{tang } AB$; y $R : \text{sen } BD :: \text{tang } D : \text{tang } AB$. Luego $\text{sen } CB \times \text{tang } C = R \times \text{tang } AB = \text{sen } BD \times \text{tang } D$, y por consiguiente $\text{sen } CB : \text{sen } BD :: \text{tang } D : \text{tang } C$.

275. 708 De lo probado (698 y 702) se sigue que si dos triángulos esféricos ABC , BDC rectángulos el primero en B , y el otro en D , tuviesen un ángulo comun C .

1.º Los senos de sus hypotenusas serán como los senos de los lados opuestos al ángulo comun; porque de lo dicho (698) sacaremos $R : \text{sen } AC :: \text{sen } C : \text{sen } AB$, ó $R : \text{sen } C :: \text{sen } AC : \text{sen } AB$; y $R : \text{sen } CB :: \text{sen } C : \text{sen } BD$, ó $R : \text{sen } C :: \text{sen } CB : \text{sen } BD$. Luego $\text{sen } AC : \text{sen } CB :: \text{sen } AB : \text{sen } BD$.

2.º Las tangentes de los lados opuestos al ángulo comun serán como los senos de los lados adyacentes al ángulo comun. Porque de lo dicho (702) resulta que $R : \text{sen } BC :: \text{tang } C : \text{tang } AB$, y $R : \text{sen } DC :: \text{tang } C : \text{tang } DB$;

Tabla para la resolucion de todos los casos posibles de los triángulos esféricos rectángulos. (709).

<i>Datos.</i>	<i>Busco.</i>	<i>Valores.</i>	<i>Casos en que lo que busco no llega á 90°.</i>
<i>A</i> Hypotenusa y un lado.	Angulo opues- al lado dado.	Su $\text{sen} = \frac{\text{sen lado dado}}{\text{sen hypot.}}$ (698)	{ Si los datos son de una misma especie.
	Angulo adyac. al lado dado.	Su $\text{cos} = \frac{\text{tang lad. dado}}{\text{tang hypot.}}$ (699)	{ Lo mismo.
	El otro lado.	Su $\text{cos} = \frac{\text{cos hypot.}}{\text{cos lad. dado.}}$ (700)	{ Si el lado dado fuere menor que 90°.
<i>B</i> Un lado y el ángulo opuesto.	Hypotenusa.	Su $\text{sen} = \frac{\text{sen lad. dado}}{\text{sen áng. dado}}$ (698)	{ Dudoso.
	El otro lado.	Su $\text{sen} = \frac{\text{tang lad. dado}}{\text{tang áng. dado}}$ (702)	{ Dudoso.
	El otro ángulo.	Su $\text{sen} = \frac{\text{cos áng. dado}}{\text{cos lad. dado}}$ (701)	{ Dudoso.
<i>C</i> Un lado y el ángulo adyacente.	Hypotenusa.	Su $\text{tang} = \frac{\text{tang lad. dado}}{\text{cos áng. dado}}$ (699)	{ Si los datos son de una misma especie.
	El otro ángulo.	Su $\text{cos} = \text{cos lad. dado} \times \text{sen áng. dado}$ (701)	{ Si el lado dado es menor que 90°.
	El otro lado.	Su $\text{tang} = \text{sen lad. dado} \times \text{tang áng. dado}$ (702)	{ Si el ángulo dado fuere menor que 90°.
<i>D</i> La hypotenusa y un ángulo.	Lado adyac.	Su $\text{tang} = \text{tang hyp.} \times \text{cos áng. dado}$ (699)	{ Si el ángulo dado fuere agudo.
	Lado op. al ángulo dado.	Su $\text{sen} = \text{sen hyp.} \times \text{sen áng. dado}$ (698)	{ Si los datos fueren de una misma especie.
	Otro ángulo.	Su $\text{tang} = \frac{\text{cot áng. dado}}{\text{cos hypot.}}$ (703)	{ Si la hypot. fuere menor que 90°.
<i>E</i> Los dos lados.	Hypotenusa.	Su $\text{cos} = \text{rectáng. cos lados dados}$ (700)	{ Si los datos fuesen de una misma especie.
	Un ángulo.	Su $\text{tang} = \frac{\text{tang lad. opuesto}}{\text{sen lad. adyac.}}$ (702)	{ Si el lado opuesto fuere agudo.
<i>F</i> Los dos ángulos.	Hypotenusa.	Su $\text{cos} = \text{rectáng. cot. áng. dados}$ (703)	{ Si los datos fueren de una misma especie.
	Un lado.	Su $\text{cos} = \frac{\text{cos áng. opuesto}}{\text{sen áng. adyac.}}$ (702)	{ Si el ángulo opuesto fuere agudo.



DB ; de donde será fácil sacar $\text{tang } AB : \text{tang } BD : \text{sen Fig. } BC : \text{sen } DC$.

709 Por medio de las proposiciones que hemos sentido , se resuelven todos los casos posibles de los triángulos esféricos rectángulos, conforme lo manifiesta la tabla adjunta.

De la Resolucion de los Triángulos esféricos obliquángulos.

710 Quando las tres partes de un triángulo esférico están colocadas de manera que dos de ellas tocan inmediatamente la tercera , ó no están separadas de ella sino por el ángulo recto , dichas dos partes se llaman *Adyacentes* á la tercera que llamaremos *Parte media*.

711 Quando las tres partes de un triángulo rectángulo están dispuestas de tal modo que entre una de las tres, que miraremos como parte media , y cada una de las otras dos haya siempre otra parte del mismo triángulo ; dichas dos partes se llaman *Partes separadas*. Consideramos el ángulo recto como si no separára las partes entre las quales está.

Si en el triángulo BAC rectángulo en A

Las partes medias fuesen	$\left\{ \begin{array}{l} AB \\ AC \\ BC \\ B \\ C \end{array} \right.$	las adyacentes serán	$\left\{ \begin{array}{l} AC \text{ y } B \\ AB \text{ y } C \\ B \text{ y } C \\ AB \text{ y } BC \\ AC \text{ y } BC \end{array} \right.$	y las separadas	$\left\{ \begin{array}{l} BC \text{ y } C \\ BC \text{ y } B \\ AC \text{ y } AB \\ AC \text{ y } C \\ AB \text{ y } B \end{array} \right.$
--------------------------	---	----------------------	---	-----------------	---

273.

712 Es evidente que si MDA fuere el suplemento de

Fig. de BM , el seno ME de la mitad de MDA será igual á CF
 276. coseno de la mitad BG del arco BM .

277. 713 En todo triángulo esférico BAC , los senos de los
 ángulos tienen unos con otros la misma razon que los senos
 de los lados opuestos.

Bagemos, para probarlo, desde un ángulo qualquiera A
 del triángulo esférico BAC el arco AD perpendicular á la
 base BC . En virtud de esto, y de lo dicho (698) ten-
 dremos $R : \text{sen } AB :: \text{sen } B : \text{sen } AD$, y $R : \text{sen } AC :: \text{sen } C :$
 $\text{sen } AD$. De donde sacaremos $\text{sen } AB \times \text{sen } B = \text{sen } AC$
 $\times \text{sen } C$, que dá esta proporcion $\text{sen } B : \text{sen } C :: \text{sen } AC :$
 $\text{sen } AB$.

1.º A los ángulos BAD , CAD que forman los lados
 AB , AC del ángulo BAC con la perpendicular, los llama-
 remos *Segmentos del ángulo vertical*, ora cayga la perpen-
 dicular dentro, ora esté fuera del triángulo BAC .

2.º Llamaremos *Segmentos de la base* las partes BD
 y DC del lado BC que están entre los puntos B y C , y
 el punto D donde la perpendicular AD encuentra dicho
 lado; esté prolongada, ó no la espresada base.

3.º Si consideramos los segmentos BAD , CAD del
 ángulo BAC , los lados AB , AC de dicho ángulo se lla-
 marán *Partes adyacentes*, porque lo son con efecto. Los
 ángulos B y C de la base BC serán las partes separadas,
 porque entre dichos ángulos, y los segmentos están los la-
 dos BA y CA .

4.º Si consideramos los segmentos BD y CD de la
 ba-

base, los ángulos B y C serán las partes adyacentes, y los Fig. lados BA y CA serán las partes separadas respecto de los mismos segmentos de la base.

714 Si desde un ángulo qualquiera A de un triángulo 277. esférico BAC bajamos una perpendicular AD al lado BC , prolongado si fuere menester, siempre se verificará:

1.º Que habrá la misma razon entre los senos de los segmentos del ángulo, que entre los cosenos de las partes separadas. Quiero decir, que $\text{sen } BAD : \text{sen } CAD :: \cos B : \cos C$.

Porque por lo dicho (701) en el triángulo rectángulo BDA tendremos $R : \cos AD :: \text{sen } BAD : \cos B$; y en el triángulo rectángulo CDA tendremos tambien $R : \cos AD :: \text{sen } CAD : \cos C$. Luego $\text{sen } BAD : \text{sen } CAD :: \cos B : \cos C$.

2.º Habrá entre los cosenos de los mismos segmentos la misma razon que entre las cotangentes de las partes adyacentes; quiero decir que $\cos BAD : \cos CAD :: \cot AB : \cot AC$.

Porque en virtud de lo dicho (699) será $R : \cos BAD :: \tan BA : \tan AD :: \frac{1}{\cot BA} : \frac{1}{\cot AD} :: \cot AD : \cot BA$; luego $R : \cos BAD :: \cot AD : \cot BA$. Del mismo modo probaríamos que $R : \cos CAD :: \cot AD : \cot CA$. Luego una vez que son unos mismos los antecedentes en ambas proporciones, será $\cos BAD : \cos CAD :: \cot AB : \cot AC$.

3.º Hay una misma razon entre los senos de los segmentos de la base, que entre las cotangentes de las partes

Fig. *adyacentes*. Quiero decir que $\text{sen } BD : \text{sen } CD :: \cot B : \cot C$.

Porque por lo dicho (702) en el triángulo BDA será $R : \text{sen } BD :: \text{tang } B : \text{tang } AD :: \frac{1}{\cot B} : \frac{1}{\cot AD} :: \cot AD : \cot B$; y en el triángulo CDA inferiríamos también $R : \text{sen } CD :: \cot AD : \cot C$. Luego ya que son unos mismos los antecedentes en ambas proporciones, resulta que $\text{sen } BD : \text{sen } CD :: \cot B : \cot C$.

4.º Hay la misma razon entre los cosenos de los segmentos de la base, que entre los cosenos de las partes separadas: quiero decir que $\cos BD : \cos CD :: \cos AB : \cos AC$.

Porque de lo dicho (700) resulta que en el triángulo BAD tenemos $R : \cos BD :: \cos AD : \cos BA$. Y por lo mismo también tendremos en el triángulo CDA , $R : \cos CD :: \cos AD : \cos AC$. Luego finalmente $\cos BD : \cos CD :: \cos BA : \cos AC$.

278. 715 Supongamos que sea BAC un triángulo esférico cualquiera estando uno de sus lados AB en la circunferencia de un círculo máximo $ABR\text{Far}$; vamos á enseñar cómo se puede trazar en el plano del espresado círculo máximo la Proyeccion ortográfica del triángulo ACB ; esto es, la figura que resulta de las líneas tiradas desde los puntos de los lados del triángulo ABC perpendicularmente al plano $ABR\text{Fr}$.

Desde los extremos A, B del arco AB tírense al centro G los radios GA y GB . Por el mismo centro G , que lo es también de la esfera, concibamos que pase un plano ó círculo máximo $rDRO$ perpendicular al plano $ARar$, cuya comun seccion Rr con el plano del mismo círculo sea per-

perpendicular al radio GA ; finalmente prolónguese el arco Fig. AC hasta que encuentre la circunferencia $rDRO$ en un punto D , desde el qual se tirará tambien al centro G la linea DG , y la linea Dd perpendicular al diámetro Rr .

Sentado esto, es evidente que el ángulo DGR es el mismo que el ángulo BAC formado del concurso de los planos BAG , CAG ; por ser ambas lineas DG , RG perpendiculares á la interseccion comun AG ; y el ángulo DGr es igual al suplemento del mismo ángulo BAC . Es tambien patente que si por el punto C tiramos una linea Cc perpendicular al mismo plano $ARar$, el punto c será la proyeccion del ángulo C ; y si por la linea Cc hacemos que pase un plano ICL paralelo al plano $rDRO$, la interseccion Ll de este círculo menor, y del círculo máximo $ARar$ será tambien perpendicular al radio AG , y determinará arcos AL , Al iguales al arco AC ; y la proyeccion del punto C estará en uno de los puntos de dicha linea. Tambien estará por la misma razon en una linea Ff que fuese la interseccion del círculo máximo $ARar$, y de un círculo menor fCF perpendicular al plano del mismo círculo máximo, cuya linea Ff tambien será perpendicular al radio BG , y determinaria los arcos BF , Bf , ambos iguales al arco BC . Esto manifiesta cómo se puede determinar en un instante la proyeccion del ángulo C por medio de la interseccion comun de las lineas Ll , Ff en el plano del círculo $ARar$, siendo conocidos los tres lados del triángulo ABC .

716. De lo que acabamos de probar resulta, que por

ser

Fig. ser semejantes los triángulos rectángulos DdG , CcH , pues son paralelas unas con otras recíprocamente las líneas que los forman, será $DG:CH$ ó $rG:lH::dG:cH$; esto es, $R:\text{sen } AC::\cos BAC:cH$, y como sacaríamos la misma proporcion para cada uno de los puntos proyectados del arco AC , se sigue que la proyeccion de dicho arco en el plano del círculo $ARar$ es (91) una elipse cuyo semieje mayor es AG y dG el semieje menor.

717 Luego la proyeccion ortográfica de un círculo qualquiera, ó de una porcion de círculo es una elipse ó porcion de elipse, cuyo semieje mayor es igual al seno total, y el semieje menor es igual al coseno del ángulo que forman uno con otro el plano en que está el círculo, y el plano en que se ha de trazar su proyeccion ortográfica. Todo esto supuesto digo que

718 En un triángulo esférico qualquiera BAC se verificará siempre esta proporcion. El producto de los senos de los lados AB , AC de un ángulo qualquiera BAC , es al producto de los senos de las diferencias que ván de cada uno de dichos lados á la semisuma de los tres lados; como el quadrado del radio es al quadrado del seno de la mitad del ángulo. Esto es que $\text{sen } AB \times \text{sen } AC : \text{sen} \left(\frac{AB+AC+BC}{2} - AC \right) \times \text{sen} \left(\frac{AB+AC+BC}{2} - AB \right) :: R^2 : \text{sen}^2 \left(\frac{1}{2} BAC \right)$.

279. Antes que probemos esta proposicion, se nos hace preciso considerar, que si en el plano del círculo $ABRa$ tomamos al uno y otro lado del punto A los arcos AL , Al cada uno igual al arco AC , y tambien al uno y otro lado del

del punto B los arcos BF , Bf cada uno igual al arco Fig. BC , y tiramos las cuerdas Ll , Ff respectivamente perpendiculares á los radios GA , GB ; la interseccion C de dichas dos cuerdas será (715) la proyeccion del ángulo C del triángulo BAC . De la misma construccion resultará tambien que $BL = AC - AB$, y $Bl = AC + AB$. Tambien será $LF = BF - BL = BC - AC + AB$; $lf = Bl - Bf = AB + AC - BC$, y $Lf = Bf + BL = BC + AC - AB$. A mas de esto, hagamos esta proporcion $Hl : CH :: Gr : Gd$; ó lo que es lo mismo, tómese en la Gr una parte Gd quarta proporcional á las tres lineas Hl , CH y Gr , que será el coseno del ángulo BAC (como se vé en la fig. 278); por consiguiente si en el punto d levantamos una recta Dd perpendicular al radio Gr ; será el seno del ángulo RGD igual al ángulo BAC , y le determinará. Finalmente, tírense desde el punto D á los extremos del diámetro Rr las cuerdas DR , Dr ; bágense á esta cuerda desde el centro G las perpendiculares GS , Gs ; y desde los puntos S , s las perpendiculares SV , su al diámetro Rr ; es evidente que será RS el seno de la mitad del ángulo BAC ; y rs será el seno de la mitad del suplemento del ángulo BAC , ó el coseno de la mitad de dicho ángulo (712).

Sentado todo esto, por de contado es constante que habiendo entre los senos de los ángulos de un triángulo rectilíneo (I. 671) la misma razon que entre los

Fig. lados, serán tambien los senos de los ángulos del triángulo rectilíneo CLF como las mitades de los lados, pues hay entre las mitades la misma razon que entre los todos. Es tambien constante que el ángulo LCF es igual al ángulo AGB , teniendo presente lo dicho (I. 380), y los valores sacados poco ha de los arcos LF , lf . Por consiguiente tendremos esta proporcion $\text{sen } C \text{ ó } \text{sen } AB : \text{sen } F :: \frac{1}{2} LF : \frac{1}{2} CL$. De la proporcion que hay entre las líneas GR , HL , Gd , CH sacaremos $HL : GR :: CH : Gd$; ó $HL : CH :: GR : Gd$; luego (I. 288) $HL : CH + HL :: GR : Gd + GR$; esto es $HL : GR :: CL : dR :: \frac{1}{2} CL : \frac{1}{2} dR = VR$, porque en los triángulos semejantes RDd , RSV , siendo RS la mitad de RD , será RV la mitad de Rd . Y por estar las líneas GR , RS , RV en proporcion continua (I. 463), tendremos (I. 220) $GR : RV :: (GR)^2 : (RS)^2$; son, pues, las tres proporciones que hemos sacado

$$\text{Sen } AB : \text{sen } F :: \frac{1}{2} LF : \frac{1}{2} CL$$

$$HL : GR :: \frac{1}{2} CL : VR$$

$$GR : VR :: (GR)^2 : (RS)^2$$

multiplicándolas ordenadamente, y borrando los términos comunes á los antecedentes, y á los consecuentes resultará $\text{sen } AB \times HL : \text{sen } F \times VR :: \frac{1}{2} LF \times (GR)^2 : VR \times (RS)^2$, ó $\text{sen } AB \times HL : \text{sen } F \times \frac{1}{2} LF :: (GR)^2 : (RS)^2$. Y como $HL = \text{sen } AC$, $\text{sen } F = \text{sen } \frac{1}{2} LAf = \text{sen } \left(\frac{BC+AC-AB}{2} \right) = \text{sen } \left(\frac{BC+AC+AB}{2} - AB \right)$, y $\frac{1}{2} LF = \text{sen } \frac{1}{2} LRF = \text{sen } \left(\frac{BC+AB-AC}{2} \right) = \text{sen } \left(\frac{BC+AB+AC}{2} - AC \right)$. Luego si substituimos estos valores, la última proporcion se transformará

en $\text{sen } AB \times \text{sen } AC : \text{sen } \left(\frac{BC+AB+AC}{2} - AB \right) \times \text{sen } \left(\frac{BC+AC+AB}{2} - AC \right) :: R^2 : \text{sen}^2 \frac{1}{2} BAC.$ Fig.

719 Suponiendo la misma construccion que en la última proposicion , tambien se verificará en un triángulo esférico qualquiera BAC , la siguiente analogía.

El producto de los senos de los lados AB , AC de un ángulo qualquiera , es al producto del seno de la semisuma de los dos lados y del lado opuesto por el seno de la semidiferencia que vá de dichos dos lados al tercero , como el quadrado del radio es al quadrado del coseno de la mitad del ángulo que forman ; quiero decir , que $\text{sen } AB \times \text{sen } AC : \text{sen } \left(\frac{AC+AB+BC}{2} \right) \times \text{sen } \left(\frac{AB+AC-BC}{2} \right) :: R^2 : \cos^2 \frac{1}{2} BAC.$

Porque en el triángulo CIf los senos de los ángulos tienen unos con otros la misma razon que las mitades de los lados opuestos ; pero es evidente que el ángulo en f tiene por medida la mitad del arco FDI , que es el suplemento de la mitad del arco FAl igual á la mitad de la suma de los tres lados AC , AB , BC . El arco fl , segun probamos antes (718) $= AC + AB - BC$, y por consiguiente la mitad de su cuerda será el seno de la mitad de dicho arco. Sentado esto , una vez que hay entre los senos la misma razon que entre los lados opuestos ; y que siendo el ángulo $ICf = LCF$, será tambien igual al ángulo AGB , por lo probado poco ha (718) , tendremos $\text{sen } AB : \text{sen } f :: \frac{1}{2} lf : \frac{1}{2} Cl$; por construccion $HL : Gr :: \frac{1}{2} Cl : \frac{1}{2} dr = ur$, y por estar en proporcion continua las lineas Gr , rs , ru será $Gr : ur :: (Gr)^2 : (rs)^2$. Luego multiplicando or-

Fig. denadamente los términos de estas tres proporciones, sacaremos sen $AB \times Hl : \text{sen } f :: \frac{1}{2}lf \times (Gr)^2 : (rs)^2$ ó sen $AB \times Hl : \text{sen } f \times \frac{1}{2}lf :: (Gr)^2 : (rs)^2$; y substituyendo los valores de cada línea sacaremos finalmente sen $AB \times \text{sen } AC : \text{sen } \left(\frac{AB+AC+BC}{2} \right) \times \text{sen } \left(\frac{AB+AC-BC}{2} \right) :: R^2 : \cos^2 \frac{1}{2}BAC$. Es facil probar que $(rs)^2 = \cos^2 \frac{1}{2}BAC$; porque se viene á los ojos que $rs = sD = GS = \cos RGS = \cos \frac{1}{2}RGD = \cos \frac{1}{2}BAC$.

720 Síguese de lo probado (719) que si llamamos s la suma de los tres lados; a , el lado opuesto al ángulo que se pide; b y c respectivamente, los dos lados que forman dicho ángulo será sen $\frac{1}{2}$ ángulo =

$$\frac{r\sqrt{\left[\text{sen} \left(\frac{s}{2} - b\right) \times \left(\text{sen} \frac{s}{2} - c\right)\right]}}{\sqrt{(\text{sen } b \times \text{sen } c)}}; \text{ y (719) } \cos \frac{1}{2} \text{ ángulo} =$$

$$\frac{r\sqrt{\left[\text{sen} \left(\frac{b+c+a}{2}\right) \times \text{sen} \left(\frac{b+c-a}{2}\right)\right]}}{\sqrt{(\text{sen } b \times \text{sen } c)}} =$$

$$\frac{r\sqrt{\left[\text{sen} \frac{1}{2}s \times \text{sen} \left(\frac{1}{2}s - a\right)\right]}}{\sqrt{(\text{sen } b \times \text{sen } c)}}.$$

721 Quando los dos lados que forman el ángulo que se pide son iguales, $b = c$, y $AC = AB$. Entonces $\frac{1}{2}s - b = \frac{s-2b}{2} = \frac{BC+2AB}{2} - AB = \frac{1}{2}BC$, y $\frac{1}{2}s - b = \frac{1}{2}s - c$; por consiguiente $\sqrt{\left[\text{sen} \left(\frac{1}{2}s - b\right) \times \text{sen} \left(\frac{1}{2}s - c\right)\right]} = \text{sen } \frac{1}{2}BC$, y sen $\frac{1}{2}$ ángulo = $\frac{r \times \text{sen } \frac{1}{2}BC}{\text{sen } b}$.

En

En el mismo supuesto será $\cos \frac{1}{2} \text{ ángulo} =$

Fig.

$$\frac{\sqrt{\left[\sin \left(b + \frac{1}{2}a \right) \times \sin \left(b - \frac{1}{2}a \right) \right]}}{\sin b}$$

722 De un triángulo esférico qualquiera ABC cuyos 279.
tres ángulos son conocidos sacaremos siempre la siguiente analogía.

El producto de los senos de los ángulos adyacentes á un lado es al producto de los cosenos de las diferencias que hay entre cada uno de dichos ángulos y la semisuma de los tres ángulos , como el quadrado del radio es al quadrado del coseno de la mitad del lado que se busca ; quiero decir , que $\sin B \times \sin C : \cos \left(\frac{A+B+C}{2} - B \right) \times \cos \left(\frac{A+B+C}{2} - C \right) :: R^2 : \cos^2 \frac{1}{2}BC$,

Y tambien sacaremos estotra analogía.

El producto de los senos de los ángulos adyacentes á un lado , es al producto del coseno de la semisuma de dichos dos ángulos y del tercero , por el coseno de la semidiferencia que vá de dichos dos ángulos al tercero ; como el quadrado del radio es al quadrado del seno de la mitad del lado que se busca ; quiero decir que $\sin B \times \sin C : \cos \left(\frac{B+C+A}{2} \right) \times \cos \left(\frac{B+C-A}{2} \right) :: R^2 : \sin^2 \frac{1}{2}BC$.

Porque en el triángulo DEF cuyas partes son (684) suplementos de las del triángulo BAC , se verificará por lo 265.
dicho (718) $\sin FD \times \sin EF : \sin \left(\frac{DF+FE+DE}{2} - DF \right) \times \sin \left(\frac{DF+FE+DE}{2} - FE \right) :: R^2 : \sin^2 \frac{1}{2}DFE$.

Pero los arcos FD , FE son los suplementos de los

Fig. ángulos B y C del triángulo BAC , serán por consiguiente sus senos los mismos que los de los ángulos B y C . Y como el seno de la mitad del suplemento de un ángulo ó de un arco es (712) igual al coseno de la mitad de dicho arco ó ángulo, con egecutar en el segundo término las substituciones correspondientes, se transformará en $\cos\left(\frac{A+B+C}{2} - B\right) \times \cos\left(\frac{B+C+A}{2} - C\right)$. Finalmente, por ser el ángulo DFE suplemento del lado BC , su mitad será el complemento de la mitad de dicho lado, y su seno será el coseno de la mitad del lado BC . Luego la proporcion antecedente se transformará en estotra $\text{sen } B \times \text{sen } C : \cos\left(\frac{B+C+A}{2} - B\right) \times \cos\left(\frac{A+B+C}{2} - C\right) :: R^2 : \cos^2 \frac{1}{2}BC$.

2.º En el mismo triángulo DEF se verificará en virtud de lo dicho (719) $\text{sen } FD \times \text{sen } FE : \text{sen}\left(\frac{DF+FE+DE}{2}\right) \times \text{sen}\left(\frac{DF+FE-DE}{2}\right) :: R^2 : \cos^2 \frac{1}{2}DFE$; y si egecutamos en esta proporcion las mismas substituciones que en la antecedente, se transformará en estotra $\text{sen } B \times \text{sen } C : \cos\left(\frac{B+C+A}{2}\right) \times \cos\left(\frac{B+C-A}{2}\right) :: R^2 : \text{sen}^2 \frac{1}{2}BC$.

723 Luego si llamamos s la suma de los tres ángulos de un triángulo; a, b, c los tres ángulos; suponiendo que los ángulos b, c son adyacentes al lado que se busca; tendremos las siguientes fórmulas

$$\text{sen } \frac{1}{2} \text{ lado} = \frac{r\sqrt{\left[\cos \frac{1}{2}s \times \cos \left(\frac{1}{2}s - a\right)\right]}}{\sqrt{(\text{sen } b \times \text{sen } c)}}, \text{ y}$$

$$\cos \frac{1}{2} \text{ lado} = \frac{r\sqrt{\left[\cos \left(\frac{1}{2}s - b\right) \times \cos \left(\frac{1}{2}s - c\right)\right]}}{\sqrt{(\text{sen } b \times \text{sen } c)}}, \text{ y}$$

Tabla para la resolucion de los triángulos esféricos obliquángulos (725).

Datos.	Se busca.	I segm. ó II segm. quiere decir primero ó segundo segmento del ángulo ó del lado dividido con la perpendicular.	Valores.
A Dos ángulos y un lado op. al uno de dichos ángulos.	El lado op. al otro áng.	Por la analo- gía comun.	Los senos de los áng. son como los senos de los lados opuestos (713).
	Tercer lado.	Bájese una per- pendic. al lado que junta los án- gulos dados.	Tang I segm. del lado = $\cos \text{áng. adyac.} \times \text{tang lado dado}$ (699). Sen II segm. = $\frac{\text{sen I segm.} \times \text{tang áng. ady. al lado dado}}{\text{tang áng. op. al mismo lado dado}}$ (714 3.º).
	Tercer ángulo	Sirve la mis- ma perpendicu- lar.	Cot I segm. áng. = $\cos \text{lado dado} \times \text{tang áng. ady.}$ (703). Sen II segm. del mismo áng. = $\frac{\text{sen I segm.} \times \cos \text{áng. op. al lado dado}}{\cos \text{áng. ady. al lado dado}}$ (714 1.º).
B Dos lados y un áng. opues- to al uno de estos lados.	El áng. opues- to al otro lado.	Por la analo- gía comun.	Los senos de los lados son como los de los áng. op. (713).
	Ang. compreh- end. entre los lados dados.	Bájese una per- pend. desde el áng. que forman los lados dados.	Cot I segm. áng. busc. = $\text{tang áng. dado} \times \cos \text{lado ady.}$ (703). Cos II segm. del mismo áng. = $\frac{\cos \text{I segm.} \times \text{tang lado dado ady. al áng. dado}}{\text{tang lado op. al áng. dado}}$ (704).
	Tercer lado.	Sirve la mis- ma perpendicu- lar.	Tang I segm. de este lado = $\cos \text{áng. dado} \times \text{tang lado ady. á dicho áng.}$ (699). Cos II segm. del mismo lado = $\frac{\cos \text{I segm.} \times \cos \text{lado op. al áng. dado}}{\cos \text{lado ady. al áng. dado}}$ (714 4.º).
C Dos lados y el ángu- lo que forman.	Un áng. op. al uno de los la- dos dados.	Bájese una perp. desde el áng. que no se busca	Tang I segm. lad. divid. = $\cos \text{áng. dad.} \times \text{tang lad. op. al áng. dado}$ (699). Tang áng. pedido = $\frac{\text{tang áng. dado} \times \text{sen I segm.}}{\text{sen II segm. del lado dividido}}$ (714 3.º).
	El tercer lado.	Bájese una perp. al uno de los la- dos dados.	Tang I segm. del lado divid. = $\cos \text{áng. dado} \times \text{tang lado no divid.}$ (699). Cos lado pedido = $\frac{\cos \text{lado no divid.} \times \cos \text{II segm.}}{\cos \text{I segm. del lado divid.}}$ (714 4.º).
D Un lado y los dos áng. ady. al mismo lado.	Un lado op. al uno de los án- gulos dados.	Bájese una per- pendic. al lado que no se busca.	Cot I segm. del áng. divid. = $\cos \text{lado dad.} \times \text{tang áng. op. al lado ped.}$ (703). Tang lado ped. = $\frac{\text{tang lado dad.} \times \cos \text{I segm. áng. divid.}}{\cos \text{II segm. del mismo áng.}}$ (714 2.º).
	Tercer ángulo.	Bájese una perp. desde el uno de los áng. dados.	Cot I segm. áng. divid. = $\cos \text{lado dad.} \times \text{tang áng. dado no divid.}$ (703). Cos áng. pedid. = $\frac{\cos \text{áng. no divid.} \times \text{sen II segm.}}{\text{sen I segm. del áng. divid.}}$ (714 1.º).
E Los tres lados.	Sean a, b, c los tres lados cuya suma = s ; b y c los adyac. al áng. pedido.		
	Un áng. por el sen, ó cos de su mitad.	$\text{Sen } \frac{1}{2} \text{áng.} = \frac{r \times \sqrt{[\text{sen}(\frac{1}{2}s - b) \times \text{sen}(\frac{1}{2}s - c)]}}{\sqrt{(\text{sen } b \times \text{sen } c)}}$ (720). $\text{Cos } \frac{1}{2} \text{áng.} = \frac{r \times \sqrt{[\text{sen } \frac{1}{2}s \times \text{sen}(\frac{1}{2}s - a)]}}{\sqrt{(\text{sen } b \times \text{sen } c)}}$ (720).	
F Los tres ángulos.	Sean α, β, γ los tres áng. cuya suma = s ; β y γ los adyacentes al lado pedido.		
	Un lado por el sen, ó cos de su mitad.	$\text{Sen } \frac{1}{2} \text{lado} = \frac{r \times \sqrt{[\cos \frac{1}{2}s \times \cos(\frac{1}{2}s - \alpha)]}}{\sqrt{(\text{sen } \beta \times \text{sen } \gamma)}}$ (723). $\text{Cos } \frac{1}{2} \text{lado} = \frac{r \times \sqrt{[\cos(\frac{1}{2}s - \beta) \times \cos(\frac{1}{2}s - \gamma)]}}{\sqrt{(\text{sen } \beta \times \text{sen } \gamma)}}$ (723).	



$$\operatorname{tang} \frac{1}{2} \text{ lado} = \frac{r \sqrt{\left[\cos \frac{1}{2} s \times \cos \left(\frac{1}{2} s - a \right) \right]}}{\sqrt{\left[\cos \left(\frac{1}{2} s - b \right) \times \cos \left(\frac{1}{2} s - c \right) \right]}}$$

Fig.

724 Si fuesen iguales los dos ángulos adyacentes, sacaríamos de lo probado en la primera parte de la proposicion (722) $\operatorname{sen}^2 B : \cos^2 \frac{1}{2} A :: R^2 : \cos^2 \frac{1}{2} BC$; y, sacando las raices, $\cos \frac{1}{2} BC = \frac{r \times \cos \frac{1}{2} A}{\operatorname{sen} B}$. La segunda

parte de la proposicion nos daría una fórmula menos sencilla que la primera.

De la Resolucion gráfica ó geométrica de los Triángulos esféricos qualesquiera.

725 Resolver gráfica ó geoméricamente un triángulo es resolverle por medio de la regla y del compas. Estas resoluciones geométricas no son á la verdad tan exactas como las numéricas, que han llegado á ser sumamente sencillas desde la invencion de los logaritmos; porque la precision de las construcciones que requieren las resoluciones gráficas pende á un tiempo de la destreza del que las egecuta, y de la exactitud de los instrumentos de que se vale. No por esto me ha parecido del caso omitirlas, porque hablan á su favor las razones siguientes.

1.º Las resoluciones geométricas, aunque poco exactas por las razones espresadas, no son por esto menos rigurosas para el entendimiento, por fundarse en las proposiciones mas fundamentales de la geometría. 2.º Ocurren

Fig. casos en que no se necesita toda la precision del cálculo, como quando se trata de orientar un plano, ó una calle de árboles por medio de algunas observaciones hechas de prisa, esto puede ocurrir con bastante frecuencia en la Gnomónica, para servir de preludio á una operacion mas perfecta; siendo por otra parte estas operaciones muy acomodadas para facilitar la práctica. 3.º Hay en la Astronomía teóricas fundadas en estas operaciones; sirven en muchos casos de la Náutica. Finalmente, pueden dirigirnos en algunos cálculos quando corremos algun riesgo de errarlos.

726 Cuestion I. *Dados los dos lados AB , AC de un triángulo esférico BAC , y el ángulo que forman, hallar*
 279. *1.º el uno de los ángulos de la base. 2.º la base misma ó el tercer lado.*

Tómese en el plano del círculo $ABRDr$ el arco AB igual al uno de los lados dados del ángulo BAC ; tírense al centro G los radios AG y GB , por el qual se tirará el diámetro rGR perpendicular al radio AG ; tómense tambien al uno y otro lado del punto A los arcos AL , Al cada uno igual al lado dado AC , y tírese por los extremos de dichos arcos la cuerda Ll . Hágase tambien en el centro G el ángulo DGR igual al ángulo dado BAC ; finalmente bágese desde el punto D la Dd perpendicular al diámetro Rr ; si tomamos CH quarta proporcional á las líneas rG , dG , lH , será el punto C (715) la proyeccion del ángulo C . Todo esto sentado, para hallar el uno de los ángulos, el ángulo B por egemplo; desde el punto hallado C

tiraremos al radio GB la perpendicular $fCXF$; tirando después el diámetro MGm perpendicular al radio GB , haremos $Xf:XC::GM:Gn$; por el punto n determinado de este modo tiraremos la Nn perpendicular á GM , que remata en el punto N de la circunferencia, será el arco MN la medida del ángulo B . El ángulo C se hallaría por una operacion parecida á la que acabamos de proponer, tomando AC en el plano del círculo $ABRA$ en lugar del arco AB .

2.º Para hallar el tercer lado BC , basta reparar que es evidentemente igual al uno de los arcos BF ó Bf ; por ser los arcos Bf , BC , BF todos de un mismo número de grados, pues están entre el mismo punto B , y un círculo menor perpendicular al radio GB .

La demostracion de esta construccion es una consecuencia evidente de la naturaleza de la proyeccion en que se funda, y que hemos explicado en otro lugar (715).

727 El que no quisiere empezar otra vez la operacion para hallar el ángulo C ; podrá sacar facilmente su valor practicando lo siguiente. Por los extremos L , F de los arcos AL , BF respectivamente iguales á los lados AC y BC , tirará las tangentes de dichos arcos hasta que rematen en los radios AG y BG prolongados quanto fuere menester. Desde dichos puntos como centro, y con radios iguales á las mismas tangentes, trazará dos arcos de círculo que se cortarán en un punto, desde el qual tirará á dichos centros radios que formarán uno con otro un ángulo igual al ángulo C . Fúndase esta construccion en que el án-

Fig. gulo de dos planos es el mismo que forman dos líneas perpendiculares á la interseccion comun , como lo son en este caso las tangentes de los dos arcos AC , BC .

728 Despues de tomados como antes los arcos AL , Al cada uno igual al lado AC , se podrá hallar tambien la proyeccion del ángulo C , sin acudir á las proporcionales, practicando lo que sigue. Para cuyo fin desde el punto H como centro y con el radio HL , se trazará un semicírculo Lcl ; en el mismo punto H se hará con el radio HL un ángulo LHc igual al ángulo dado BAC ; y desde el punto c donde el radio Hc corta la circunferencia, se bajará la perpendicular cC al diámetro IL , y será el punto C la proyeccion del ángulo C del triángulo BAC . Si el ángulo en A fuere obtuso, el punto C estará en la HI ; si fuese agudo, estará dicho punto en la HL . Con igual facilidad se puede hallar el ángulo B tomando $Cx \equiv CX$ en la línea IH prolongada si fuere menester; y tirando desde el punto c al punto x la línea cx que formará el ángulo cxL ó cxl igual al ángulo ABC .

Es facil de percibir la razon de esta construcción, para cuyo fin se ha de tener presente, que en la fig. 278 el ángulo CHL es igual al ángulo BAC , por ser las líneas CH y HL ambas perpendiculares á la interseccion comun AG de los planos GAB , GAC ; por consiguiente el ángulo cHL es el mismo que el ángulo CHL . Tambien se echa de ver que en el triángulo CXc rectángulo en c , las líneas cX y CX por ser ambas perpendiculares á la inter-

sec-

sección GB de los planos BGC , BGA , el ángulo que forman una con otra es el mismo que el ángulo BAC . Pero en virtud de nuestra construcción el triángulo rectángulo cCx de la fig. 279 es igual de todo punto al triángulo CcX de la fig. 278; luego el ángulo x es también igual en cada triángulo. Fig.

729 Cuestión II. *Dados en un triángulo esférico cualquiera ABC dos ángulos A y B, y el lado adyacente AB; hallar 1.º los otros dos lados; 2.º el tercer ángulo.*

Tomaremos en el círculo $ARDr$ el arco AB igual al 279. lado dado, y tiraremos al centro G los radios AG y BG ; tiraremos las líneas Gr , GM respectivamente perpendiculares á los mismos radios; tomaremos después los arcos MN , RD respectivamente iguales á los ángulos B y A ; después de tirados los senos Nn , Dd , trazaremos con los semiejes GB , Gn ; GA , Gd las semiélipses Bnb , Ada , que se cortarán en un punto C , donde estará la proyección del ángulo C del triángulo esférico BAC . Por dicho punto C tiraremos las cuerdas ICL , fCF perpendiculares á los radios GA , GB , y resultarán los arcos AL , Al iguales al lado AC , y los arcos BF , Bf iguales al lado BC .

2.º Una vez determinados los lados AC , BC , determinaremos el ángulo C por lo dicho (726).

730 Cuestión III. *Dados en un triángulo esférico BAC 279. dos lados cualesquiera AB, AC, y el uno de los ángulos opuestos á dichos lados; hallar 1.º el tercer lado; 2.º los otros dos ángulos.*

Fig. Supongamos que los lados conocidos son AB , AC con el ángulo B , y que se sabe tambien de qué especie es el ángulo A que forman los dos lados conocidos. Tomaremos primero en el plano del círculo ARB un arco AB igual al lado AB , y tiraremos los radios GA , GB . Por el punto G tiraremos la MGm perpendicular al radio GB , y tomaremos en ella la Gn igual al coseno del ángulo B , ácia M si el ángulo ABC fuere obtuso, ó Gv igual al mismo coseno ácia m si el ángulo ABC fuere agudo; y con los eges Bb , nv trazaremos la elipse $Bnbv$. Tomaremos despues en la circunferencia del círculo $ABar$ al uno y otro lado del punto A los arcos AL , Al cada uno igual al lado dado AC , y tiraremos la cuerda Ll que cortará la elipse $Bnbv$ en dos puntos C , C' que servirán para determinar el tercer lado BC , tirando por dichos dos puntos las líneas fCX , $\phi C'x'$ perpendiculares al radio BG , que darán los arcos Bf , $B\phi$ iguales al tercer lado, segun fuere el ángulo A opuesto obtuso ú agudo.

2.º Para determinar el ángulo A , trazaremos el semicírculo IKL sobre la cuerda lL como diámetro, y tiraremos las ordenadas Cc , $C'c'$, despues tiraremos desde el punto H las líneas Hc , Hc' que darán los ángulos LHc , LHc' iguales al ángulo A , segun hubiere de ser obtuso ú agudo. El ángulo C se determinará por la construccion indicada (727).

731 Cuestion IV. Dados dos ángulos qualesquiera

279. A y B de un triángulo ABC , y el lado AC opuesto al uno de

de dichos ángulos ; hallar 1.º el lado opuesto al otro ángulo ; Fig.
2.º el tercer lado ; 3.º el tercer ángulo.

Desde un punto qualquiera A del círculo $ABRa$ tírese el diámetro AGa , y perpendicularmente á este el diámetro rGR . Tómense al uno y otro lado del punto A los arcos AL , Al cada uno igual al lado dado AC , y tírese la cuerda Ll . Sobre esta cuerda como diámetro trácese el semicírculo IKL , y desde el punto H tírense los radios Hc , Hc' , que formen con LH un ángulo igual al uno de los ángulos dados A , segun fuere este ángulo obtuso ú agudo. Desde los puntos c , c' bágnense las perpendiculares cC , $c'C'$ que determinarán los puntos C , c' que son las proyecciones del ángulo C ó C' . Se tirarán despues desde los puntos c , c' las líneas cx , $c'x'$ que formen con las ordenadas Cc , $C'c'$ los ángulos Ccx , $C'c'x'$ iguales al complemento del ángulo dado B . Por lo que hemos dicho (728), la línea Cx es igual á CX , cuya posicion determina el lado AB y el lado BC . Para hallarla, tírese la línea GCP , y sobre CG trácese un círculo $GHCh$: finalmente desde el punto C como centro trácese con un radio $= Cx$ una porcion de círculo que cortará al último en dos puntos d , X que determinarán el lado AB tirando el radio GXB , y la cuerda $fCXF$ tirada por el punto X , y el punto C dará los arcos Bf , BF cada uno igual al tercer lado ; el tercer ángulo se hallaria siempre por la construccion indicada (727).

732 Si el ángulo A fuere agudo, y lo fuese tambien el ángulo B , el punto X hallado en el quadrante de
cír-

Fig. círculo AGr dará el lado AB , que tambien servirá para hallar el lado BC . Es escusado prevenir que si imaginamos un círculo trazado con el radio $C'G$, en el qual se inscriba la linea $C'x'$, resultarán igualmente dos resoluciones de la misma cuestion, segun fuere agudo el ángulo A del triángulo ABC , y el ángulo B obtuso, ó segun fueren agudos los ángulos en A y B , y obtuso el ángulo C .

733 Cuestion V. *Dados los tres lados de un triángulo esférico qualquiera BAC, hallar un ángulo qualquiera de dicho triángulo.*

279. Tómese en el plano del círculo ARa el arco AB igual á uno de los lados dados, y tírense desde los extremos A y B de dicho arco los radios AG , BG ; tómense despues al uno y otro lado del punto A los arcos AL , Al iguales al lado AC , y los arcos Bf , Bf iguales al tercer lado BC ; tiraránse despues las cuerdas Ll , Ff que se cortarán en un punto C , que será la proyeccion del ángulo C . Finalmente desde el centro G se tirarán á los radios GA , GB las perpendiculares rGR , mGM , y se buscará una quarta proporcional Gn á las lineas fX , CX , MG ; y por el punto n que determinará en la MG , se tirará la perpendicular nN hasta que remate en la circunferencia en N , y será el arco MN la medida del ángulo B ; se buscará tambien una recta Gd quarta proporcional á las lineas lH , CH , rG , que determinará en la rG un punto d , en el qual se levantará la perpendicular dD que dará el arco RD igual al ángulo A ; el ángulo C se hallaria por el mismo camino, tomando el lado

do $\widehat{AC}$ en la circunferencia en lugar del lado AB .

Fig.

734 Cuestion VI. *Dados los tres ángulos de un triángulo, hallar cada uno de los tres lados.*

Se trazará un triángulo DEF cuyos tres lados sean 265. suplementos de los ángulos del triángulo dado; despues se acudirá á una de las construcciones de la cuestion antecedente para hallar los ángulos de este último triángulo, que serán los suplementos de los lados que se piden.

735 Cuestion VII. *Dada la elipse que es la proyeccion ortográfica de un círculo máximo, hallar en el plano de proyeccion la apariencia de los polos del mismo círculo; y recíprocamente, dada la proyeccion de los polos de un círculo máximo, hallar la elipse que es la proyeccion de dicho círculo.*

Imaginemos que la recta Aa representa el plano del círculo máximo de la esfera, en el qual se hace la proyeccion ortográfica de todos los puntos de la superficie esférica; y que Pp perpendicular á GL es el ege del círculo que se ha de proyectar, cuyo círculo será por consiguiente representado por GL . Es tambien evidente que el círculo $ABab$ que pasa por los polos P, p del círculo proyectable, ó que se ha de proyectar, será pèrpendicular al plano de proyeccion. Sentado esto, si tiramos las perpendiculares Pp', Gg , se viene á los ojos que p' será la proyeccion del polo P , y g la del extremo G del círculo proyectable; pero por razon del ángulo recto GCP , el ángulo GCA es complemento del ángulo aCP que señala la ele-

280.

Fig. vacion del polo respecto del plano de proyeccion; luego la distancia Cp' de la proyeccion del polo P de un círculo máximo es igual al coseno de la elevacion del polo sobre el plano de proyeccion; ó lo que es lo mismo, al seno de la elevacion del círculo proyectable sobre el mismo plano de proyeccion; y el semieje menor de la elipse, que es la proyeccion del espresado círculo, es igual al seno de la elevacion del polo sobre el plano de proyeccion.

736 Cuestion VIII. *Hallar las dimensiones de la elipse que es la proyeccion ortográfica de un círculo menor de la esfera.*

Supongamos que la linea MON represente el diámetro del círculo menor cuya proyeccion ortográfica se pide. Como esta linea es perpendicular al ege Pp , el círculo menor que representa será paralelo al círculo GL cuyo ege es Pp . Sentado esto, desde los puntos M, O, N tírense las perpendiculares MM, Oo, Nn á la linea Aa ; es evidente que el punto o será el centro de la elipse que ha de ser la proyeccion del círculo menor MN paralelo á GL , y que mn será el ege menor de la misma elipse. Hechas estas consideraciones, los triángulos semejantes CPp', COo dán $CP : CO :: Cp' : CO$; esto es, el radio es al seno de la distancia que hay desde el círculo menor al círculo máximo que le es paralelo, como el coseno de la altura del polo sobre el plano de proyeccion es á la distancia Co que hay desde el centro o de la elipse que se ha de trazar al centro C .

Los triángulos semejantes GCg, MOR dan tambien

GC

$GC : Cg :: MO : OR$ ó $om = on$. Esto es , el seno total es Fig.
 al seno de la elevacion del polo sobre el plano de proyeccion,
 como el seno de la distancia que hay desde el círculo menor
 al polo , es al semieje menor de la elipse que se ha de tra-
 zar , y cuyo ege mayor será patentemente igual á MN .
 De aquí se infiere

737 1.º Que para determinar en una elipse qual-
 quiera que es la proyeccion de un círculo máximo, un arco
 de un número qualquiera de grados empezando desde un
 punto dado de dicha elipse , se ha de tirar desde dicho pun-
 to una perpendicular al ege mayor prolongada hasta la cir-
 cunferencia del círculo trazado sobre dicho ege mayor co-
 mo diámetro, y tomar despues en la circunferencia del mis-
 mo círculo empezando desde el punto donde dicha ordena-
 da corta la circunferencia , un arco igual al número dado
 de grados ; despues se bajará desde su extremo otra ordena-
 da al ege mayor de la elipse , que determinará en la circun-
 ferencia de esta curva un arco del número dado de grados. 281

738 2.º Si el arco dado fuese de 90° ; se bajará 281
 desde el punto dado una perpendicular al ege de la elipse;
 se tomará en el mismo ege al otro lado del centro una linea
 igual al seno del arco entre el extremo del ege el mas in-
 mediato al punto dado , y la perpendicular ú ordenada que
 pasare por el punto dado. Por egemplo, para determinar un
 arco de 90° en la elipse $ACda$ empezando desde el punto
 C , se tomará la linea $G\lambda$ igual al seno IH del arco $Al =$
 AC , que remata en la ordenada que pasa por el punto dado;

Fig. y por el punto λ determinado de este modo , se tirará después la perpendicular $\lambda l'$ que determinará en dicha elipse el arco Cl' de 90° . Si tomáramos en el semieje mayor Gb de la elipse BCb la línea $G\phi$ igual al seno fX del arco $BF = BC$, y tiráramos la perpendicular $\phi f'$, determinaríamos en dicha elipse el arco Cf' de 90° .

281 739 3.º De lo que acabamos de decir se sigue que se nos hará muy facil hallar en el plano del círculo $ABRr$ la medida del ángulo C ó BCA ; porque como un ángulo esférico qualquiera tiene por medida el arco de círculo máximo que abrazan sus lados , y trazado desde su vértice como polo , se viene á los ojos que toda la operacion se reduce á trazar la elipse Qgq , que es la proyeccion del círculo máximo cuyo polo está en C , cuya operacion se executará del modo siguiente. Tirarése por el punto C y el centro G el diámetro $PCGp$, y por los puntos G , C le tiraremos las perpendiculares QGq , $G'Cg'$; tomarése después en la Gp una parte GS igual á $G'C$ que es el seno de la elevacion del punto C sobre el plano de proyeccion ; esta línea será el semieje menor de la elipse que es la proyeccion del círculo máximo cuyo polo está en C . Luego los puntos l' , f' donde esta elipse corta las elipses Ada , Bnb determinarán el arco $f' l'$ cuyo correspondiente $\beta\gamma$ en el círculo $ABRr$ comprehendido entre las ordenadas $\gamma\Lambda$, $\beta\Phi$ será la medida del ángulo en C .

281 740 4.º Tambien se echa de ver que para hallar la medida del ángulo en C , no es menester trazar la elipse que

es

es la proyeccion del círculo máximo cuyo polo es dicho Fig. ángulo. Porque despues de determinados como antes los puntos l', f' en las elipses ACa , Bnb ; si desde estos puntos bajamos al diámetro QGq perpendicular á GCP , las ordenadas $l'\Delta$, $f'\phi$, sus prolongaciones hasta la circunferencia del círculo $ARar$ determinarán el arco $\beta\gamma$ igual á la medida del ángulo C .

741 Cuestion IX. *Hallar en la superficie del círculo* ABRr *1.º la proyeccion del arco* $A\delta$ *bajado desde el ángulo* A *perpendicularmente al lado* BC . *2.º la cantidad de los segmentos* $B\delta$, $C\delta$ *del lado* BC . *3.º los segmentos del ángulo* BAC . *4.º el valor de la perpendicular* $A\delta$.

281

Una vez que el arco cuya proyeccion buscamos, es un arco de círculo máximo de la esfera que pasa por el punto A , es evidente que la linea AGa será el ege mayor de la elipse que ha de ser su proyeccion. A mas de esto, ya que, segun suponemos, dicho círculo es perpendicular al lado BC , ha de pasar por el polo del mismo arco BC , y por consiguiente la elipse que buscamos ha de pasar tambien por la proyeccion de dicho polo. Pero si tomamos en el radio Gm una parte $GZ = Nn$, el punto Z será el polo del arco BC (735); luego será dicho punto uno de los de la elipse que se ha de trazar. Tirarémos, pues, por el punto Z una linea $Z\zeta$ perpendicular al diámetro Aa , y la prolongarémos hasta que encuentre el círculo $ARar$ en un punto θ . Tomarémos en la GR una linea $G\rho$ quarta proporcional á las lineas $\theta\zeta$, ζZ , RG ; trazarémos sobre

Mm 2

los

los dos semiejes GA y $G\rho$ la elipse $A\delta\rho\alpha$ que será la proyección del círculo perpendicular á BC .

2.º Por el punto δ donde dicha elipse corta el lado BC , tiraremos la perpendicular $\nu\delta\omega\mu$ al radio GB , y los arcos $F\mu$, $B\mu$ serán los segmentos del lado BC .

3.º Si por el punto ρ tiramos la $\rho\sigma$ perpendicular al radio GR , los arcos $R\sigma$, $D\sigma$ serán las medidas de los segmentos $BA\delta$, $CA\delta$ del ángulo BAC .

4.º Finalmente, si por el punto δ tiramos la ordenada $\epsilon\delta\eta$ perpendicular al radio GA , el arco $A\eta$ será el valor de la perpendicular $A\delta$.

742 Si se nos pidiera que determinásemos la proyección del círculo que divide el ángulo BAC en dos ángulos iguales, lo conseguiríamos por medio de una construcción del todo parecida á la antecedente; tomando en el radio GR una línea Gk igual al coseno de la mitad del ángulo BAC ; y trazando una elipse sobre los dos semiejes GA , Gk ; también se echa de ver que la construcción (738) daría del mismo modo la resolución de la cuestión, con suponer que desde el ángulo C se ha bajado una perpendicular al lado AB prolongado quanto fuere menester. Finalmente, en la construcción de la última cuestión se echa de ver que el arco $R\theta$ es igual al arco $A\delta$ perpendicular al lado BC , porque los arcos AR , $\eta\theta$ cada uno de 90° tienen comun una parte ηR .

743 Cuestión X. *Dados los tres lados de un triángulo ABC , hallar uno qualquiera de sus ángulos, resolviendo sus partes.*

So-

Sobre un círculo qualquiera ABC tomaremos los tres Fig. 282.
 arcos AB , AC y BC' respectivamente iguales á cada uno de los lados del triángulo que se ha de resolver. Despues de tirado el radio GA , quando quisiéremos sacar el ángulo A , tiraremos la tangente dAD terminada en d y D por la prolongacion de los radios GC y GB . En el radio GC' prolongado quanto fuere menester, tomaremos una linea Gd' igual á la secante Gd del lado AC ; finalmente desde los puntos D , A como centros, y con los radios Dd' , Ad trazaremos dos arcos de círculo que se cortarán en un punto δ , y darán el ángulo δAD igual al ángulo A del triángulo BAC . Por medio de una construccion parecida á esta hallaríamos los otros dos ángulos del mismo triángulo. Esta construccion trae consigo su demostracion; porque las dos lineas AD , Ad , ó $Ad\delta$ son las tangentes de los arcos AB , AC , y son por construccion perpendiculares á la interseccion comun AG de los planos BAG , CAG , y el ángulo que forman quando rematan en la linea $D\delta = Dd'$, es evidentemente igual al ángulo A del triángulo BAC .

744 Es patente que podria servir esta construccion para resolver un triángulo cuyos tres ángulos fuesen dados, aplicando la resolucion á un triángulo, cuyas partes fuesen todas suplemento de las del triángulo que se hubiere de resolver (684).

745 Es tambien patente que podria servir igualmente la misma construccion para resolver un triángulo, dados dos de sus lados, y el ángulo que forman. Porque si

Fig. hiciéramos los dos arcos AB , AC respectivamente iguales
 282. á los lados del ángulo dado, y tiráramos las tangentes AD ,
 Ad que rematasen en los radios GB , y GC prolongados
 quanto fuere menester; solo faltaría hacer el ángulo $DA\delta$
 igual al ángulo dado, y tirar $D\delta$, despues de tomada $A\delta$
 igual á la tangente Ad . Finalmente, desde los puntos G , D
 como centros, y con los radios $Gd' = Gd$, $Dd' = D\delta$ se
 trazarian dos arcos de círculo cuya interseccion determi-
 naría un punto d' , desde el qual tiraríamos al centro G el
 radio $d'G$, y resultaría el arco BC' igual al tercer lado,
 por cuyo medio se sacarían los demás ángulos.

*Demuéstranse algunas propiedades mas de los triángulos
 esféricos.*

283. 746 En un triángulo esférico ABC , siempre se ve-
 rificarán las equaciones siguientes.

$$\text{Sen } A = \frac{\text{sen } BC \cdot \text{sen } C}{\text{sen } AB} = \frac{\text{sen } BC \cdot \text{sen } B}{\text{sen } AC}$$

$$747 \quad \text{Sen } B = \frac{\text{sen } AC \cdot \text{sen } A}{\text{sen } BC} = \frac{\text{sen } AC \cdot \text{sen } C}{\text{sen } AB}$$

$$748 \quad \text{Sen } C = \frac{\text{sen } AB \cdot \text{sen } B}{\text{sen } AC} = \frac{\text{sen } AB \cdot \text{sen } A}{\text{sen } BC}$$

$$749 \quad \text{Sen } AB = \frac{\text{sen } BC \cdot \text{sen } C}{\text{sen } A} = \frac{\text{sen } AC \cdot \text{sen } C}{\text{sen } B}$$

$$750 \quad \text{Sen } AC = \frac{\text{sen } AB \cdot \text{sen } B}{\text{sen } C} = \frac{\text{sen } BC \cdot \text{sen } B}{\text{sen } A}$$

$$751 \quad \text{Sen } BC = \frac{\text{sen } AC \cdot \text{sen } A}{\text{sen } B} = \frac{\text{sen } AB \cdot \text{sen } A}{\text{sen } C}$$

$$752 \quad \text{Cos } A = \frac{\cos BC - \cos AC \cdot \cos AB}{\text{sen } AC \cdot \text{sen } AB} = \cos BC \cdot \text{sen } B \cdot$$

$$\text{sen } C - \cos B \cdot \cos C.$$

$$753 \quad \text{Cos } B = \frac{\cos AC - \cos AB \cdot \cos BC}{\text{sen } AB \cdot \text{sen } BC} = \cos AC \cdot \text{sen } C \cdot$$

$$\text{sen } A - \cos C \cdot \cos A.$$

Cos



$$754 \quad \text{Cos } C = \frac{\cos AB - \cos AC \cdot \cos BC}{\sin AC \cdot \sin BC} = \cos AB.$$

sen A . sen B — cos A . cos B.

$$755 \quad \text{Cos } AB = \frac{\cos C + \cos A \cdot \cos B}{\sin A \cdot \sin B}.$$

$$756 \quad \text{Cos } AC = \frac{\cos B + \cos C \cdot \cos A}{\sin C \cdot \sin A}.$$

$$757 \quad \text{Cos } BC = \frac{\cos A + \cos B \cdot \cos C}{\sin B \cdot \sin C}.$$

$$758 \quad \text{Tang } A = \frac{\sin B}{\cot BC \cdot \sin AB - \cos B \cdot \cos AB} =$$

sen C

$$759 \quad \text{Tang } B = \frac{\sin C}{\cot AC \cdot \sin AB - \cos C \cdot \cos AB} =$$

sen A

$$760 \quad \text{Tang } C = \frac{\sin A}{\cot AB \cdot \sin AC - \cos A \cdot \cos AB} =$$

sen B

$$761 \quad \text{Tang } AB = \frac{\sin BC}{\cot C \cdot \sin A + \cos B \cdot \cos C} =$$

sen AC

$$762 \quad \text{Tang } AC = \frac{\sin BC}{\cot B \cdot \sin A + \cos C \cdot \cos BC} =$$

sen AB

$$763 \quad \text{Tang } BC = \frac{\sin AC}{\cot A \cdot \sin B + \cos C \cdot \cos A} =$$

sen AB

$$764 \quad \text{Cot } A = \frac{\cot BC \cdot \sin AB}{\sin B} - \cos AB \cdot \cot B =$$

cot BC . sen AC

$$765 \quad \text{Cot } B = \frac{\cot AC \cdot \sin BC}{\sin C} - \cos BC \cdot \cot C =$$

cot AC . sen AB

$$766 \quad \text{Cot } C = \frac{\cot AB \cdot \sin AC}{\sin A} - \cos AC \cdot \cot A =$$

cot AB . sen BC

$$767 \quad \text{Cot } AB = \frac{\cot C \cdot \sin B}{\sin BC} + \cos B \cdot \cot BC =$$

$$\text{Fig.} = \frac{\text{sen } A \cdot \cot C}{\text{sen } AC} + \cot AC \cdot \cos A.$$

$$768 \quad \cot AC = \frac{\cot B \cdot \text{sen } C}{\text{sen } BC} + \cos C \cdot \cot BC =$$

$$\frac{\cot B \cdot \text{sen } A}{\text{sen } AB} + \cot AB \cdot \cos A.$$

$$769 \quad \text{Por la misma razon } \cot BC = \frac{\cot A \cdot \text{sen } C}{\text{sen } AC} +$$

$$\cos C \cdot \cot A = \frac{\cot A \cdot \text{sen } B}{\text{sen } AB} + \cot AB \cdot \cos B.$$

770 *Un arco tirado dentro de un ángulo esférico muy*
 284. *pequeño, perpendicularmente á los lados, es igual al mismo*
angulillo multiplicado por el seno de la distancia del arco al
vértice del ángulo.

Supongamos dos círculos máximos ADB , AEC que formen uno con otro en A un ángulo muy pequeño, que AC sea de 90° , de modo que BC sea la medida del angulillo A ; á una distancia qualquiera del vértice A tírese otro arco de círculo máximo DE perpendicular á ADB , tan pequeño que se le pueda considerar como una linea recta, siendo al mismo tiempo AD sensiblemente igual con AE . Del triángulo ADE , rectángulo en E y D , sacaremos (698): El radio es al seno de la hipotenusa AE , como el seno del ángulo A es al seno del arco pequeño DE , ó como el ángulo A es al arco DE (por ser los arcos pequeños iguales con sus senos), ó como el arco BC es al arco DE . Por consiguiente si tomamos por radio la unidad, tendremos $1 : \text{sen } AE :: BC : DE$; luego $DE = BC \cdot \text{sen } AE$.

771 La demostracion de las seis primeras fórmulas (746 751) se funda en lo demostrado (713); pasaremos, pues, á demostrar las fórmulas 752 757.

Con

Con esta mira baxarémos una perpendicular CX al Fig. uno de los lados adyacentes al ángulo A , de donde re- 285.
sulta esta proporcion (714. 4.^o) $\cos BX : \cos AX ::$
 $\cos BC : \cos AC$; luego $\cos BC = \frac{\cos AC \cdot \cos BX}{\cos AX}$. Pero
 $\cos BX = \cos(AB - AX) = \cos AB \cdot \cos AX +$
 $\sin AB \cdot \sin AX$ (I. 656.); luego $\cos BC =$
 $\frac{\cos AC \cdot \cos AB \cdot \cos AX + \sin AB \cdot \sin AX \cdot \cos AC}{\cos AX} = \cos AC \cdot \cos AB$
 $+ \sin AB \cdot \frac{\sin AX}{\cos AX} \cdot \cos AC$. Pero $\frac{\sin AX}{\cos AX} = \tan AX$ (II. 367)
 $= \tan AC \cdot \cos A$ (699) $= \frac{\sin AC}{\cos AC} \cdot \cos A$; luego
 $\cos BC = \cos AC \cdot \cos AB + \sin AB \cdot \frac{\sin AC \cdot \cos A \cdot \cos AC}{\cos AC} =$
 $\cos AC \cdot \cos AB + \sin AB \cdot \sin AC \cdot \cos A$, que es la pri-
mera parte de la fórmula 757. Del mismo modo se de-
mostrarían las fórmulas 755 y 756.

De esta equacion se saca $\cos A = \frac{\cos BC - \cos AC \cdot \cos AB}{\sin AB \cdot \sin AC}$,
primera parte de la fórmula 752: por el mismo camino
hallaríamos la primera parte de las fórmulas 753 y 754.

772. Si eliminamos el denominador de la fórmu-
la (771) $\cos A = \frac{\cos BC - \cos AC \cdot \cos AB}{\sin AC \cdot \sin AB}$, añadimos des-
pues á cada miembro $\sin AB \cdot \sin AC$, y trasladamos
del uno al otro miembro las cantidades correspondientes,
la expresada fórmula se convertirá en estotra; $\sin AB \cdot$
 $\sin AC - \sin AB \cdot \sin AC \cdot \cos A = \sin AB \cdot \sin AC$
 $+ \cos AB \cdot \cos AC - \cos BC$. Si reflexionamos que el
primer miembro es $\sin AB \cdot \sin AC \times (1 - \cos A)$, que
en el segundo $\sin AB \cdot \sin AC + \cos AB \cdot \cos AC =$
(I. 656) $\cos(AB - AC)$, sacarémos con hacer la
substitucion correspondiente esta proporcion: $\sin AB \cdot$
 $\sin$

Fig. $\text{sen } AC : 1 :: \cos(AB - AC) - \cos BC : 1 - \cos A$, ó $\text{sen } AB . \text{sen } AC : 1 :: \text{sen verso } BC - \text{sen verso}(AB - AC) : \text{sen verso } A$. El quarto término es qual digo, porque $\cos(AB - AC) - \cos BC$ es lo mismo que $1 - \cos BC$ menos $1 - \cos(AB - AC)$, y $1 - \cos BC = \text{sen verso } BC$, y $1 - \cos(AB - AC) = \text{sen verso}(AB - AC)$.

773 Para demostrar la segunda parte de la fórmula 752, en que $\cos A = \cos BC . \text{sen } B . \text{sen } C - \cos B$.
 285 $\cos C$; llamaremos b la tangente de BCX , y siendo el radio $= 1$, el triángulo rectángulo que forman la secante, y la tangente de un arco qualquiera con el radio, dará para el valor de la secante del ángulo BCX la expresion $\sqrt{1 + bb}$; y de la semejanza del triángulo que formen el radio, la secante, y la tangente de un ángulo, con el que forman el radio, el seno y el coseno del mismo ángulo, sacaremos que el seno del ángulo BCX será $\frac{b}{\sqrt{1+bb}}$, y su coseno $\frac{1}{\sqrt{1+bb}}$; llamaremos a el seno del ángulo C , y b su coseno. Por lo dicho (I.655) sacaremos $\text{sen } XCA = \text{sen } ACB . \cos XCB - \text{sen } XCB . \cos ACB = \frac{a-bb}{\sqrt{1+bb}}$ con substituir en lugar de las lineas trigonométricas sus valores literales; pero (714. 1.º) $\text{sen } BCX : \text{sen } XCA :: \cos B : \cos A$, ó $\frac{b}{\sqrt{1+bb}} : \frac{a-bb}{\sqrt{1+bb}} :: \cos B : \cos A$; luego $\cos A = \frac{a-bb}{b} . \cos B = \frac{\text{sen } ACB . \cos B}{\text{tang } BCX} - \cos B . \cos C$. Pero $\frac{\cos B}{\text{tang } BCX} = \cos BC . \text{sen } C$; porque en el triángulo CBX tenemos $\cos BC : 1 :: \cot B : \text{tang } BCX$ (703); luego $\text{tang } BCX = \frac{\cot B}{\cos BC} = \frac{\cos B}{\cos BC . \text{sen } B}$, substituyendo en lugar de $\cot B$ su valor $\frac{\cos B}{\text{sen } B}$ (II. 367);
 lue-

luego $\frac{\cos B}{\tan BCX} = \cos BC \cdot \sin B$, substituyendo este valor en la expresion de $\cos A$, se transformará en $\sin ACB \cdot \cos BC \cdot \sin B - \cos B \cdot \cos C$.

774 Por este mismo rumbo se demostraría la segunda parte de las fórmulas 753 y 754.

775 Para demostrar la segunda parte de la fórmula 755, basta despejar $\cos AB$ en la segunda parte del núm. 754; porque como $\cos C = \cos AB \cdot \sin A \cdot \sin B - \cos A \cdot \cos B$, será $\cos AB = \frac{\cos C + \cos A \cdot \cos B}{\sin A \cdot \sin B}$. Del mismo modo se probaría la segunda parte de las fórmulas 756 y 757.

776 Las fórmulas 758, 759 y 760 se demuestran todas de un mismo modo, por lo que bastará demostrar la primera.

Por lo probado (714. 3.º y II.368) $\tan A = \frac{\tan B \cdot \sin BX}{\sin AX}$; pero $\sin AX = \sin(AB - BX) = \sin AB \cdot \cos BX - \sin BX \cdot \cos AB$, luego $\frac{\sin AX}{\sin BX} = \frac{\sin AB \cdot \cos BX}{\sin BX} - \cos AB = \cos AB = \sin AB \cdot \cot BX - \cos AB = \frac{\sin AB}{\tan BX} - \cos AB$. Pero $\frac{1}{\tan BA} = \frac{1}{\cos B \cdot \tan BC}$, porque de lo probado (699) sale $1 : \cos B :: \tan BC : \tan BX$, y $\tan BX = \tan BC \cdot \cos B$; luego $\frac{\sin AX}{\sin BX} = \frac{\sin AB}{\cos B \cdot \tan BC} - \cos AB = \frac{\sin AB - \cos AB \cdot \cos B \cdot \tan BC}{\cos B \cdot \tan BC}$. Por consiguiente $\frac{\sin BX}{\sin AX} \tan B$, esto es $\tan A = \frac{\cos B \cdot \tan B \cdot \tan BC}{\sin AB - \cos AB \cdot \cos B \cdot \tan BC}$. Si en lugar de $\tan B \cdot \cos B$ substituimos su valor $\sin B$, y lo dividimos todo por $\tan BC$, sacaremos finalmente $\tan A = \frac{\sin B}{\sin AB \cdot \cot BC - \cos B \cdot \cos AB}$.

777 Las fórmulas 761, &c. se demuestran por los nú-

Fig. núm. 758, &c. acudiendo al triángulo suplementario.

Porque si nos figuramos al rededor del triángulo ABC un triángulo polar abc , cuyo ángulo b esté del mismo lado que el ángulo B del triángulo ABC ; entonces en lugar de

$$283 \quad \begin{aligned} \text{tang } A &= \frac{\text{sen } B}{\cot BC \cdot \text{sen } AB - \cos B \cdot \cos AB} \quad (758) \\ \text{tang } bc &= \frac{\text{sen } ac}{\cot a \cdot \text{sen } c - \cos ac \cdot \cos c} \end{aligned}$$

que es la fórmula 763. Solo se han de mudar los signos del denominador, porque en el triángulo suplementario los lados son los suplementos de los ángulos del triángulo dado, por cuyo motivo los cosenos mudan de signo (II.361).

778 La fórmula 764 $\cot A$ &c. es la inversa de 758, poniendo $\cot B$ en lugar de $\frac{\cos B}{\text{sen } B}$; porque $\cot A = \frac{1}{\text{tang } A} = \frac{\cot BC \cdot \text{sen } AB}{\text{sen } B} - \frac{\cos B \cdot \cos AB}{\text{sen } B} = \frac{\cot BC \cdot \text{sen } AB}{\text{sen } B} - \cos AB \cdot \cot B$. Del mismo modo demostraríamos las fórmulas 765 y 766.

779 La fórmula 767 es la inversa de 761, substituyendo $\cot BC$ en lugar de $\frac{\cos BC}{\text{sen } BC}$. Tambien se le podrá dar á la fórmula 767 la forma siguiente: $\cot AB = \frac{\text{sen } A \cdot \cos C \cdot \cos A \cdot \text{sen } C \cdot \cos AC}{\text{sen } C \cdot \text{sen } AC}$, substituyendo en lugar de $\cot C$ su valor $\frac{\cos C}{\text{sen } C}$, y en lugar de $\text{sen } AC \cdot \cot AC$ su valor $\cos AC$.

De las Analogías diferenciales.

Las analogías que resuelven los casos de ambas Trigonometrías suponen constantes las seis partes que en todo triángulo se consideran, y por consiguiente no salen exactos los resultados que en ellas se fundan, quando alguno de los datos de la cuestion padece algun incremento ó de-

decremento que sea preciso llevar en cuenta. Esto sucede Fig. particularmente en muchos cálculos astronómicos, por cuyo motivo solo trataremos de las analogías diferenciales correspondientes á la Trigonometría esférica.

780 *Si suponemos constantes un ángulo y su lado adyacente, la diferencial del otro lado adyacente al ángulo constante es á la diferencial del lado opuesto, como el radio es al coseno del ángulo opuesto al lado constante.*

Supongamos constantes en el triángulo BAC el ángulo A , y el lado adyacente CA ; la diferencial de AB será á la de CB , como el radio es al coseno de B . Con efecto, quando el lado AB crece una corta cantidad BD , el triángulo ACB se transforma en otro triángulo ACD ; si hacemos $CE = CB$, y tiramos el arco BE perpendicular á CED , será DE la diferencial del lado CB , porque DE es el exceso que CD le lleva á CB . Fuera de esto, el ángulo EDB es igual con el ángulo CBA , porque suponemos infinitamente pequeño, y por consiguiente rectilíneo el triángulo EDB ; el arco EB es perpendicular á CB y á CE , y por lo mismo el ángulo CBE es recto. Luego $EBD + DBF = 90^\circ$, y como $DBF = CBA$ será EBD el complemento de CBA . Pero en el triangulillo rectilíneo EBD , el ángulo EBD es el complemento de EDB ; luego el ángulo EDB es igual con el ángulo CBA . Sentado esto, demostraremos facilísimamente que $BD : DE :: R : \cos EDB$ ó CBA . Sabemos que en un triángulo rectilíneo BED rectángulo en

en E , la hipotenusa BD es á un lado DE como el radio es al coseno del ángulo D adyacente á dicho lado. Luego si llamamos dCB la diferencial ED del lado CB , resultará la misma proposicion que hemos sentado.

781 Luego $dAB : dCB :: R : \cos B$, de aquí inferirémos las analogías siguientes por medio de las propiedades que dexamos sentadas de los triángulos esféricos; por exemplo, si en lugar de $\cos B$ substituimos succesivamente sus dos valores (753), sacarémos

782 $dAB : dCB :: \sin AB \cdot \sin CB : R \cdot \cos CA - \cos AB \cdot \cos CB$. Sácase esta proporcion, substituyendo en lugar de $\cos B$ su valor sacado, siendo el radio $= R$, porque entonces $\cos B = \frac{R \cdot \cos AC - R \cdot \cos AB \cdot \cos BC}{\sin AB \cdot \sin BC}$.

783 $dAB : dCB :: R : \cos CA \cdot \sin C \cdot \sin A - \cos C \cdot \cos A$.

784 Si el ángulo A fuere de 90° , tendrémos $dAB : dCB :: \tan BC : \tan AB$. Porque siendo recto el ángulo A se verifica (699) $R : \cos B :: \tan BC : \tan AB$; luego &c.

785 Si el arco BC fuere de 90° , tambien se verificará la proporcion de antes (781), por grandes que sean las diferenciales de BC y AB , esto es, los arcos ED y BD , con tal que apelemos á los senos, y digamos $\sin dAB : \sin dBC :: R : \cos B$.

Porque en el triángulo BDE rectángulo en E (698) $R : \sin BD :: \sin DBE : \sin ED$; y como $BD = dAB$, $ED = dCB$, y DBE es complemento de BDE , por cuyo

mo-

motivo $\text{sen } DBE = \cos BDE = \cos B$, la proporcion Fig.
 será $R : \text{sen } dAB :: \cos B : \text{sen } dBC$, ó $\text{sen } dAB : \text{sen } dBC$
 $:: R : \cos B$.

786 Quando un ángulo y el lado adyacente son constantes, la diferencial del ángulo adyacente al lado constante es á la diferencial del ángulo opuesto, como el radio es al coseno del lado opuesto al ángulo constante.

Supongamos constantes en el triángulo esférico ABC 286 el ángulo A , y el lado AC . Desde los puntos A, B, C como polos se trazarán los arcos FE, FD, DE que formarán el triángulo suplementario FED , cuyo ángulo F será el suplemento del lado AB , el lado FD será el suplemento del ángulo B , el lado FE será el suplemento del ángulo A &c. por lo qual podremos considerar en el triángulo suplementario EFD el ángulo E , y el lado adyacente FE como constantes. Si contrahemos á este caso lo demostrado (780), sacaremos que la diferencial del lado DE es á la del lado FD , como el radio es al coseno del ángulo D ; luego si en lugar de los términos de esta proporcion substituímos los que les corresponden en el triángulo ABC , y tienen los mismos senos, y las mismas diferenciales, sacaremos que la diferencial del ángulo C es á la diferencial del ángulo B , como el radio es al coseno del lado BC .

787 Luego $dB : dC :: \cos BC : R$.

788 $dB : dC :: \cos A + \cos B \cdot \cos C : \text{sen } B \cdot \text{sen } C$.

789 $dB : dC :: \cos A \cdot \text{sen } AC \cdot \text{sen } AB + \cos AC$.

Fig. $\cos AB : R$, con substituir en lugar de $\cos BC$ sus valores (757).

790 Si $A = 90^\circ$, $dB : dC :: \cot C : \tan B$, porque en un triángulo rectángulo $\cos BC = \frac{\cot C}{\tan B}$ (703).

791 Si $B = 90^\circ$, la variacion del ángulo B será nula.

792 Quando un ángulo, y el lado adyacente son constantes, la diferencial del ángulo adyacente al lado constante será á la diferencial del lado opuesto al ángulo constante, como la tangente del ángulo opuesto al lado constante es al seno del lado opuesto al ángulo constante.

285 Sean A y AC constantes; prolónguense el lado CB hasta que sea $CF = 90^\circ$, y CD hasta que CG sea tambien $= 90^\circ$. El pequeño arco FG será la medida del ángulo ECB , y será por consiguiente la diferencial del ángulo C , siendo así que DE es la diferencial del lado CB . Nos toca, pues, demostrar que $FG : DE :: \tan B : \sin BC$. Para cuyo fin consideraremos que (770) que $FG : BE :: R : \sin BC$ (1.667); $DE : BE :: R : \tan BDE$ ó CBA ; luego $FG \cdot \sin BC = DE \cdot \tan CBA$, de donde se saca $FG : DE :: \tan B : \sin BC$.

793 Esto es, $dB : dC :: \sin BC : \tan B$.

794 $dB : dC :: \sin A \cdot \sin AC : \tan B \cdot \sin B$, con substituir en lugar de $\sin BC$ su primer valor (751).

795 $dB : dC :: \sin^2 BC \cdot \cot AC - \sin BC \cdot \cos BC \cdot \cos C : \sin C$, con substituir en lugar de $\tan B$ su primer valor (759).

Si

796 Si $BC = 90^\circ$, será $dB : dC :: R : \text{tang } B$ por Fig. ser $R = \text{sen } 90^\circ = \text{sen } BC$ en este caso.

797 Quando son constantes un ángulo, y uno de los lados adyacentes á dicho ángulo, la diferencial del lado variable adyacente al ángulo constante será á la diferencial del ángulo opuesto al lado constante, como la tangente del lado opuesto al ángulo constante es al seno del ángulo opuesto al lado constante.

Supongamos en el triángulo ABC constantes el ángulo A y el lado AC . La misma proporcion manifiesta que en el triángulo suplementario FDE el ángulo E y el lado EF son constantes, y las variaciones del ángulo F y del lado DF serán respectivamente las mismas que las del lado AB y del ángulo B del triángulo ABC . Pero por lo probado (792) $dDF : dF :: \text{sen } DF : \text{tang } D$. Y porque los suplementos uno de otro tienen una misma tangente y un mismo seno, con substituir á estas cantidades sus correspondientes en el triángulo ABC , sacaremos por lo dicho (793) $dAB : dB :: \text{tang } BC : \text{sen } B$.

798 Es, pues, $dAB : dB :: \text{tang } BC : \text{sen } B$.

799 Y substituyendo en lugar de $\text{sen } B$ su primer valor (747), resultará $dAB : dB :: \text{tang } BC : \text{sen } BC : \text{sen } AC : \text{sen } A$.

800 Quando fueren constantes en un triángulo esférico un ángulo y un lado adyacente á este ángulo, la diferencial del ángulo adyacente al lado constante será á la del lado adyacente al ángulo constante, como el seno del ángulo

Fig. opuesto al lado constante es al seno del lado opuesto al ángulo constante.

285 Hemos de demostrar que quando en el triángulo esférico ABC fueren constantes el ángulo A y el lado AC , $FG : BD :: \text{sen } B : \text{sen } BC$. Con efecto, sabemos (770) que $BE = FG \cdot \text{sen } BC$, y que en el triángulo rectilíneo BED se verifica, llamando 1 al radio, $BE : BD :: \text{sen } B = 1$, por ser el ángulo CBA igual al ángulo EDB , segun probamos (780); luego $BE = BD \cdot \text{sen } B$. Si igualamos uno con otro los dos valores de BE , sacaremos $FG \cdot \text{sen } BC = BD \cdot \text{sen } B$, y de aquí la proporcion $FG : BD :: \text{sen } B : \text{sen } BC$ que habíamos de demostrar.

801 Es, pues, $dAB : dC :: \text{sen } BC : \text{sen } B$.

802 $dAB : dC :: \text{sen}^2 BC : \text{sen } AC \cdot \text{sen } A$, substituyendo en lugar de $\text{sen } B$ su primer valor $\frac{\text{sen } AC \cdot \text{sen } A}{\text{sen } BC}$ (747).

803 $dAB : dC :: \text{sen } AC \cdot \text{sen } A : \text{sen}^2 B$, substituyendo en lugar de $\text{sen } BC$ su primer valor $\frac{\text{sen } AC \cdot \text{sen } A}{\text{sen } B}$ (751).

804 $dAB : dC :: \text{sen } BC \cdot \text{sen } AB : \text{sen } AC \cdot \text{sen } C$, si en lugar de $\text{sen } B$ substituimos su segundo valor $\frac{\text{sen } C \cdot \text{sen } AC}{\text{sen } AB}$ (747).

805 $dAB : dC :: \text{sen } A \cdot \text{sen}^2 AB : \text{sen } AC \cdot \text{sen}^2 C$, con substituir en lugar de $\text{sen } BC$ su valor $\frac{\text{sen } A \cdot \text{sen } AB}{\text{sen } C}$ (747), y en lugar de $\text{sen } B$ su valor $\frac{\text{sen } AC \cdot \text{sen } C}{\text{sen } AB}$.

806 Si $B = 90^\circ$, $dAB : dC :: \text{sen } BC : R$; pero (702) en un triángulo esférico ABC rectángulo en B , $R : \text{sen } BC :: \text{tang } C : \text{tang } AB$; luego $dAB : dC :: \text{tang } BA : \text{tang } C$.

Si

807 Si suponemos constantes un ángulo A , y el lado CA adyacente al mismo ángulo, la diferencial del ángulo B opuesto al lado constante será á la diferencial del lado BC opuesto al ángulo constante, como la tangente del ángulo B opuesto al lado constante AC es á la tangente del lado BC opuesto al ángulo constante A . Fig.

Porque nos consta (713) que $\text{sen } A : \text{sen } BC :: 285$
 $\text{sen } B : \text{sen } AC$; y como los dos extremos de esta proporción son constantes, el seno del ángulo B será tanto menor ó mayor, quanto mayor ó menor fuere el seno del lado BC , porque sin esto no podria el producto de los extremos ser igual al producto de los medios; esto quiere decir que el seno del ángulo B estará en razon inversa del seno del lado BC ; luego sus diferenciales estarán tambien en la misma razon; quiero decir que la diferencial del seno de B será á la del seno de BC , como $\text{sen } B$ es á $\text{sen } BC$. Pero $d \text{ sen } B = dB \cdot \cos B$ (352), y $d \text{ sen } BC = dBC \cdot \cos BC$; luego $dB \cdot \cos B : dBC \cdot \cos BC :: \text{sen } B : \text{sen } BC$; y $dB \cdot \cos B \cdot \text{sen } BC = dBC \cdot \cos BC \cdot \text{sen } B$; luego $dB : dBC :: \cos BC \cdot \text{sen } B : \cos B \cdot \text{sen } BC :: \text{sen } B : \frac{\cos B \cdot \text{sen } BC}{\cos BC}$ (con dividir los dos últimos términos por $\cos BC$)
 $:: \frac{\text{sen } B}{\cos B} : \frac{\text{sen } BC}{\cos BC}$ (con dividir los dos últimos términos por $\cos B$); luego $dB : dBC :: \frac{\text{sen } B}{\cos B} : \frac{\text{sen } BC}{\cos BC} :: \text{tang } B : \text{tang } BC$.

808 Es, pues, $dBC : dB :: \text{tang } BC : \text{tang } B$.

809 Si $B = 90^\circ$, será nula la variacion de BC y B .

810 En qualquiera triángulo esférico ABC que tenga

Fig. constantes un lado BC , y el ángulo A opuesto á dicho lado, la diferencial del uno de los otros ángulos C será á la del lado AB opuesto al mismo ángulo C , como la tangente de este mismo ángulo C es á la tangente del mismo lado AB opuesto á dicho ángulo.

287

Supongamos el triángulo ABC transformado en otro triángulo ADE que discrepe del primero infinitamente poco, y tal que DE sea igual con BC , esto es, que el lado opuesto al ángulo constante A sea constante; sacaremos esta proporcion: $\text{sen } C : \text{sen } AB :: \text{sen } A : \text{sen } BC (713)$; y como los dos últimos términos de la proporcion son constantes, el seno de C será al seno de AB en razon constante, Y porque lo mismo se verifica respecto de sus diferenciales, será $d \text{ sen } C : d \text{ sen } AB :: \text{sen } C : \text{sen } AB$. Pero $d \text{ sen } C = dC \cdot \cos C$, y $d \text{ sen } AB = dAB \cdot \cos AB (352)$, tendremos $dC \cdot \cos C : dAB \cdot \cos AB :: \text{sen } C : \text{sen } AB$; $dC \cdot \cos C \cdot \text{sen } AB = dAB \cdot \cos AB \cdot \text{sen } C$; luego $dC : dAB :: \cos AB \cdot \text{sen } C : \cos C \cdot \text{sen } AB$; dividiendo los dos últimos términos por $\cos C \cdot \cos AB$, resulta por último $dC : dAB :: \frac{\text{sen } C}{\cos C} : \frac{\text{sen } AB}{\cos AB} :: \text{tang } C : \text{tang } AB$.

811 Es, pues, $dAB : dC :: \text{tang } AB : \text{tang } C$.

812 Si $A = 90^\circ$, será $dAB : dC :: \text{sen } AC : R$; porque en este caso $R : \text{sen } AC :: \text{tang } C : \text{tang } AB (702)$.

813 Si $B = 90^\circ$, $dAB : dC :: \text{sen } BC : R$, porque entonces $R : \text{sen } BC :: \text{tang } C : \text{tang } AB (702)$.

814 Si en lugar del lado AB , y del ángulo C su opuesto, consideráramos el lado AC , y el ángulo opuesto

B ,

B, sacaríamos discurriendo del mismo modo $dAC : dB :: \text{Fig.}$
 $\text{tang } AC : \text{tang } B$.

815 Si $A = 90^\circ$, $dAC : dB :: \text{sen } AB : R$.

816 Si $C = 90^\circ$, $dAC : dB :: \text{sen } BC : R$.

817 Si un lado BC , y el ángulo opuesto A fuesen cons- 287
 tantes, la diferencial del uno de los lados variables AB será
 á la diferencial del otro lado AC , como el coseno del ángulo C
 opuesto al primer lado AB es al coseno del ángulo B opuesto
 al segundo lado AC .

Una vez que segun supusimos (810) el lado BC
 es igual con el lado DE , estos dos lados no podrán me-
 nos de cortarse en un punto H dentro del triángulo, ó
 fuera, con tal que se prolonguen. Desde el punto de in-
 terseccion H tiraremos por los puntos B y C unos arcos
 pequeños BF y CG , que cortarán en la DE los arcos HG
 $= HC$, $HF = HB$. Las diferencias FD , GE son igua-
 les, porque por la construccion $FG = BC$, y como DE
 $= BC$, por el supuesto, será $FG = DE$, y si de cada
 arco quitamos la parte comun FE , quedará $DF = GE$.
 Esto supuesto, el triangulillo rectilineo BDF nos dará
 $BD : FD :: R : \text{sen } FBD$, ó $\cos BDF$, ó $\cos ABC$; y el
 triangulillo GCE , $CE : GE$ ó $FD :: R : \text{sen } GCE$, ó $\cos ACB$;
 de donde se sacan las dos equaciones $FD = BD \cdot \cos ABC$,
 y $FD = CE \cdot \cos ACB$; luego $BD \cdot \cos ABC = CE \cdot$
 $\cos ACB$.

818 Quiero decir que $dAB : dAC :: \cos C : \cos B$.

819 $dAB : dAC :: \cos AB \cdot \text{sen } AB - \cos AC$.

Fig. $\cos BC \cdot \operatorname{sen} AB : \cos AC \cdot \operatorname{sen} AC = \cos AB \cdot \cos BC \cdot \operatorname{sen} AC$, substituyendo en lugar de coseno C y cos B sus primeros valores (753 y 754).

286 820 Cuando un lado BC , y el ángulo opuesto A sean constantes, la diferencial del ángulo B será á la diferencial del ángulo C , como el coseno del lado AC opuesto al ángulo B es al coseno del lado AB opuesto al ángulo C .

Si trazamos el triángulo suplementario DEF (684), los ángulos E y F serán los suplementos de los lados AC y AB del triángulo dado ABC ; serán, pues, constantes el ángulo D , y el lado FE , y tendremos (817) la proporcion siguiente $dFD : dED :: \cos E : \cos F$, substituyendo en lugar de estos quatro términos los que les corresponden en el triángulo ABC , se sacará la proporcion que nos propusimos demostrar.

821 Es, pues, $dB : dC :: \cos AC : \cos AB$.

822 $dB : dC :: \cos B \cdot \operatorname{tang} AB \cdot \operatorname{sen} BC + \cos BC \cdot R$, despues de substituir en lugar de $\cos AC$ su primer valor (756), y en lugar de $\frac{\operatorname{sen} AB}{\cos AB}$ su valor $\operatorname{tang} AB$.

287 823 Cuando son constantes un lado BC y el ángulo A opuesto á dicho lado, la diferencial del uno de los lados variables AB es á la diferencial del ángulo B adyacente á dicho lado, como el seno de dicho lado AB es á la tangente del ángulo C opuesto á dicho lado, multiplicada por el coseno del tercer lado AC .

Porque $dAB : dB :: dAB \cdot dC : dB \cdot dC$; pero $dAB : dC :: \operatorname{tang} AB : \operatorname{tang} C$ (811), y $dC : dB :: \cos AB : \cos AC$ (821); luego multiplicando ordenadamente

las

las dos últimas proporciones, saldrá $dAB : dC : dC : dB :: \text{tang } AB \cdot \cos AB : \text{tang } C \cdot \cos AC :: \text{sen } AB : \text{tang } C \cdot \cos AC$ (substituyendo en lugar de $\text{tang } AB$ su valor $\frac{\text{sen } AB}{\cos AB}$); luego $dAB : dB :: \text{sen } AB : \text{tang } C \cdot \cos AC$.

824 $dAB : dB :: \cos C \cdot \text{tang } AC : \text{sen } B$. Porque $dAB : dB :: dAB \cdot dAC : dB \cdot dAC$; pero (818) $dAB : dAC :: \cos C : \cos B$, y (814) $dAC : dB :: \text{tang } AC : \text{tang } B$; luego multiplicando ordenadamente las dos últimas proporciones, tendremos $dAB \cdot dAC : dB \cdot dAC :: \cos C \cdot \text{tang } AC : \cos B \cdot \text{tang } B$, ó $\text{sen } B$; luego por último $dAB : dB :: \cos C \cdot \text{tang } AC : \text{sen } B$.

825 $dAB : dB :: \text{sen } AB : \text{tang } C \cdot \cos AC$. Se demuestra considerando que el tercer término de la última analogía (824) $\cos C \cdot \text{tang } AC = \frac{\text{sen } C}{\text{tang } C} \cdot \frac{\text{sen } AC}{\cos AC}$; y que el segundo valor (747) de $\text{sen } B$ es $\frac{\text{sen } AC \cdot \text{sen } C}{\text{sen } AB}$, y haciendo en la última analogía las correspondientes substituciones.

826 Si $A = 90^\circ$, tendremos $dAB : dB :: \text{tang } AC \cdot \cos AB : R$. Para demostrarlo hemos de tener presente, que $\text{tang } C = \frac{\text{tang } AB}{\text{sen } AC}$ (702), y que haciendo en la última analogía (825) la substitucion correspondiente, saldrá $dAB : dB :: \text{sen } AB : \frac{\text{tang } AB \cdot \cos AC}{\text{sen } AC} = \frac{\text{tang } AB}{\cot AC}$, porque $\frac{\cos AC}{\text{sen } AC} = \cot AC = \frac{1}{\text{tang } AC}$; luego $dAB : dB :: \text{sen } AB : \frac{\text{tang } AB}{\text{tang } AC} :: \text{sen } AB \cdot \text{tang } AC : \text{tang } AB :: \frac{\text{sen } AB \cdot \text{tang } AC}{\text{tang } AB} : R$, dividiendo los dos últimos términos por $\text{tang } AB$. Y porque $\frac{\text{sen } AB}{\text{tang } AB} = \cos AB$, sale por último haciendo la substitucion, $dAB : dB :: \text{tang } AC \cdot \cos AB : R$.

Fig. 827 Si en la analogía fundamental (823) substituimos en lugar de $\cos AC$ su valor $\frac{\text{sen } AC}{\text{tang } AC}$, sacaremos $dAB : dB :: \text{tang } AC . \text{sen } AB : \text{tang } C . \text{sen } AC$.

828 $dAB : dB :: \text{tang } AC . \cos AB - \text{sen } AC . \cos BC : \text{sen } B . \text{sen } AC - \text{sen } BC$, con substituir en la fórmula (824) en lugar de $\cos C$ su primer valor (754), y $\text{sen } AC$ en lugar de $\text{tang } AC . \cos AC$ en el segundo término del segundo antecedente que resulta de la primera substitucion.

829 Si al lado AB , y su ángulo adyacente B substituimos respectivamente en lo dicho (823) el lado AC , y su lado adyacente C , sacaremos $dAC : dC :: \text{sen } AC : \text{tang } B . \cos AB$.

830 $dAC : dC :: \text{tang } AB . \cos B : \text{sen } C$, substituyendo en lugar de $\cos AB$ su valor $\frac{\text{sen } AB}{\text{tang } AB}$, en lugar de $\text{tang } B$ su valor $\frac{\text{sen } B}{\cos B}$, y últimamente en lugar de $\frac{\text{sen } B . \text{sen } AB}{\text{sen } AC}$ su primer valor $\text{sen } C$ (748).

831 Si $A = 90^\circ$, $dAC : dC :: \frac{1}{2} \text{sen } 2AC : \cot C$. Porque en este supuesto $\text{tang } B = \frac{\text{tang } AC}{\text{sen } AB}$ (702); luego (829) $dAC : dC :: \text{sen } AC : \frac{\text{tang } AC . \cos AB}{\text{sen } AB}$ ó $\frac{\text{tang } AC}{\text{tang } AB} :: \text{sen } AC : \frac{\text{sen } AC}{\cos AC . \text{tang } AB} :: \text{sen } AC . \cos AC : \frac{\text{sen } AC}{\text{tang } AB}$; pero $\frac{\text{sen } AC}{\text{tang } AB} = \cot C$ (702); luego $dAC : dC :: \text{sen } AC . \cos AC : \cot C :: \frac{1}{2} \text{sen } 2AC : \cot C$, como se infiere de lo dicho (II. 378).

288 832 Quando en un triángulo esférico ABC hay dos lados AB , AC constantes, la diferencial del ángulo A que forman es á la diferencial del uno de los otros ángulos B , como

mo

mo el seno del tercer lado BC opuesto al ángulo A es al seno del lado AC opuesto al ángulo B , multiplicado por el coseno del tercer ángulo C .

Supongamos que el triángulo ABC se transforme en otro triángulo ABD que tenga el mismo lado AB , y cuyo lado $AD = AC$; la diferencial del ángulo A será el ángulo CAD , ó el arco FG tirado 90° lejos del punto A , y la diferencial del ángulo B será DBC , ó el arco IH tirado 90° lejos del punto B . Si tiramos el arco CE perpendicular á BCH , será $FG : HI :: FG \cdot CD \cdot CE : HI \cdot CD \cdot CE$, porque los dos últimos términos son los dos primeros multiplicados uno y otro por una misma cantidad; luego $FG = \frac{HI \cdot FG \cdot CD \cdot CE}{HI \cdot CD \cdot CE}$; pero $\frac{FG}{CD} = \frac{1}{\text{sen } AC}$ (770); $\frac{CD}{CE} = \frac{1}{\cos DCE} = \frac{1}{\cos ACB}$, y $\frac{CE}{HI} = \text{sen } BC$; luego $FG = \frac{HI \cdot \text{sen } BC}{\text{sen } AC \cdot \cos ACB}$, lo mismo que hemos sentado.

833 Es, pues, $dA : dB :: \text{sen } BC : \text{sen } AC \cdot \cos C$.

834 $dA : dB :: \text{sen } A : \text{sen } B \cdot \cos C$, porque $\text{sen } BC = \frac{\text{sen } AC \cdot \text{sen } A}{\text{sen } B}$ (713).

835 $dA : dB :: \text{sen } BC \cdot \text{tang } C : \text{sen } AC \cdot \text{sen } C$. Se saca multiplicando el segundo antecedente de la analogía (833) por $\text{tang } C$, y el segundo consecuente por $\frac{\text{sen } C}{\cos C} = \text{tang } C$.

836 $dA : dB :: \text{tang } C \cdot \text{sen } A : \text{sen } B \cdot \text{sen } C$, substituyendo en la proporción (835) el valor de $\text{sen } BC$ sacado de $\text{sen } BC : \text{sen } AC :: \text{sen } A : \text{sen } B$ (713).

837 $dA : dB :: \text{sen } BC \cdot \text{tang } C : \text{sen } B \cdot \text{sen } AB$, substituyendo en la fórmula (835) en lugar de $\text{sen } AC$.

Fig. sen C su igual sen AB . sen B , porque (713) sen B : sen C :: sen AC : sen AB .

838 $dA : dB :: \text{sen}^2 BC : \cos AB - \cos AC \cdot \cos BC$, substituyendo en lo dicho (833) en lugar de $\cos C$ su primer valor (754).

839 $dAB : dB :: \text{sen } AB \cdot \text{sen } A : \text{sen } AC \cdot \frac{1}{2} \text{sen } 2C$.
Porque sen BC : sen $AC \cdot \cos C :: \frac{\text{sen } AB \cdot \text{sen } A}{\text{sen } C}$ (751) :: sen $AC \cdot \cos C$:: sen $AB \cdot \text{sen } A : \text{sen } AC \cdot \text{sen } C \cdot \cos C$
6 sen $AC \cdot \frac{1}{2} \text{sen } 2C$ (II. 378).

840 $dA : dB :: R : \text{sen}^2 B \cdot \cos AB - \text{sen } B \cdot \cos B \cdot \cot A$, substituyendo en la fórmula (834) el segundo valor de $\cos C$ (754), y dividiendo por sen A los dos últimos términos de la proporcion.

841 $dA : dB :: \text{sen}^2 BC : \cos AB - \cos BC \cdot \cos AC$.
Porque si en la analogía (834) substituímos en lugar de $\cos C$ su primer valor (754) sacaremos $dA : dB :: \text{sen } A : \frac{\text{sen } B \cdot \cos AB - \text{sen } B \cdot \cos AC \cdot \cos BC}{\text{sen } AC \cdot \text{sen } BC}$; multiplicando los dos últimos términos por sen $AC \cdot \text{sen } BC$, y dividiéndolos despues por sen $A \cdot \text{sen } AC$, saldrá $dA : dB :: \text{sen } BC : \frac{\text{sen } B \cdot \cos AB - \text{sen } B \cdot \cos AC \cdot \cos BC}{\text{sen } A \cdot \text{sen } AC}$, substituyendo en el último término en lugar de $\frac{\text{sen } B}{\text{sen } A \cdot \text{sen } AC}$ su valor $\frac{1}{\text{sen } BC}$, sacado de lo dicho (751) saldrá $dA : dB :: \text{sen}^2 BC : \cos AB - \cos AC \cdot \cos BC$.

842 Si en vez de considerar en lo dicho (833) el ángulo B , y su lado opuesto AC , consideráramos el ángulo C , y el ángulo opuesto AB , sacaríamos del mismo modo las siguientes analogías.

dA

Fig.

$$dA : dC :: \text{sen } BC : \text{sen } AB \cdot \cos B.$$

$$843 \quad dA : dC :: \text{sen } A : \text{sen } C \cdot \cos B.$$

$$844 \quad dA : dC :: \text{sen } BC \cdot \text{tang } B : \text{sen } AB \cdot \text{sen } B.$$

$$845 \quad dA : dC :: \text{tang } B \cdot \text{sen } BC : \text{sen } AC \cdot \text{sen } C.$$

$$846 \quad dA : dC :: \text{tang } B \cdot \text{sen } A : \text{sen } C \cdot \text{sen } B.$$

$$847 \quad dA : dC :: \text{sen}^2 BC : \cos AC - \cos AB \cdot \cos BC.$$

848 Quando son constantes dos lados AB , AC , la diferencial del ángulo A que forman es á la diferencial del lado opuesto BC , como el radio es al seno de uno ú otro de los otros dos ángulos, de C por egemplo, multiplicado por el seno del lado constante AC , contiguo al mismo ángulo. 288

Hemos de probar que $FG : ED :: 1 : \text{sen } C \cdot \text{sen } AC$.

Con esta mira consideraremos que $FG = \frac{ED \cdot FG \cdot CD}{CD \cdot ED}$, porque borrando las cantidades comunes al numerador y al denominador no queda mas que FG . Pero $\frac{FG}{CD} = \frac{1}{\text{sen } AC}$ (770), y $\frac{CD}{ED} = \frac{1}{\text{sen } ECD} = \frac{1}{\text{sen } ACB}$; luego $FG = \frac{ED}{\text{sen } ACB \cdot \text{sen } AC}$; quiere decir, que $FG : ED :: 1 : \text{sen } C \cdot \text{sen } AC$.

849 Es, pues, $dA : dBC :: 1 : \text{sen } AC \cdot \text{sen } C$.

850 $dA : dBC :: 1 : \text{sen } AB \cdot \text{sen } B$, porque (713) $\text{sen } AC : \text{sen } AB :: \text{sen } B : \text{sen } C$.

851 $dA : dBC :: 1 : \text{sen } BC \cdot \text{sen } C : \text{sen } A \cdot \text{sen } B \cdot \text{sen}^2 AB$, con multiplicar en la analogía (850) el tercer término por $\text{sen } BC \cdot \text{sen } C$, y el quarto por $\text{sen } A \cdot \text{sen } AB$ que vale lo mismo (713).

852 Si el lado $BC = 90^\circ$, saldrá esta equacion $dA = \frac{dBC}{\sqrt{(\text{sen}^2 AC - \cos^2 AB)}}$.

Para demostrarlo levantaremos un arco CL perpendi-

cu-

Fig. cular á BC y á BL , cuyo polo sea B , por manera que $BL = 90^\circ$. Sabemos (698) que en el triángulo ACL , $\text{sen } AC : 1 :: \text{sen } AL \text{ ó } \cos AB : \text{sen } ACL \text{ ó } \cos ACB$, luego $\cos C = \frac{\cos AB}{\text{sen } AC}$; luego $\text{sen } ACB = \sqrt{1 - \frac{\cos^2 AB}{\text{sen}^2 AC}}$; si en la fórmula (849) substituimos esta cantidad en lugar de $\text{sen } C$, sacaremos $dA : dBC :: 1 : \text{sen } AC$.

$$\sqrt{1 - \frac{\cos^2 AB}{\text{sen}^2 AC}}, \text{ de donde sacamos } dA = \frac{dBC}{\text{sen } AC \sqrt{1 - \frac{\cos^2 AB}{\text{sen}^2 AC}}}$$

$$= \frac{dBC}{\text{sen } AC \sqrt{(\text{sen}^2 AC - \cos^2 AB)}} = \frac{dBC}{\text{sen } AC \sqrt{\text{sen}^2 AC - \cos^2 AB}};$$

$$\text{luego } dA = \frac{dBC}{\sqrt{(\text{sen}^2 AC - \cos^2 AB)}}.$$

853 Esta fórmula se puede simplificar y poner de modo que sea mas facil de valuar por logaritmos en esta

$$\text{forma } dA = \frac{dBC}{\text{sen } AC \sqrt{1 - \frac{\cos^2 AB}{\text{sen}^2 AC}}}; \text{ porque si se toma un}$$

arco X , cuyo seno sea $= \frac{\cos AB}{\text{sen } AC}$, y se busca de repente su coseno, la fórmula será $dA = \frac{dBC}{\text{sen } AC \cdot \cos X}$.

238 854 Quando son constantes dos lados AB , AC , la diferencial del uno ú otro de los ángulos opuestos á los lados constantes, por exemplo B , será á la diferencial del tercer lado BC , como el radio es á la tangente del otro ángulo C opuesto al uno de los lados constantes AB , multiplicada por el seno del tercer lado, ó del lado variable BC .

Sabemos por lo dicho muchas veces que la diferencial

cial del ángulo B es el angulillo CBD , ó el arco HI que le mide, y la diferencial del lado BC es el arco DE ; la diferencial $HI = \frac{ED \cdot HI \cdot EC}{ED \cdot EC}$. Pero $\frac{HI}{EC} = \frac{R}{\text{sen } BC}$ (770), $\frac{EC}{ED} = \frac{R}{\text{tang } ECD} = \frac{R}{\text{tang } ACB}$, y por ser $R = 1$, sacaremos $HI = \frac{ED}{\text{sen } BC \cdot \text{tang } ACB}$; esto es, $HI : ED :: 1 : \text{sen } BC \cdot \text{tang } C$.

855 Es, pues, $dB : dBC :: 1 : \text{sen } BC \cdot \text{tang } C$.

856 $dB : dBC :: \cot C : \text{sen } BC$, substituyendo en la última analogía $\frac{1}{\cot C}$ en lugar de $\text{tang } C$.

857 $dB : dBC :: \cos C : \text{sen } A \cdot \text{sen } AB$, con substituir en la última analogía $\frac{\cos C}{\text{sen } C}$ en lugar de $\cot C$, y considerar que (713) $\text{sen } BC \cdot \text{sen } C = \text{sen } A \cdot \text{sen } AB$.

858 Si $BC = 90^\circ$, será $dB = \frac{dBC \cdot \cos AB}{\sqrt{(\text{sen}^2 AC - \cos^2 AB)}}$; porque (857) $dB = \frac{dBC \cdot \cos C}{\text{sen } A \cdot \text{sen } AB}$. Si consideramos que por ser BC de 90° , $\cos BC = 0$, y $\text{sen } BC = 1$ (II.361), sacaremos del primer valor de la fórmula (754) $\cos C = \frac{\cos AB}{\text{sen } AC}$; luego $dB = \frac{dBC \cdot \cos AB}{\text{sen } A \cdot \text{sen } AB \cdot \text{sen } AC}$; pero ya que (713) $\text{sen } A : 1 :: \text{sen } B : \text{sen } AC$, será $\text{sen } A \cdot \text{sen } AC = \text{sen } B$; luego $dB = \frac{dBC \cdot \cos AB}{\text{sen } AB \cdot \text{sen } B}$; y porque $\text{sen } AC : \text{sen } B :: \text{sen } AB : \text{sen } C$, será $\text{sen } AB \cdot \text{sen } B = \text{sen } AC \cdot \text{sen } C$; luego $dB = \frac{dBC \cdot \cos AB}{\text{sen } AC \cdot \text{sen } C}$. Y como por lo demostrado (852) $\text{sen } C = \sqrt{1 - \frac{\cos^2 AB}{\text{sen}^2 AC}} = \frac{1}{\text{sen } AC} \sqrt{(\text{sen}^2 AC - \cos^2 AB)}$, síguese que $\text{sen } AC \cdot \text{sen } C = \sqrt{(\text{sen}^2 AC - \cos^2 AB)}$, y que $dB = \frac{dBC \cdot \cos AB}{\text{sen } AC \cdot \text{sen } C} = \frac{dBC \cdot \cos AB}{\sqrt{(\text{sen}^2 AC - \cos^2 AB)}}$.

859 A esta fórmula se la puede dar esta forma

$$dB = \frac{dBC \cdot \cos AB}{\text{sen } AC \sqrt{1 - \frac{\cos^2 AB}{\text{sen}^2 AC}}}. \text{ Por consiguiente si busca-}$$

mos

Fig. mos un arco X cuyo seno sea $\frac{\cos AB}{\sin AC}$, y sacamos su coseno, tendremos $dB = \frac{dBC \cdot \cos AB}{\sin AC \cdot \cos X}$.

860 Del triángulo ABC tambien sacarémos $dB : dBC :: \cot C \cdot \sin B : \sin A \cdot \sin AC$, substituyendo en lo dicho (855) en lugar de $\sin BC$ su valor $\frac{\sin A \cdot \sin AC}{\sin B}$ (751).

861 $dB : dBC :: \frac{\cot AB}{\sin B} - \frac{\cot BC}{\tan B} : R$, si en lo dicho (856) substituímos en lugar de $\cot C$ la unidad dividida por el primer valor de $\tan C$ (760); en lugar de $\frac{\cos B}{\sin B}$ su valor $\frac{1}{\tan B}$, dividimos los dos últimos términos por $\sin BC$, y substituímos finalmente en lugar de $\frac{\cos BC}{\sin BC}$ su valor $\cot BC$.

862 $dB : dBC :: \cot AB - \cos B \cdot \cot BC : \sin B$, multiplicando los dos últimos términos de la última fórmula por $\sin B$, y teniendo presente que siendo $R = 1$, $\cos B = \frac{\sin B}{\tan B}$.

863 $dB : dBC :: \cos AB \cdot \sin B - \cot A \cdot \cos B : \sin AB$, substituyendo en lo probado (857) en lugar de $\cos C$ su segundo valor (754), y dividiendo despues por $\sin A$ los dos últimos términos de la proporcion.

864 Si $AC = 90^\circ$, sacarémos de lo probado (860) $dB : dBC :: \cot C \cdot \sin B : \sin A$.

865 Si en vez de considerar el ángulo B opuesto al lado constante AC , consideramos el otro ángulo C opuesto al lado constante AB , sacarémos las analogías siguientes.

$$dC : dBC :: 1 : \sin BC \cdot \tan B.$$

$$866 \quad dC : dBC :: \cot B : \sin BC.$$

$$867 \quad dC : dBC :: \cos B : \sin A \cdot \sin AC.$$

dC

868 $dC : dBC :: \cot B . \operatorname{sen} C : \operatorname{sen} AB . \operatorname{sen} A.$ Fig.

869 $dC : dBC :: \frac{\cot AC}{\operatorname{sen} C} - \frac{\cot BC}{\operatorname{tang} B} : 1.$

870 $dC : dBC :: \cos AC . \operatorname{sen} C - \cos C . \cot A : \operatorname{sen} AC.$

871 Si $AB = 90^\circ$. $dC : dBC :: \cot B . \operatorname{sen} C : \operatorname{sen} A.$

872 Quando son constantes dos lados como AB , AC , 286
las diferenciales de los ángulos opuestos á los lados constantes son entre sí como las tangentes de los mismos lados.

Los senos de los lados opuestos á ángulos constantes son en razon constante , por consiguiente entre las diferenciales de dichos senos hay la misma razon que entre los mismos senos ; quiero decir , que $d \operatorname{sen} B : d \operatorname{sen} C :: \operatorname{sen} B : \operatorname{sen} C$; pero $d \operatorname{sen} B = dB . \cos B$ (352), y $d \operatorname{sen} C = dC . \cos C$; luego $dB . \cos B : dC . \cos C :: \operatorname{sen} B : \operatorname{sen} C$, y $dB : dC :: \frac{\operatorname{sen} B}{\cos B} : \frac{\operatorname{sen} C}{\cos C} :: \operatorname{tang} B : \operatorname{tang} C.$

873 Luego $dB : dC :: \operatorname{tang} B : \operatorname{tang} C.$

874 $dB : dC :: \operatorname{sen} B . \cos C : \operatorname{sen} C . \cos B$, porque $\operatorname{tang} B : \operatorname{tang} C :: \frac{\operatorname{sen} B}{\cos B} : \frac{\operatorname{sen} C}{\cos C}.$

875 $dB : dC :: \operatorname{sen} AC . \cos C : \operatorname{sen} AB . \cos B$. Sácase con substituir en el tercer término de la analogía antecedente en lugar de $\operatorname{sen} B$ su valor $\frac{\operatorname{sen} AC . \operatorname{sen} C}{\operatorname{sen} AB}$ (746), dividir despues los dos últimos términos por $\operatorname{sen} C$, y multiplicarlos últimamente por $\operatorname{sen} AB$.

876 Quando hay dos ángulos constantes , la diferencial del lado que está entre los dos ángulos constantes es á la diferencial del uno de los otros lados , como el seno del ter- 286
cer

Fig. *cer ángulo es al producto del seno del ángulo opuesto á dicho lado por el coseno del tercer lado.*

Supongamos que en el triángulo ABC sean constantes los ángulos A y B , es evidente que en el triángulo suplementario EFD serán constantes los lados FE y FD . En virtud de lo dicho (832) la diferencial del ángulo F es á la del ángulo D . como el seno del tercer lado ED es al producto del seno del lado EF por el coseno del tercer ángulo E . Substituyendo en esta proporcion las cantidades correspondientes que dá el triángulo ABC , quedará probada la proposicion.

877 Es, pues, $dAB : dBC :: \text{sen } C : \text{sen } A . \cos AC$.

878 $dAB : dBC :: \text{sen } AB : \text{sen } BC . \cos AC$, substituyendo en la última analogía en lugar de $\text{sen } C$ su valor $\frac{\text{sen } A . \text{sen } AB}{\text{sen } BC}$ sacado de $\text{sen } C : \text{sen } A :: \text{sen } AB : \text{sen } BC$.

879 Si $A = 90^\circ$, $dAB : dBC :: \text{sen } C : \cos AC$, porque entonces $\text{seno } A = 1$ se puede omitir en lo dicho (877).

880 Si $A = 90^\circ$, $dAB : dBC :: \text{sen } B . \text{sen } AB : \frac{1}{2} \text{sen } 2 AC$. Porque si en lo dicho (878) substituimos en lugar de $\text{sen } BC$ su valor (751), y borramos $\text{sen } A$, que entonces $= 1$, sacaremos $dAB : dBC :: \text{sen } AB : \frac{\text{sen } AC . \cos AC}{\text{sen } B} :: \text{sen } AB . \text{sen } B : \text{sen } AC . \cos AC$, ó $\frac{1}{2} \text{sen } 2 AC$ (II. 378).

881 Si en lugar del lado BC consideramos el lado AC , sacaremos tambien

dAB

$$dAB : dAC :: \text{sen } C : \text{sen } B \cdot \cos BC.$$

882 $dAB : dAC :: \text{sen } AB : \text{sen } AC \cdot \cos BC.$

Fig.

286

883 Si fueren constantes los ángulos A y B , la diferencial del lado AB que cogen dichos dos ángulos es á la diferencial del ángulo C opuesto al lado AB , como el radio es al seno del uno de los lados BC multiplicado por el seno del ángulo constante B adyacente á dicho lado.

Porque suponiendo trazado el triángulo suplementario EFD , serán constantes los lados FD y FE suplementos de los ángulos A y B , tendremos, pues, (848) la diferencial del ángulo F que forman los dos lados constantes, es á la diferencial de su lado opuesto DE , como el radio es al seno de uno de los ángulos multiplicado por el seno del lado constante FD adyacente á dicho ángulo. Substituyendo en esta proporcion las cantidades correspondientes del triángulo ABC , se convertirá en la que hemos dicho.

884 Es, pues, $dAB : dC :: R : \text{sen } BC \cdot \text{sen } B.$

885 $dAB : dC :: R : \text{sen } AC \cdot \text{sen } A$, porque $\text{sen } B : \text{sen } A :: \text{sen } AC : \text{sen } BC.$

886 Si $A = 90^\circ$, la última analogía se convertirá en $dAB : dC :: R : \text{sen } AC$, porque entonces $\text{sen } A = 1.$

887 Si dos ángulos A y B fuesen constantes, la diferencial de uno de los lados BC opuesto al uno de los dos ángulos constantes A , será á la diferencial del tercer ángulo C , como el radio es á la tangente del otro lado AC opuesto

al otro lado constante B , multiplicada por el seno del tercer ángulo C .

Si trazamos el triángulo suplementario EFD , los lados FE y FD serán constantes, luego (854) $dB : dED :: R : \text{tang } E \cdot \text{sen } DE$, y si en lugar del ángulo D , del lado ED , y del ángulo E substituimos sus correspondientes BC , C , AC , la analogía se convertirá en la que nos tocaba demostrar.

$$888 \quad \text{Es, pues, } dBC : dC :: R : \text{tang } AC \cdot \text{sen } C.$$

$$889 \quad dBC : dC :: R \cot AC : \text{sen } C.$$

890 $dBC : dC :: R \cdot \cos AC : \text{sen } AB \cdot \text{sen } B$, substituyendo en la última analogía $\frac{\text{sen } AB \cdot \text{sen } B}{\text{sen } AC}$ en lugar de $\text{sen } C$ (748), y $\cos AC$ en lugar de $\cot AC \cdot \text{sen } AC$.

891 Si en lugar del lado BC , consideramos el otro lado AC opuesto al otro ángulo constante, hallaríamos por el mismo camino

$$dAC : dC :: R : \text{tang } BC : \text{sen } C.$$

















$$892 \quad dAC : dC :: R \cot BC : \text{sen } C.$$

$$893 \quad dAC : dC :: R \cos BC : \text{sen } AB \cdot \text{sen } A.$$

894 Quando son constantes dos ángulos A y B , las diferenciales de los lados opuestos á los ángulos constantes serán entre sí como las tangentes de los mismos lados.

Trazaremos el triángulo suplementario EDF , y las diferenciales de los ángulos D y E serán las mismas que las de los lados BC y AC . Por lo probado (873) tendremos $dD : dE :: \text{tang } D : \text{tang } E$, de donde se sigue la siguiente proporcion que nos tocaba demostrar.

dBC








895 $dBC : dAC :: \text{tang } BC : \text{tang } AC.$

896 Si $A = 90^\circ$, $dBC : dAC :: R : \cos C$; porque

(699) $R : \cos C :: \text{tang } BC : \text{tang } AC.$

FIN

DEL TOMO TERCERO.



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1155 6th Ave. New York, N.Y. 10018


1871

DEL TOMO TERCERO




+

+











211

ELEMENTOS
DE
MATEMATICA

TOM. III.

49

+ colorchecker classic



calibrite

mm